日

前篇 證候與治法概編

第一章 頭痛 眩暈 耳鳴

實之感以指觸於左臂骨窩之部有過敏之索係物己則脈虛軟大便每日一次至二次眩暈耳鳴層凝月經不之頭痛也。戊則脈沉實大便有祕結之傾向顏面充血時時眩暈月經不順左腹下疼痛按其腹部覺全部有充 強體溫不昇脈沉而弱甲病陽證乙病陰壁處方自異故甲宜與麻黄腸乙宜與麻黄附子細辛腸同一胃病之 氣湯焉主治藥後者以當歸芍藥散治之, 則脈浮數口不竭舌苔無屢屢吐水丙陽證也丁陰證也前者宜與五苓散後者宜與吳茱萸湯又同一子宮病 頭痛也而胃內所停滯之水毒雖同而丙則脈浮數口遏小便不利舌蓋白而乾燥時欲飲水飲則屢屢吐出丁 探求病源實爲漢醫景要之事。同一風邪之頭痛也。在甲則鼻寒微惡寒有熱無汗脈浮緊乙則鼻涕交流。惡寒 者訴頭痛之際應及其頭痛 月中有二次下腹疼痛腹部全部軟弱腰脚易冷皮所患者為陽實證己所患者為陰虛證前者以桃核承 起於何病陽證之頭痛平陰證之頭痛乎抑爲虛證之頭痛平實證之頭痛

腔疾患耳之慢性化膿 便祕循 頭網 環障礙子宮疾患等余今大别爲四類,一日外邪之頭痛風邪流行性感冒腸 眩疊 耳鳴

易起頭痛之疾患就現代醫學之見地多起於發熱腎臟炎動脈硬化症緣內障腦腫瘍徽華外傷硬結頭痛

副

痛月經 起之痛也四者之中更各分陰陽虛實不順或血液循環受障礙而起者也四 痛 之痛時多兼發熱二日痰飲之頭痛水毒停滯於胃腸之內上衝而起之痛也三日血 而起者也四日食毒性之頭痛便祕或消化不良食毒停 巭, 滞於 胃 腸 内。

茯苓飲人參揚大建中湯真武湯吳茱萸湯五苓散茯苓澤鴻湯等治之血證性之頭痛用當歸 中受刺戟而 邪之頭痛用桂枝揚麻黄湯萬根湯、 小柴胡揚及其加減之方以治 之者爲多痰飲性之頭 痛。 芍 用 藥 桂 散桂枝茯 朮 甘

抵使用的 眩 苓丸·桃核承氣湯等以治之食毒性之頭痛則應用瀉心湯·承氣揚之類。 如白虎陽之有奇驗·白虎腸證用·白虎腸,其有奇驗。固勿論已即如舟車酒醉之眩暈用半夏瀉心腸與 水氣也得以附子寫心場治之原南陽云世人用人参黄連防己大黄桂枝茯苓朮甘草之套方以治眩暈。 有 疾患多發性硬化症 甘草乾姜湯 密切 治水 沉重 於水火相尅之理論說來至詳且 金匱 之關係者也西醫學則云眩暈與三半規管內液之動揺有直接之關係然丟人對於古賢一 名也眩者眼前暗黑之意量 茶散桂枝芍藥知母湯桂枝加龍骨牡蠣湯五苓散小半夏加茯苓湯澤鴻湯近效方朮附湯茵 一之深謀遠慮實 寫心湯。古人云「瀉火降逆」其於水火相尅之理論述之甚詳茵陳湯體之眩雖近於瀉心,姜湯治圄之處方四計苓桂五味甘草湯苓甘姜味辛夏湯澤瀉湯大承氣湯等,其治乍起眩 眼前不清楚 眩暈 要略言及眩之處方有十一方其中有朮者六方有茯苓者五方此亦鑑於事實可定眩暈 獲癇希斯為里神經衰弱中毒眼筋麻痺內耳疾患等往往起眩暈,是也凡西醫學之貧血胃腸病心臟病(尤其在瓣膜狹窄)腦腫瘍(尤其在腦黴霉) 大堪驚嘆爲茲就傷寒論金匱要略中拾出治眩之處方十一。計苓桂朮甘湯真 英 備偷細細考究之實能發見甚有趣味之暗示焉惠美三白云產 運 通故有眩運目運頭眩冒眩機 眩 之稱凡眩暈輒兼頭圖 湯證之眩。 泛魚 治眩 五 萴 頭

其中之澤瀉茯苓朮諸藥則視其原因之或爲船醉或爲水毒而有加減焉。 而 有效古人早有卓識矣和回子真舜云亦謂謂血劑必從根治余會屢屢用當歸芍 藥散以治此種之患者而

耳鳴

鳴往往與眩暈爲同時並起之症候眩暈愈時耳鳴亦止耳鳴告愈同時眩暈亦止此爲余日常臨牀所 之

仁陽當歸芍藥散等輒有效患動脈硬化症者之耳鳴多用瀉心湯梔子豉腸及以上各方之加味患中耳炎者 、驗古人云耳久鳴則聾蓋耳鳴則激之爲聾也 惠神經衰弱症者之耳鳴多因於水毒用茯苓飲柴胡加龍骨牡蠣湯苓桂朮甘湯苓桂五味甘草湯、 鳴多用小柴胡揚大柴胡陽柴胡桂枝揚等以治之 酸棗

卒然量倒者可不論其虛實與以回生散多連湯三黄湯等當有效產後之血量或血多則上衝面目紅赤脈絡 腦而起病者中風癇證發狂恐怖等之眩暈腦之自體之病也產後及子宮出血吐血衂血腸 香天麻肠焉上頭痛眩晕嘔吐者宜與半夏白朮天麻湯如服後嘔吐猶不止者宜用半夏瀉心腸或小半夏加 日者用苓桂朮甘湯、巫神湯、如心散之類轉方爲佳、亡血後動悸高而眩甚者可用腎氣丸連珠飲八珍湯而 怒脹之眩者用三黄湯加辰砂或用苓桂朮甘湯三 血液虛竭虛里與腎間之動悸非常或因過飲過浴諸熱病等而發之眩暈從外界使犯於腦而起者也(中略) [本間最軒對於眩暈之說] 用鎮悸丸脾胃虛弱面色萎黄動悸而眩暈者宜與歸牌湯兼用寧心膏即真武湯亦可用之漏體之眩暈 古人學說稱眩暈爲腦海虛即腦病也夫腦有自體發病者亦有因外界使犯於 |黄磡(瀉心場)合方為佳下劑不宜是服若前方已服數・ 出血尿血 等症致

原著 者按)不論何處若蔑視病之虛實雖經治療循之未治回生散係香附子紫檀人多白檀鬱金甘草胡 第一章 頭痛 眩暈 耳鳴

風半夏附子獨居、羌活甘草當歸殭蠶生姜也半夏白朮天麻湯者半夏陳皮麥芽茯苓黄耆人參澤瀉蓍朮鎮悸丸可參照心悸亢進條歸牌湯者當歸白朮茯苓黄耆龍眼肉酸棗仁遠志人參湯者沉香益智天麻防自轉醫者翻弄病之良手也巫神湯者五苓散加乾姜黄違木香者也連珠飲八珍湯木香甘草也沉香天麻往濫用下劑因過下而困疲下已難下而又有不得不下之必要故曰轉方此種轉方山脇東洋之所謂醫之 弱面色菱黄動悸眩暈者多用茯苓飲合苓桂朮甘湯頭痛眩暈嘔吐者為吳茱萸湯五苓散之瞪從證運方。天麻神麯白朮黄柏乾姜生姜也止血後動悸高而眩甚者炙甘草湯芎歸膠艾湯當歸芍藥散有效脾胃虛 庶不誤也 椒而成。倘施於實證之眩暈即爲不考藥效之誤又以三黄投於虛證亦大不受參連湯者。人參與黃連 後之血量 多應用當歸芍藥散不長服下劑云云係從西醫之知識而出發者之說也西醫蔑視陰陽虛實。 也產

此疾多從水飲而生亦有因氣疾而來者亦有因過食而來者婦人從血道而發男子自瘀血結構 〔有持柱里之眩暈說〕 眩者目之意量者循運也如身在車船之上不能自主也故俗人往往即用眩運二字。 (陳久性徽

毒)而生。

原著者按)眩多因水飲之說實大得我心。

傷寒微論〕 集驗更方〕 太陽病。脈沉身熱頭痛者陽中夾陰者也黄蓍建中湯治之若誤投發汗而不瘥者。四逆湯温之 白虎湯治中暑(熱射病)口渴喜飲身熱頭量昏量等瞪有效

份寒緒論 太陽病者發行發行過度則陽虛而耳聾叉手自冒不可誤用小柴胡揚宜用建中場治之。

遲吐 吐血喀血 吞酸嘈噪

嘔吐

甚多之吐出者吐也食急而有物奔出者。大抵焉吐有聲而同時有物者曰嘔吐嘔逆者嘔之激也吐逆者吐之 喀有聲有吐 匱要略傷寒論中之區别嘔吐乾嘔嘔逆吐吐逆等項東垣之解釋云有聲無物曰嘔有物無聲曰吐口中 者之象而始終不吐出者驅也乾嘔也如乳兒患脚氣與患腦膜炎者其聲未出而乳汁食物已有

乾姜之配合茲抄錄如次。 略中、探錄治嘔之方一十有六,其中十四方配合以生姜乾姜。始乾嘔之方一十有三,其中十二方亦有生姜或 湯猪苓湯治陽證之嘔者也烏梅圓吳茱萸湯大建中湯四逆湯、真武湯治陰證之嘔者也今從傷寒輪金匱要 上述嘔有乾嘔之逆而乾嘔嘔逆之中。又各分陽證與陰證小柴胡揚槐子生姜豉湯柴胡桂枝湯白虎 也。 加桂枝

[區] 黄芩加半夏生姜湯 小半夏加茯苓湯 大建中湯一半夏鴻心湯 真武陽(以上諸藥中有生姜) 白虎加桂枝湯 萬根加半夏湯 吳茱萸湯 苓甘姜味辛夏湯 小柴胡湯 鳥梅圓 大柴胡湯 四逆湯(以上諸藥中有乾姜) 猪苓湯 柴胡桂枝湯 梔子生姜豉湯

(乾嘔) 湯(以上諸藥中有乾姜) 小青龍湯 六物黄芩湯 桂枝湯 四逆湯 小柴胡湯 通脈四逆湯 橘皮湯(以上諸藥中有生姜) 白通加猪膽汁湯 半夏乾姜散

〔嘔逆〕 竹皮大丸(有桂枝)

從上看來可知凡治嘔乾嘔噬之病大抵用生姜乾姜桂枝此生姜桂枝均含有揮發油西醫用爲健胃之劑。 不用刺戟藥却用緩和黏滑疏通之劑如猪苓湯等方劑此亦不可忘忽者也。 認爲作用甚廣臨牀醫家最宜注意者凡治噁與乾嘔往往多用上舉諸温性刺戟藥之一方然有時亦有全然

之剩余獨學大黄半夏雖治吐有效其實不能治吐漢醫對於吐證雖亦有以半夏處方者然實非半夏之效彼 近來西醫界盛用半夏以爲鎮吐之劑半夏決非鎮吐之劑余敢斷然言之此係西醫之誤吾人當矯正也给吐

第二章

嘔吐

吐血喀血

吞酸嘈媒

中言及治吐之處方共計有七其中皆無以半夏爲配劑者也 知其力量之將 軍不能視察敢人之病。以致誤遭敗北而乃罪實兵卒其可得平試觀傷寒論。金匱要略其

公吐 茯苓澤瀉湯 五苓散 桂枝芍藥知母湯 茯苓飲(以上各方有朮) 大黄甘草湯 調胃 承

(以上兩方有大黄)乾姜黄連黄芩人參湯

矣此時宜用大黄等之冷藥使胃腸緊縮以去其宿食此際消化器現緊縮之狀態以上云云皆其區别也即言 吐之症狀,凡胃內停水者。宜配用朮之方劑。宿食燥屎者。宜用有大黄之方劑。二者誤用,則增病勢之惡逆診斷 者不可不慎也 术等之温桑以去其水。此時消化器為弛緩症狀。反之宿食燥屎**鬱積於消化管內。以防飲食物之下降。於是吐** 據金匱要略云痰飲之病宜用温藥痰飲者胃內停水也停水於胃內則飲食之物不得疏通於是吐矣故宜日 右舉七方中四方有术二方有大黄於此可知治吐以大黄或尤爲要藥矣。但术之可治者大黄往往 示 訄

金匮要略中言及嘔吐之方配以半夏者亦計有六開列如左。 得半夏有治吐效力之皮毛學識者即批判漢藥區别門戶、蔑視前人之勢苦殊失公平之見地也茲檢傷寒論 古方中雖有將朮 與大黄合組爲一方劑者然與後世醫人之加味者不可同日而語況嘔吐與吐又無區别習

、嘔吐) 附子粳米湯 小半夏湯 小半夏加茯苓湯 大半夏湯 半夏乾姜人參丸 黄連湯

吐血喀血

為吐血此所云之吐血實即今日之所謂喀血也。 **齡金匱要略中我有吐血之語。而無喀血之文字。意者其時之吐血無今日喀血之意。金匱要略驚悸吐衂下血** |血者消化管(尤其是胃或食道)出血從口腔吐出之謂也喀血者從呼吸器(尤其是肺)出血之謂也傷寒 瘀血 病 脈證治項中有云病人面無色無寒熱脈沉弦者衂也脈浮弱以手按之即絕者下血也煩咳者必

吐血 定其是吐血平,抑是喀血平。然後辨明其爲陰證數陽證數抑虛證與實證數試舉一 均治吐血之劑也然瀉心湯镫之出血爲組織上起炎症之充血柏葉湯之出血爲組織弛緩所起之鬱血盖瀉 子鼓揚(及其加減方)茵陳蒿湯桃核承氣湯桂枝茯苓丸等治陽體之吐血者也請在第三章下血條更事研 旣越明矣陰陽之分亦不可不慎前舉諸方之外如人參湯甘草乾姜湯黄土湯治陰瞪之吐血者也白虎湯梔 心湯焉陽瞪之治劑柏葉湯焉陰證之治劑苟柏葉湯之症誤與瀉心湯則出血增加病者立即可斃吐血喀血 與喀血不可同一處理但在處方上若不確定其陰陽虛實而誤用之亦往往不效故在處方之前先宜 例以明之瀉心湯柏葉汤

究茲探錄金匱冥略中關於吐血之旣於左

(一)吐血咳逆上氣之候也其脈數而有熱者死。

栗園(譯者按即日本名漢語淺田栗翁)曰脈緩而身涼者血或可止 (原著者按)患肺結核者多表見此種症狀。上氣者兩類潮紅氣上逆之謂也。

(二)貧血之亡血者無奸意出奸者更失體液故至惡寒戰慄

納加羅莫金之類企圖達其鎮痛之目的稱為補血液又以林稱兒液注射之稱為消耗之發汗劑此始即西 原著者按)病者對於醫家施行手術之創口或誤傷之處訴疼痛時西醫往往在阿斯匹靈中風加莫兒希

醫之治療方針平

吞酸嘈嘴

湯此係余之經驗頗著速效此中陰陽相異之認辨甚爲切要也 牡蠣湯桂枝甘草龍骨牡蠣湯、小陷胸湯等如以上方劑不能見效病勢反覺惡化時,則用大建中場或吳茱萸 胸中吐出苦酸之水曰吞酸嘈雜治吞酸嘈雜之方、屡屡應用者焉生姜瀉心湯旋覆花代赭石湯、柴胡加龍骨

第二章 当吐 **吐血喀血** 吞酸嘈啡

逆水毒。以及水毒帶熱帶寒之時機可用小半夏湯、吳茱萸湯、四逆湯等。 噦俗名也有陰陽虛實可以大小承氣揚治之亦可與以小柴胡湯橘皮腸橘皮竹茹湯之類亦可選用食毒氣

備考

殿軒醫談〕 (竹茹湯之人參代以麥門冬)竹茹代以竹遜甚妙) 因留飲而噦者其小便必不利。又投承氣揚後亦有稍稍 **噦有數因陽明證竭而不能食食下後漸漸口渴引飲此必發噦選用茯苓飲橘支竹茹湯可愈**

下降而仍曠者此因熱氣挾痰(水毒)而上逆也非竹隱不效

橘皮竹茹汤 (有持桂里之說) 同蛔蟲)積聚痰飲等皆患此病發時挾以他病者凶候也。(尤以痢疾後及諸病之所發者爲最凶。 方書有種種名目。而以赎字為最正確此症自古即認為胃中之寒亦有因熱而來者就蟲

橘皮汤 手足厥而氣逆者均用之詳說於嘔吐門可參照。橘皮竹茹湯 此焉古今治噦逆之通用方劑。

半夏噦心湯 噦逆而心下有痞鞕者用此方以開通之痢疾傷寒之患此者尤爲喫緊之**要方**。

吳茱萸湯 吳茱萸爲止噦之效藥陰證用之陽證則不適用本草綱目中有吳茱萸橘皮附子三味之方用於

陰證甚相宜。

柿蒂湯 滿與咳逆不止等。 大塚云此方在柿蒂丁香之中,加生姜煎而熱服之古時無此方劑。對證應用,能奏偉效其主治爲胸

在平胃散中加柿蒂丁子亦有 用橘皮竹茹湯之類尚不止者可用此方以止之蓋柿蒂焉治噦之專藥烟法印云此物若與石蜜合煮愈妙又 偉效

炙甘草湯 噦而脈結者可用此方但須在危篤症中用之,甘草乾姜湯 與以苦味劑而猶不止者用此方間能奏效。

Λ

附子粳 米湯 胃中寒甚噦逆更加嘔吐輕劑無效時用之

四逆湯 猪膽汁! 四逆湯加猪膽汁湯白通加猪膽汁湯之類) 湯 》 噦時呃呃不已呼吸有暫絕之狀用此可以急救無猪膽時,熊膽亦可用之(大塚云此可用通版·陰寒脫症之噦用此方甚佳。在霍凱症嘔吐下痢,手足微冷脈細而噦者用此方能救其十一·

鎮悸丸虛勞者以人參養榮湯爲佳無病而微喀血久而不止者。原膈散爲宜飲酒後吐血者亦可用涼膈散出 土湯如用以上三段循不止者可與斷紅飲間服阿芙蓉液服後血色變黑者爲止之前兆亡血過多而脈沉微用三黄湯犀角地黄湯或二方合用亦有用四物湯者吐血少者或連綿不止胸脇苦滿者用柴胡四物湯或黄 虛里煽動氣短出汗者生命已在瞬息之間可與獨參陽兼用回生散亦佳吐血之後變實胖者可用連珠飲兼 (本間選軒之說) 血過多亡血甚者可與理中湯四物湯 吐血嘔血古時統稱嘔血有從肺出與胃出二體(中略)而治法並不區别大抵吐血多者

(原著者按)吐血亦有陰陽虛實宜從證以處方三黃湯者瀉心湯之别名也四物湯者當歸川芎芍藥地 人參一味也断紅飲犀角地黄湯人參養榮湯涼膈散等可參照肺結核條備考之部。 也柴胡四物湯者小柴胡湯與四物湯之合方也命期促迫者宜與獨參湯而不投四逆加人參湯獨參

黄胖者在十二指腸蟲病心臟病腎臟病等,其病勢進行,則其人貧血甚皮膚淡黃稍有水氣動悸甚強者也連 珠飲者苓桂朮甘湯合四物湯加木瓜薏仁朮萆薢也

傷寒緒論〕 太陽則脈浮數。灸之必驚狂。起臥不安。咽噪吐血此時投桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨教逆陽

、集驗良方〕,黄耆建中陽治吐血衂血虛贏不足飲食乏味脚步軟弱言語倦怠失精(遺精)內熱等諸虛損 第二章 幅吐 吐血咳血 吞酸哮息 戲

之體有效。

〔續易簡方〕 理中湯治身寒氣虛咯血吐血之劑

〔千金方〕 酒徒之咳者必吐血此因久經長年月日過度之飲故也其脈虛者血必冒若飲後胸滿者厚朴大

黄湯治之

櫻寧生傳) 桃仁承氣湯治積勢火甚迫血上行衂血數升面赤脈躁疾精神恍忽如癡者有效。

心法附餘〕 吐血者胸中覺氣塞上吐紫血者桃仁承氣湯下之

〔千金方〕 凡服藥後嘔逆不入腹者先以甘草一雨水煎服之可效。

〔朱氏衆驗〕 二神湯(即甘草乾姜湯)治吐血極妙

「豎治準絕」 梔子蘖皮湯治小兒衂血極有效

(原著者按)此方不祇限於小兒衂血即吐血亦極有效小兒衂血可用麻黄湯桃核承氣湯瀉心湯之類

〔三因方〕 大半夏湯爲治心氣鬱而不行生涎飲心下痞鞕聚結不散腸中轆轆有聲食入即吐之劑 仁齊直接〕 半夏丸(生姜半夏湯所製之丸)治吐血下血財中帶下喘急聚嘔中滿處腫諸病有效

按尉中帶下即今西醫之所謂子宮病也

則將丸藥為散藥漸漸靜其動氣然後再與煎藥若無此心得妄用湯藥反足增病。 [寮治茶談] 嘔吐證之動悸甚者必致煎湯不入往往無相應之藥其時在下焦穴針灸之以引下其動氣藥

[黄軒醫談]

(橙胎摘要) 桂之類血質者服質數血虛者脈沉微若微數者必死。 一男子下痢不止發噦吐蚘蟲與以吳茱萸揚見效。

第三章 便秘 下痢 下血子宫出血

便祕

便秘有種種為說明上便宜計區别為(一)緊縮性便秘(二)弛緩性便秘(三)狹窄性便秘。 一)緊縮性便祕所謂實證之病也其見症焉脈沉實或沉遲而多力按其腹部有充實之盛血壓高大便堅硬

(二)弛緩性便祕為腸管麻痺弛緩無排出大便之力因而起便祕脈浮弱或沉遲而多微弱腹部數] 大黄芒硝之配劑可奏效。

弱大

便

則弛緩盆甚且起腹痛裏急後重之患宜與大建中湯理中湯當歸芍藥散等以除水毒剌戟腸管之緊縮大建 含水分排洩 少而不通快此多起於水毒停滯於消化管內而起胃腸之下垂此症決不可用下劑若投以大黄。

中湯等温藥也温可以去弛緩及去失其麻痺則大便不求暢而自暢矣。

病可用大黄牡丹皮汤桂枝茯苓丸桃核承氣汤下瘀血丸大黄䗪蟲丸等以去腫瘤炎症瘀血塊等而圖腸 (三)狹窄性便祕爲腸管自身起窄與隣接之臟器生腫瘤或腫大壓迫腸管而起狹窄結果起便祕之病也此

此外尚有老人或熱性病之回復期或慢性病等體液枯燥致大便難通者投與麥門冬等温潤之劑往往得效 有時亦可用麻子仁丸亦可用蜜在藥味中煎導之

之疏通

理論方法相似。其適應之症不止限於便秘。(但今日為濫用浣腸之時代宜注意)大承氣湯掃滌: 物者也患腸實證者用以浣腸也温藥者對於弛緩性之便發用浣腸也然我道之用蜜煎導者須在發汗過度 上述便祕之證在漢醫學非經嚴重之區別徹底之明瞭決不濫用下劑蜜煎導之方法與今日里斯林院 。多出體液枯竭致大便不下而不能用下劑以攻之者始用之而患盲腸炎者與以阿美聲後致起便稱 胃肠內容

第三章

便秘

下病

不血子含出血

時始用浣腸之法。

下痢

蹟漫然投藥而得僥倖須握有確確鑿鑿之實證者也 投發汗劑之萬根陽而愈下痢投利尿劑之猪苓陽而愈下痢甚至投下劑而止下痢凡此諸法決非偶然之奇

能通快者真武陽治之故在診斷之際有無裏急後重宜丁寧訊問。 即炎症充血肛門感灼熱者多用白頭翁湯凡裏急後重而不感緊迫壓出之力不足大便有殘留之氣味而不以圖利尿果見速治猪苓湯之阿膠與白頭翁加甘草阿膠湯之阿膠對於裏急後重大有緩解之力凡有淫熱。 之證亦有裏急後重者此則不可忘忽者也在證之不適用下劑時可用真武湯之附子劑大腸加答兒或 今日西醫界凡遇裏急後重而兼下痢者即以投下劑為其定則裏急後重誠然多現於陽實之證然有時陰 現陽性之症狀脈弛緩而弱者陰證也在按脈之際即能區别之此陰陽之相異為治療方針之根幹不可輕輕 看過茲採錄傷寒論金匱要略中言及下痢之處方陰陽之大别於次 之裏急後重 一者或有表證者投寫根湯以發汗能見速效余對於慢性大腸加答兒之歷久未愈者投以猪苓湯 裏急後重而有緊迫之感者陽證也脈舌均

葛根黄連黄芩湯(以上皆有黄芩) 猪苓湯 (陽蛭之治劑) 黄芩湯 黄芩加半夏生姜湯 白頭翁湯 六物黄芩湯 白頭翁加甘草阿膠湯 甘草瀉心湯 萬根湯 生姜瀉心湯 四逆湯 大承氣湯 大柴胡湯

桂枝人参湯 、陰瞪之治劑) 桃花湯 真武 汤 吳茱萸湯 四逆湯 通脈 四逆湯 白通湯 白通加猪膽汁湯 四逆加人 多湯 人参湯

附子乾姜吳茱萸朮等兩兩比較之覺其問題然有與味 通觀以上各方凡陽證之治劑大半配合苦味之劑如黄芩黃連黃藥等陰證之治劑多用辛味之藥物爲配合

者用之即不可誤於藥室方函口訣用寬陽湯治之 治法用訶梨勒散訶梨勒即訶子也有利氣之意。凡大便不通投確實(芒硝大黄)之劑後便意頻數而不能通 金匱要略有利氣之文字今日神經性之下潮者往往頻頻有催便之意如廁後大便不能通快者此

下血子宫出血

從大便而出之血曰下血近於肛門之出血曰近血在肛門深部之出血曰遠血漏下者有子宮之出血故云子 宮出血

治下血及漏下之處方、大體如次。

妊娠中因胎兒之壓迫障礙血行易起變血即非妊娠之婦女與普通之男子亦有起鬱血者。多用當歸川 此為今日生理學病理學上之說明與證明亦為臨牀上極有與味之事實 黄土湯 以治之在鼻黏膜附近之組織緊張局部充血之甚遂致血管破裂而出血者曰衂血麻黄湯可以止之炎症充 血之喀血瀉心湯可以止之身體上半部之出血多係炎症充血之所致身體下半部之出血多屬鬱血之所致 下血漏下。由於組織弛緩而起勢血或由於血管或周圍血行障礙而起勢血勢血之極乃呈是症右舉六方可 桃核承氣湯 桂枝茯苓丸 芎歸膠艾湯 赤豆當歸散 旋覆花湯

仁牡丹皮之類以治之其各處方可参照藥方解釋編。

芎桃

往促其生命假令幾日不通而不能投下劑時可與參連白虎湯用滑細棒捲以綿其大如烟管長三寸許途中 黄膏插入肛門留綿而抽去其細棒如此數十日大便自然可通而如平常矣 [本間東軒便祕之說] 患眼病者連股大黄芒硝等之下劑不按通常之分量致脾胃衰弱再與強下之劑往

原著者按)便祕不必用大黄芒硝主治設而長服之脾胃當然虛弱矣但確爲大黄芒硝之證間線服之而 第三章 便秘 下痢 下血子宫出血

不得復其健康者此又非下劑之罪矣其故在於用之人之力量不足便得亦有陰陽虛實不辨别之服藥亦

無效也。

指横行結腸而言。可與以大柴胡湯等、乙查蜜煎導條中,有用猪膽汁以爲導劑對於信食惡物甚有效云云,夫 導劑不限於豬膽汁。惟聞諸西醫云膽汁可以消化飲食則膽汁或能解宿食惡物而制燥屎者與 之所謂胃中云云。亦決非西醫所指之胃此殆與熱入血室,冷結膀胱之類相同茲從各方實驗證之,大便之腸, 寒輪中有燥 屎五六枚與燥屎在胃中之文。以西醫內景之理推之胃決非燥屎之處。又依仲景內臟之旣觀

日而漸漸明瞭其原理此即漢法醫學十分偉大之明體(引用稻田博士言) 原著者按)膽汁有促進陽中蠕動之性質故便秘用猪膽汁為極合理的數千年前所行之合理方法至今

仲景之事從實驗而出與今日西洋學說若合符節(中略)治法從病因而有異同麻子仁丸調胃承氣湯窟首 丸等可審用之亦可兼施資煎導達腸法等

〔有持桂里便祕之說〕 凡有癥疝之人,大便常易祕。

氣湯、倒換散、大黃期芥二、味各等分研末服之潤腸湯、麻子仁丸加減方、通仙丸、麻仁丸蜜煎導之外。並推獎 原著者按)燥結有虛實不能誤投峻下之劑據桂里翁對於便祕之治法推變小承氣過大承氣過調胃承一切久病之未違液乾者多結燥高年血弱别無病患者亦結燥先哲云燥結有實者有虛者試難言也(原著者按)子宮及其附屬器有炎症腫瘤者常有所謂習慣性便祕臨牀醫家時常遇之又產後發奸後

处法 炒鹽入網袋在病人腹上熨之之法也

服下藥以內 醫宗金鑑し 准通氣而屎不出時。行熨法可效又用温石以焉通徹温氣之法對於大小便祕均有效。 經行後或出血過多者貧血而榮養衰弱者黃者建中揚始之。

、聖唐總錄〕 鳥梅於產後冷熱痢久病下痢不止者有效

橙胎摘要〕 甘草鴻心陽之給下痢以腹中雷鳴者為目的若腹不雷鳴為穀不和之下痢四逆陽主治之

第四章 小便自利 遺尿 小便不利附歷

小便自利

狀即腰冷如坐水中雖其症狀紛紛然一見便明。 證之小便自利平抑為白虎陽證之小便自利平所謂白虎陽證之症狀即熱厥之症狀所謂苓姜朮甘陽之證 現小便自利者此外如白虎陽治陽瞪之小便自利者也故對於小便自利之症宜詳細審察其爲苓姜朮甘湯 證陽證陰證依甘草乾姜湯條上虛而不能制下。故宜用乾姜附子等熱藥以刺戟之抵當湯治瘀血之蓄 小便自利之症也八味丸當歸芍藥散真武揚四逆場甘草乾姜揚等亦治小便自利之證也小便自利亦分陰 小便自利者尿自利而快其量多之謂也桂子附子去桂加朮湯小建中湯苓姜朮甘揚小青龍湯抵當湯等治

遺尿

場條中有口不仁之文口不仁者。口中不覺有香味也以今日新名詞言之不仁即知覺麻鈍之謂吾今易口字 縮力之不足故小便出而不多 焉膀胱·日陽瞪之遺尿者·膀胱之知覺庶鈍也。雖上下相異。而自命確有至理。甘草乾姜汤瞪之遺尿則起於緊 有白虎湯瞪之遺尿有甘草乾姜湯證之遺尿前者爲陽之極點後者純粹陰證同一遺尿也機轉正相反白虎

還尿亦爲小便自利之變相運用小便自利諾方劑可以成功。

小便不利米歷

小便不利非小便滑利也做應出做也今從傷寒輪金匱要略中探錄给小便不利之方二十二 第四章 小便自利 遺尿 小便不利素羅 血尿

猎苓湯 桂枝加 通觀右舉諸方其最顯明者爲多用滑石蒲灰括董根龍骨、牡蠣等。使黏膜面滑利之藥物以國尿量之增加其牡蠣湯、大承氣湯、真武湯、大黄消石湯、茵陳蒿湯、桃花湯、桂枝去桂加茯苓朮湯 黄酱湯 甘草附子湯 栝養騷麥丸 蒲灰散 小青龍湯 滑石白魚散 越婢加朮湯 茯苓戎鹽湯 小柴胡湯 桂枝去桂加茯苓朮湯 葵子茯苓散 柴胡桂枝甘姜湯 四逆散 柴胡加龍骨 五苓散

中共有九方配茯苓焉。 枝者計七方。此因其氣上衝而起小便不利也小便不利之治藥中力最大而配用最多者爲茯苓計二十二方 次用大承氣湯、大黄消石湯、茵陳蒿湯下瀉之藥劑、以治小便不利、此亦堪注目者也。又此二十二方劑中。有桂

淋懸亦有實證虛證之分。於實證使用桃核承氣湯或大黄牡丹皮湯屢收良好之效果虛證用蒲灰散帰石 白魚散等。在虛實之間者。若苓湯最多。

血尿

尿中有血此從膀胱或腎臟而出者最多從膀胱出血者多用猎苓湯從腎臟出血者多用芎歸膠艾湯黄土湯 愈之

瀬 考

[內科摘要] 茯苓甘草湯治膀胱發咳咳而遺騎(遺尿)者也

(原著者按)老年婦人在冬期程氣管技炎在咳嗽之際稍稍努實往往還尿此即膀胱腑因發咳而還尿之

解也。

·醫學綱目〕 賢者湯治胞痺小便不通

(原著者按)賢著湯者苓姜朮甘湯心胞津者膀胱之麻痺也本方爲治胞痺小便自利之劑胞痺違於極度 則小便不通亦可治之

〔傳信尤易方〕 桃仁承氣湯治冰血有效

類聚方廣義〕 苓姜朮甘湯治老人平日小便失禁腰腿沉重而冷痛者又在十四五歲時無**還**尿之病者難

老人腰冷小便頻數或遺尿下腹動悸者。天雄散治之,治惟用此方加反鼻能奏效因證可加附子。

老臣之小便閉而奏效余用之以治遺尽慶見奇效。 橘蜜畫影〕 桂枝加龍骨牡蠣湯本治失精。一老醫用之以治老宮女之小便頻數和田東郭用之以治高槻

第五章 口渴 咽乾口燥

口渴

口渴與咽乾口燥似同而異前者欲飲湯水。後者雖覺乾燥但不欲飲水,向口內望之有濕者也西醫不重視其

口渴,大抵為陽證之微候,其治療目標在平消炎鎮靜。配藥以寒藥或冷藥為多傷寒論金匱要略中有治區别,大抵以叟羅特兒水與之。然我這則甚重視其陰陽之區别。 之處方十八悉焉陽證之治劑。 口 渴

黄耆芍藥桂枝苦酒湯 (身體腫發熱出汗之渴)

五苓散(脈浮數煩竭者出行而渴者渴而欲飲水者、入水則吐者水下後心下痞者與以瀉心湯而痞不解者。

遇而口中燥煩者小便不利者)

括董瞿麥丸(小便不利有水氣,其人若渴者) 猪苓湯(脈浮發熱渴欲飲水,小便不利者。下利六七日咳而嘔竭。心煩不得眠者)

小青龍湯(心下有水氣、乾嘔發熱而渴或渴或利)

小柴胡湯(或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛)

柴胡去半夏加枯糞湯(殪病發渴者)

柴胡桂枝乾姜湯(胸脇滿微結小便不利渴而不嘔)

白虎加人参湯(大斤之後大煩渴而不解脈供大者。表裏俱熟時時惡風大場舌上乾燥而煩欲飲水數升者)

生姜甘草湯(咳唾涎沫不止咽燥而竭)

栝葉牡蠣散(百合病場而不倒水者)小半夏加茯苓湯(先渴後嘔水停心下此屬飲酒家之病)

茯苓澤瀉湯(反胃吐而渴欲飲水者)

茵陳蒿陽(小便不利渴欲飲水者)

文蛤湯(吐後屬欲得水貪飲者)

猎苓散(思水者)

大陷胸陽(發重杆大便五六日不下舌上燥而竭者)

白頭爾陽(下利欲飲水者此係有熱者)

者基稀之故四逆湯則陰體之治劑也以附子較姜等熱藥構成此方若非下痢而失體液陷於陰體者戒用之以上石膏文蛤黄連猪茶彈瀉栝糞根半夏牡蠣山梔子黄蘗芒硝等寒藥冷藥占其大半此因口渴而屬陰證 其類似陰證而在發行嘔吐下痢之後發竭及內熱而好水者仍爲陽瞪此應明確區别者也

咽乾口燥

小建中湯(咽乾口燥)咽乾口燥必非腸證之標識左揭諸方。係治咽乾口燥者。

苓桂五味甘草湯(多唾口燥)

甘草乾姜湯(咽中乾)

大承氣湯(少陰病有二三日之口燥咽乾急者可以此下之少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥急者。

以此下之)

桔梗湯(咽乾不渴時出腥奧之濁唾者)

己椒歷黄丸(腹滿口舌乾燥者)

苦參湯(下部潰瘍則咽乾者)

爲口舌乾燥則余未遭遇焉。反證此則臨牀家所宜隨時注意者也桔梗場證爲咽乾甘草湯證爲咽痛而感輕微之乾燥己椒藶黄丸證之反證此則臨牀家所宜隨時注意者也桔梗場證爲咽乾甘草湯證爲咽痛而感輕微之乾燥己椒藶黄丸證之 出口故凡尿意類數有涿憑之氣味者亦能擴爲多唾口燥之症用此方能奏偉效大承氣湯亦治口燥咽 效易以大承氣湯三日即治又大承氣湯證之口燥咽乾與苦參湯證之因下部潰瘍而咽乾者適成有趣之相 其乾燥不僅咽口而已陽管內亦乾燥結粪者用之余嘗診一男子。誤口渴爲咽乾口燥與以白虎湯三週 其咽戟、大建中湯治屢屢咽戟口燥之症狀、苓桂五味甘草湯治口燥時唾液多而稀薄之症。口爲入口。尿道爲 咽乾不唾此爲可驚之一種急迫症狀宜用小建中湯甘草乾姜湯之類以甘草爲君藥使其飴而緩其急迫解 乾。但 而

咽乾口燥之狀臨牀家應毋忽忘

一所塞余可約述其語日。口渴

多陽瞪咽乾口燥有陽實證亦有陰虛證凡急迫症狀之有一

種徵候即屢現

亥款

第六章

咳嗽

前篇 第六章 咳嗽。

有痰曰咳嗽之分,其實咳不能全然無聲亦不能全然無痰此比較的無甚意味故不具論茲從傷寒論金匱要 咳嗽俗語也在傷寒論金匱要略中有咳咳唾咳逆等文字,豐玉案中有有聲無痰日咳痰隨聲出日嗽聲中

略中舉其治咳之方一十八種於左

苓甘五味姜辛湯(衝氣即低反之咳更甚者)

猪苓湯(少陰病下利六七日咳而嘔渴者) 小青龍湯(乾嘔發熱而咳咳而微喘者)

越婢加半夏湯(咳則氣上此肺脹也其人喘)

小柴胡湯(或者咳)

桔梗湯(咳而胸滿)

十棗湯(久咳家其脈弦有水氣者或係好飲家咳煩而胸中痛者)真武湯(此有水氣者其人或咳或小便利或下利或嘔者)

桔梗白散(咳而胸淸)

章莖湯(咳而有微熱胸中煩滿)

四逆散(其人或咳或悸或小便不利)

射干麻黄湯(咳而氣上)

夢歷大棗瀉肺湯(咳逆氣上喘鳴迫蹇)

皂莢丸(咳逆上氣時時唾 渴•

生姜甘草湯(咳唾烶沫不止)

栝葉薤白白酒湯(喘息咳唾)

青龍加石膏湯(肺脹咳而上氣煩燥而喘

厚朴麻黄湯(咳而脈浮者)

加石膏湯此應明曉 咳之性質者。即可無誤。厚朴麻黄湯無上氣之語。社言浮脈故上氣者不宜。方中有石膏與半夏即類似小青龍 中有大棗與半夏也寧歷大棗瀉肺湯者。夢歷與大棗也皂莢丸者皂莢與大棗也考此等藥物之效能而了解 陽等皆治咳而上氣或咳逆上氣者也越婢加半夏湯、小青龍加石膏湯者。中有石膏與半夏也射干麻黄湯者。 統觀以上各方。咳多起於上氣上氣者即氣之上衝也今從苓甘五味姜辛陽觀之氣不上衝則咳反之則 為特有之現象而配以特有之藥方者也越掉加半夏湯射干麻黄湯華歷大棗瀉肺湯皂莢丸小青龍加

上氣時反增病。 桔梗湯 桔梗白散 **鼙莖湯治咳時容易喀出如膜之停痰者但在咳時有力鎮其上氣者爲宜如用於咳而**

症狀真武湯以治弛緩性沉襄性非炎症性之症狀二者表裏不同也。 藥物悉爲冷藥或平藥後者爲附子之熱藥與生姜朮等之温藥所搆成猪苓湯以治炎症或興奮性緊縮性之 猪苓湯治下痢與咳與嘔者也真武湯亦治下痢與咳與嘔者也兩者一見類似其實正完全相反前者構成之

麻黄陽(無汗而喘者喘而胸滿者) 衛生寶鎰云喘者上氣急促而不能息之謂也傷寒論金匱要略中有喘喘息喘備等之語其治方如左

小青龍湯(或小便不利小腹滿或喘者,麻黄杏仁甘草石膏湯(出汗喘大熱者)

越婢加半夏陽(咳而上氣此肺脹也其人喘目如脫狀) 第六章

咳嗽

大承氣湯(短氣腹滿之喘)萬根黄連黄芩湯(喘而出奸者)

桂枝加厚朴杏子陽(太陽病微喘者)

栝葉薤白白酒湯(喘息咳唾)

木防己湯(膈間阻飲其人喘滿)

華歷大棗鴻肺湯(喘鳴迫塞)

竹葉湯(喘而頭痛)

厚朴杏仁汤萬根黄連黄芩湯竹葉湯等以治屬表之喘如大承氣湯栝葉薤白白酒湯木防己湯葶藶大棗瀉 統覽以上治喘之方不必限於麻黄或杏仁如麻黄湯麻黄杏仁甘草石膏湯小青龍湯越婢加半夏湯桂枝加 喘與表瞪之喘之緩急常異、大抵多有持續性而常少消長。 肺湯等以治屬裏之喘屬裏之喘應除去其腹內或胸內之食毒或水毒碱其腹壓或胸壓而至於消失裏證之

備考

傷寒緒論〕 大抵外感之咳嗽。當發汗以解之然亦有不發汗者經曰喘而小便利者及小便頻數者不發汗。

發汗則厥逆又咳時出汗倦伏苦滿者均可以小建中湯與之

(寶軒醫談) 咳逆上氣致面部浮腫者。世間醫者往往投以利水劑然無效也若與小青龍加石膏之類。 則氣

腫因氣降而退水腫因温散而自通利以愈矣

因外邪鬱結致陽氣難於表達而從心下推上復由於推上之水氣而起咳又因外邪難於表達而鬱於胸中致〔雜病紀聞〕 心下因滯水氣而起咳用小青龍湯半夏瀉心湯半夏厚朴湯小半夏加茯苓湯二陳湯等治之 氣道之津液黏濃而起咳。此種治咳之藥。宜先用治邪之藥,邪去則裏陽從三焦而達於表水氣與疼自除而咳

第七章 胃内停水(留飲)

胃內停水

是也。 療方針。據金匱要略云病痰飲者當以温藥和之是温散之藥即爲此病之藥無疑温藥何藥朮生姜細辛之類 胃內停滯水毒之謂也此有名爲心下痰飲者亦有名爲心下水氣者更有名爲心下留飲者意味皆同也其治

苓桂朮甘湯(心下有痰飲胸脇阻滿目眩)

澤瀉湯(心下阻飲其人苦目眩)

茯苓飲(心胸中有停痰宿水)

枳朮陽(心下有如盤之堅物飲水則作)

以上四方有术

小青龍陽(心下有水氣乾嘔發熱而咳)

桂枝去芍藥加麻黄附子細辛湯(氣分心下有如盤之堅物飲水則作)

以上二方有細辛

生姜鴻心湯(脇下有水氣)

以上一方有生姜

前篇

术之方劑使用於痰飲留飲停痰宿水水飲等證有細辛之方劑用於水氣或云氣分今從脈證方面觀之有水 治胃內停水,其方劑不止以上七方為說明上便宜計將右列方劑分爲三組即有朮者有細辛者有生姜者有 第七章 胃內停水 心下痞

生姜治水與治水氣者也其收水富於動揺性(术與細辛比較的非動揺性)在配劑中與朮辛均爲必要之方。 水不去反招上半身之浮雕(人参湯亦起浮腫)於此可知朮雖爲利尿劑而力不大也 易詞以言之細辛多治表水焉主朮多治裏水焉主余會對於脈浮數之患者以脊桂朮甘湯服後非特胃內停 而不言及小青龍場之脈證者以表不解者。當然脈浮也本草中言朮逐痰水細辛行水氣之語可以深思矣 中脈沉者用麻黄附子細辛湯脈細而欲絕者用當歸四逆湯脈浮者用厚朴麻黄湯脈緊弦者用大黄附子湯。 之方劑中言脈證者大半爲脈沉而用越婢加朮湯附子湯苓甘朮桂湯脈浮者有五苓散一方有細辛之方劑

心下痞

生姜與半夏同用可以止嘔吐乾姜與附子同用可止完穀下痢此即害動揺性而能收水之故。

宿者遭之意俗稱胸噎無食慾傷寒論金匱要略中言及治痞之方有七**。** 五苓散(未嚼碎之全粒咽下後成心下痞與以瀉心腸而痞不解者其人竭而口燥煩小便不利者) 小半夏加茯苓湯(卒然嘔吐心下痞膈間有水)

大黄黄連瀉心湯(心下痞按之濡)

瀉心湯(婦人吐涎沫服藥後心下即痞者)

附子寫心湯(心下痞復惡寒出汗者)

半夏瀉心陽(嘔而腸鳴心下痞者)

甘草瀉心湯(醫見心下痞之病未盡再與以藥其痞益甚者)

以上七方中前二方有茯苓後五方有黄連可知茯苓可治心下痞黄連亦可以治心下痞又從五苓散條下觀 之凡全粒咽下成痞瀉心湯不能解者五苓散可解之查近世有以黄連茯苓合組成方者偏覺傷寒金匱方中。 一方無以茯苓與黄連焉伍者要知二者之間藥能不同茯苓之味後黃連之味苦此爲其最大之相反點藥物

道里計也 以如黄連之多量苦味劑利水之流去血之滯開精神之鬱積者必多配以茯苓之劑其間效用之途正不可以 編云古人謂苦者能瀉能燥能堅淡者能利竅能渗泄此定則吾人固可以無條件承認者也瀉心湯一 類必配

心下痞之外,又有治心中痞者三方。

桂枝生姜枳實湯(心中痞諸逆心懸痛)

枳實薤白桂枝湯(心中落留氣結在於胸胸滿從脇下逆搶至心)

人参陽(同右)

病情深者宜用人参湯也。 就文字觀之爲用相同但從人參與枳實。朮與薤白乾姜與桂枝之藥效比較考之則就想像上可知凡屬緩而 從右方觀之可知心中痞者氣上逆鬱塞於胸而成爲痞也與心下痞之狀異枳實薤白桂枝湯镫與人參湯證

心下痞者以手按之數而不覺其硬者也又有所謂心下痞鞕者按之其硬如鞕然其處方亦有六

甘草寫が易(か下客便而帯) 桂枝人参湯(痢下不止心下痞鞭

大柴胡湯(心下痞鞭嘔吐下利)甘草瀉心湯(心下痞鞭而滿)

旋覆花代赭石湯(心下痞鞭)

木防己湯(心下痞堅)

小柴胡湯(脇下痞鞭)

人参但大柴胡揚中之枳實亦如其他方劑中人參之役務東洞翁云人參治心下痞鞕但逆之心下痞鞕未云 此外尚有瓜蒂散者治胸中痞鞕而病勢沉重從胸下至胸中者通覽右列六方除大柴胡湯外其他 五方均有

前篇 第七章 胃內停水 心下痞

以人参主治也

統觀以上心下落心中落心下痞裝盲及處治之方劑隱用人多枳實黃連黃芩茯苓半夏之類云

必先用撚紙之類稍稍通之而後用火與熱揚通之其理正同也。 之見證者宜先用滋潤温劑以擾亂之然後用下劑以除之以去其沉痼之疾是爲至要譬諸去烟管之烟膏者。 夏陽(或加大黄少許)燥痰用苓桂朮甘陽之類金匱云病痰飲者當温藥以和之信確言也但痰飲如有蚘蟲 「蘭軒聲談」 治痰飲者始用温散其次疎通其次燥痰先燥者則不適温散用敗毒散小青龍疎通用柴梗半

第八章 心悸亢進(動悸)

心悸亢進

名稱鴻尾之動悸心下悸也勝下之動悸縣下悸也傷寒論金匱要略中關於悸之處方十有一。舉之如左。 心悸亢進即動悸也悸者心動之謂或動氣之總稱故如單言悸即不限於心尖之動悸而有心悸騰下悸等之 桂枝甘草腸(發汗過多其人叉手則心自冒心下悸按之可得者)

茯苓甘草湯(厥而心下悸者)

半夏麻黄湯(心下悸者)

小柴胡揚(心下悸小便不利)

真武湯(心下悸頭眩)

炙甘草湯(脈結代心動悸)

小建中腸(心中悸而煩)

苓桂廿棗湯(臍 下 悸•

五苓散(臍下 悸。

小半夏加茯苓湯(眩悸)

苓此其爲悸必兼有桂枝甘草湯與茯苓二者之見證也 甘草證之悸究竟如何乎余敢焉之說明日桂枝甘草湯之悸者氣急迫的衝逆之時因衞氣外。凡有桂枝之方必伴以甘草由此可知悸之大半之方意胚胎於桂枝甘草湯不過茯苓亦得 類推可以推知炙甘草湯。小建中湯之悸之模樣矣。苓桂甘棗湯。茯苓甘草湯中亦有桂枝甘草同時配伍以茯 現悸之症狀者也發汗過多云云即指示同時衞力損喪之意故兩手交叉則心臟及胃部不能鎮其悸也由此 以上諸方中計有桂枝者六有茯苓者五桂枝茯苓均無者爲四逆散小柴胡湯半夏麻黄丸三方而除五苓 湯不過茯苓亦得治 弱而無抑制之力。 悸而已桂枝

意甚多治痞條中有「淡者能利竅能渗泄」此說亦可適用。 其周圍然不若桂枝甘草湯證之起於氣之衝逆也此將於結論中 茯苓證之悸爲體液(即血液與淋巴液)之循環障礙而起醫之水流在激湍之時遇岩石衝突則生波痕振動 詳述之此處徒增繁雜恕不具論用茯 苓之

後診察越婢加半夏陽瞪之患者後始能想像而得半夏麻黄丸瞪之心悸焉。 半夏麻黄丸瞪之心悸適反於桂枝甘草湯證之表虛而爲表實半夏之作用與桂枝異治一種之衝逆症狀此 在有半夏之各方劑中可以觀察而得之余對於半夏麻黃丸究以治何等之心悸爲宜久久有疑問積而

悸與茯苓證類似。 最後應注意者配用柴胡甘草之四逆散證及小柴胡湯證之悸均爲小便不利故用柴胡等疏通之劑此 宜参照其他症狀而識別之。 其爲

本間寮軒之說〕 前篇 第八章 治法第一 心悸亢進 宜鎮悸第二焉清血第三用滋養法鎮悸用鍼砂湯兼用鎮悸丸清血用黄連解 第九章 浮腫水腫

套湯合四物湯或用甲字湯合四物湯滋養用炙甘草湯或八珍湯,但此症若爲先天遺毒者不 甘草湯均爲滋養之法鎮悸丸者綠禁茯苓朮桂枝甘草也即茯苓桂朮甘湯加綠礬也。参也甲字湯者桂枝茯苓丸加甘草生姜也八珍湯者當歸芍藥散加地黄人參甘草去澤瀉也八珍勝與炙 原著者按)不治之發未見說明但臨牀之際就一二三次中可以區别之鍼砂陽者。脊桂朮甘陽加鍼 治。 砂人

第九章 浮腫水腫

浮腫水腫

皮水正水石水黄杆等名稱正水石水證治未見風水者其脈自穿骨節疼痛惡風之外證也而寸口之脈沉滑浮腫俗名也素問傷寒輪金匱要略等書中稱水氣後世稱水腫金匱要略水氣病脈證辨及治法條中有風水 皮水者。其脈浮有附腫之外證者也按之沒指不惡風腹如鼓之膨脹口不渴又曰口場而不惡寒者皮水也此液虛耗。而發惡寒之態者極虛症也以上所言風水。僅言水之表而不及裏 也又曰在太陽病脈浮緊者骨節疼痛者或身體不疼而覺重痰口不覺渴者風水也出汗可愈其發汗過度體 時身體腫而冷真元之氣已失全身知覺麻鈍矣間嘗攷之風水者水毒與外邪之結合也皮水者水毒停留於 者中有水氣也顏面腫大而有熱者曰風水眼瞼微腫頸動脈能見其動時咳按其手足直陷而不上起者風水 而不伴以外邪者也茲舉言風水及治水之方如左。

防己黄耆湯(風水脈浮身重出汗惡風者)

越婢陽(風水惡風一身悉腫脈浮不渴續續自汗無大熱)

防己茯苓湯(皮水之病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者)

此外有裏水者在先輩中往往誤爲皮水夫裏水不必水毒停滯於裏然較風水皮水所停之水確有較裏之傾

向。 裏水之方有越婢加朮甘湯與甘草麻黄湯

柴胡 張狀態。按之以指毫不凹陷。大小便亦不利。月經亦自舜腫以來而見少。**心** 此外又有血分之文句。金匱要略中有婦人經水不 日水分。在臨牀之際,全會屢遇此種患者。余又會診斷一心臟瓣膜症之處女。全身現強度之水腫皮膚悉呈緊 爲水故先因經水斷絕而後四肢浮雕致小便不通者名曰血分先 之障害而起水腫之謂也婦人良方中對此又有血分與水分之區別婦人 青龍湯等非特不能稍見其效且往往引起其他諸病之苦焉. 後完全恢復健康至今亦無何等之病所謂血分之腫者如投以木防己湯或防己茯苓湯或越婢加朮湯大 右舉風水皮水裏水之外尚其相似之 湯兼用桂枝茯苓丸數次寫下。尿量隨之增加前後數十次浮腫全去。經過兩週以後月經恢復如平常以 證此又可分以麻黃為主藥與以防己為君藥之二大別。 ·通町經血 不利則爲水名曰血分此 小 便不通後身體浮腫。 悸亢進呼吸困難胸內苦悶投以大 經水不通則化焉血 因月經閉止 而 致經水不 血 不適 通 因 者.

不多就余之見解當如左解釋之 金匱要略中對於氣分之說明。文字艱澀(譯者按日人多中國古文宜平有此語請讀者勿誤會)後世人言者

細辛附子陽者余則覺大建中湯亦可治之 氣分重者陰證之水腫也陽氣不足則陰氣內盛寒邪相聚而起浮腫患此腫者所謂冷性者居多脈沉細沉 或遲弱等之無力狀態浮腫亦軟以指壓之容易凹陷指滾多永留者治氣分腫之劑有用桂枝去芍 藥加

酒湯桂枝加黄耆湯等方劑 發熱出汗,其狀如風水,其汗沾衣則色黃如蘗汁,而身反不黄云治黄汗者當用黄耆配劑爲黄耆芍藥桂枝 黄汗狀似 風水其病身 體腫發熱出杆而渴汗滴沾衣色黄如藥汁栗園後田舜註云黄杆本屬濕 熱故 身體 膧。

以上述好腫療法之概略所謂雜 第九 斧腫水體 病中水病之證尤富變化且係難治故不憚援引二三先輩之經驗於備致中。

要領此不 田 東郭之說〕 第標 治 水 膧 水 而已雖謂故 膧 之病 無 萬病 病 症。 中 而 皆有 審 其 此三候亦 脈 症。 不 過三 無不 候。 可三候者 識 此 三候 何。施 楽可 日實 無 大 膧 之 遇 候。 是 爲 曰虚 療 冶 實間 水 廬 腫 之 之

日庫屋 種 者其壓 座之候是也。 多治 療易間

論質 原狀 不加 面 皮 履 者此二症· 是為 之腫 以療 診六診之中對於 屑 胸 現皺態者是爲 順症 勢堅。 治 背皆呈赢 也。 乏 之辨别次診察 手 履 按 狀此 瘦狀態是亦爲大虛之腫 之 大虚之腫 腎間之候與舌 則 凹陷。 腫次之虛腫又 辨虛實之梗 瘦也。 手離 其 《腫之虛實 又有 則 概 仍 色之候暨皮膚之候皆另有口 次之識此三候施 種其 也 復 亦 故 皮 (腫之 有虚 層之虛實舌色之虛實。 態。 兩者多屬 類 屋之屋. 形狀 似 內 與前 脹。 者心。治。 硬似 虚腫 樂 症相 然實腫中亦有塵在腹腰以下而上 可 治惟 石而易認為實 之腫 似 無勢其 傳又 極 **蚁堅** 多以腎間之動。 虚之 如石窟在: 有一種之隱其水不達 腫。 膧 人腫者亦 難於見效然此 和。 手按之其 而 腹腰以下在腹腰 後 有實 可知 跡 膧 名不 吾 之 留 而 部不 於 道 腫。 治 皮 中 不 其 之 災上不 故名 急 颹 廣 和 之表 復 類 可

症 病 尤 者甚 有虚 效乃知取用方藥至爲簡 胸 終於 感苦 束手 治水 背唯 實. 然實種之病亦 《莫教。 無策。 屨 东 惱。而 者 年 非 赢 此 全治之效甚 所 內心殊不自安於是更博蘭古人方籍始 宜 時余滿懷 深戒余 起於脾胃之虛故不可用 約而與 孫即幸而 積結。 此則 往年未能 大宜注意而 無數 欲葬另一 **泛**症 深考此 得效亦往往再起 **手段**以糾 相 辨 應縱橫施治迄今已五年於茲矣除極 因。 攻利之 凡 别 遷滿 從 | 劑致損脾胃 前療 了悟其病因於是更而 满種此時再投寫下之 **腫之症。必用巴豆甘** 治之誤經 用之不特 厳餘 遂 無益於病 薬其 桃花、 取捨 之時 虚之 其方 間。 (效與 牽牛 研 症不 前 之類。 且 法。 究 徴 損 IE 施 諸 逞 人 恰 同。 ₽蹲瀉下。 外。病 水 而 漸 甚。 而 膧 之

屑

南風 在 仍 下利後病勢已有轉機即宜對症而轉用和平之行氣利水劑此實為無法之法奇策而非常 涓 效者焉總之水腫 而開北窗之意)須勉力用對症之藥以通其小水爲要但在實雕之勢甚盛大 滴不利腹脹如鼓呼吸逼迫苦悶欲死者始不得不用甘遂未野醫被實桃花之類寫下之然亦不 在小水不利者從大便 《篇下亦》 無益。 (原著者按寫下却能 **延快小便但此** 小便均可 閉塞投以利水之 法也 正 所謂 宜多

之俘水者。虛像也懷防其凶。腫狀舌色與其他諸候均爲虛候而脈反弦緊洪大按之其勢強盛如丸粒之像者。 水腫之脈沉實有力者爲實吉脈沉微沉細而無力者爲虛凶虛浮浮大按之無精神有如風散木葉或如木

此猶之指頭彈極薄之竹篦極虛不治之脈也 故從略厚之白胎或黄胎而舌之四邊鮮紅如緋帛之鑲邊者或舌上無胎而乾燥如火者皆虛候也又無胎「重參及腫狀而辨其虛實倘胎白而呈枯骨狀之乾燥占多者大虛之症也黑胎亦有虛實二種此非口授可 凡水腫之舌。焉甚薄之白胎而有潤澤者實腫之輕症也厚白胎較重黄胎更重然虛腫之舌亦有白胎黄胎。 多往往形色相似而症紛易不易具戴要之舌候脈候為診斷諸病之標準不獨水腫爲然 有紫黑色之斑點者係虛候而有結構之舌也(無輪何病凡舌旁生紫黑之點者皆係結構之候)此外舌候尚 色殷然如乾燥之火之甚者或白灰色而甚乾燥者俱為極虛不治之舌又白胎黄胎或無胎而色赤左 石邊

·腫也宜仔細參及其腫狀與六診不可焜同。 |症者皆大虛之兆也又因尿量少而致大小便不分離大便中多水分而成下痢之狀者實腫也大便祕| 而大便祕硬者 實吉下痢者虚凶大便不下痢一日通五六次或一 畫夜發氣急五六次發則每催大便此

此症 無食慾者虛凶然亦有虛腫 亦宜參酌 不易治之症然十中亦有一二可数者此在平能否細細審辨其 **腫狀與六診以審辨其虛** 而 **貪食者此爲胃脾皆已虛損非吉兆也亦** 實 (為要。 有實

第九章 浮腫水腫

吐血

痰

血下

血者多屬

m

ぐ

凡病 時者脾氣不轉也脾氣不轉則水道不通故宜食淡泊之物而禁鹽味以利水道也此爲治療水腫之一大手段。 帶之鹽於冬瓜赤豆中蔥而食之亦佳鳥類魚鱉不可食膏粱之飯更不可食總之食淡泊之品則佳有飽滿之 凡病水腫者宜禁沐浴一入浴湯其腫愈甚即其水氣全消而 發者大凡水氣盘後輕者三十日重者六十日許然後可以入俗不可忽視。 水腫 之人。宜絕對禁食鹽味在麥飯中和以水燙海帶之汁食之最佳汁內如加蘿菔紫菜亦不 病愈亦勿早入浴湯若早入浴湯其腫往往有再 小惡或入海

凡病水腫者最宜謹絕房事彼無呼吸逼迫等及無苦惱之病人。在閑暇無事之時往往行動然情而犯同房之 發之處(東郭翁更揭示各種用方茲亦附於後可以參照) 多正多此居宜諄諄告誠于萬莫犯犯則水道不通利矣、大約在無水氣之後須謹守半年否則仍

雖雜症變化繁出畢竟不出此二道千金云水有十種,其中不治者五第一層黑者傷肝第二缺盆(鎖骨上 處則有窟鬆則隨手而起者陽水也脈沉小邊便溏尿膏。口不過,按其腥處則有筵手離猶不起者陰水也此外 水腫病者身有塘攤其塘處流水者 也)不平者傷心第三臟突出者傷脾第四背不平者傷肺第五足下平滿者傷腎此五症者實不治之凶症也 有持桂里之說〕 水腫之疾。古來名目甚多但要不外二大類日陽水日陰水凡脈浮大數尿赤口場。 凶即其瘡處並不自流而醫者或用鍼刺之使之流水迨夫水出腫消然其 按其 落

人亦隨之斃矣。 故大忌之且不止限於腹上也即一身中皆忌之 原著者按)今日之大病院中此種光景屢屢見之千金方云水病忌從腹上出水水出則一月之內外死矣。

麻黄附子肠

腫之俄然消退者獨在眉睫間此不可不留意也

桃花湯(桃花 大黄)

郁李仁陽(茯苓 杏仁 橘皮 防己 蘇子 郁李仁 或加桑白皮 檳榔)

此方專治上體之腫以心腹脹滿或氣短爲目標、凡樂之烈者治病亦遠如甘遂之煩桃花之場。營實之下重是

也都李仁能瞑眩然逐水則勝於諸藥云

蘇子降氣湯(參攷喘息條備致部)

導水茯苓湯へ茯苓 麥門冬 澤瀉 白朮 桑白皮 紫蘇 檳榔 木瓜 腹皮 陳皮 砂仁 木香

燈草)

水氣病過身洪腫反喘滿者連服此藥則小便利而病漸可愈脚氣腫亦用此方

治水之方中。配合麥門各者甚少往年有一男子通身洪腫諸藥不應有一奇士以生麥門各一物爲大劑濃煎

與之則小便快利而病全愈奇士云麥門各者逐水之神品也

(原著者按)與以麥門各則大便通利。小便快利。麥門各非逐水之劑然有潤滑組織之效從證運用使大

小便均通利病當然愈矣。

禹水湯(赤小豆 大麥 王篲 符苓 茯苓 牽牛子

實牌飲(蒼朮 白朮 厚朴 枳殼 陳皮 茯苓 砂仁、木香 香附子 猎苓 泽瀉 腹皮

燈草)

陸豆場(商陸 赤小豆 麥芽 蒼朮 厚朴 梔子 陳皮 甘草)

用此方者宜慎飲食否則無效混華有一有名之烏藥其方僅用赤小豆大麥地膚子三味而用時以禁食爲第 凡揚汁與一切下飯之物均所禁止僅食赤小豆與麥此其理甚大也

金苓散(蒼朮 第九章 陳皮 浮腫水腫 半夏 包香 甘草 猪苓 澤瀉 桂枝

茯苓

生姜

大棗)

此焉草醫所傳之方。平易簡妙會試驗於一二腫脹之兒果見奇效。

澤漆湯(澤漆 鯉魚 赤小豆 生姜 茯苓 人参 甘草)

諸凡腫脹屬虛者用此方有奇效產後水腫脚氣腫滿等用此方愈者數人矣方見千金

真武湯 虛寒之腫脹世醫無不用之

壯原湯(人參 白朮 茯苓 破故紙 桂心 附子 乾姜 砂仁 陳皮)

新久下則脾虚脾不能制水因成**腫脹多服此方有效**

加味腎氣丸(八味丸加車前子牛膝)

胃氣虛衰不能收攝水氣致腰脚泛腫此丸可以治之

麻黄連軺赤小豆湯 諸瘡毒內攻變腫者用此湯及連翹湯

連翹湯(連翹) 黄芩麻黄、升麻川芎、甘草、大黄

效至喘滿氣急者用建瓴丸紫丸之類以制之又此際已成越婢湯麻杏甘石揚等之症矣。 毒盛者加犀角反鼻其功更超絕凡瘡疥上因淋洗塗搽攻毒歸內而起腫脹者大抵不外古之二陽二陽猶無

勝勢飲(當歸 香附子 川芎 茯苓 蒼朮 桂枝 沙叁 木通 丁香 甘草)

婦人因積冷結氣而腫脹者用此方極妙。

防己散(防己桑白皮茯苓、紫蘇、木香、生姜)

妊婦腰脚微腫爲安產之佳兆不必服藥如小便不利週身浮腫可服此方。

(原著者按)妊婦之浮腫有陽水有陰水宜時時從證用方常用一方者每難奏效

琥珀湯(五苓散加琥珀 反鼻)

產後水腫以琥珀為專藥但反鼻亦有效凡瘡毒內攻之腫加反鼻於赤小豆湯中或連翹湯中其應若響故反

鼻實可謂攻葬之奇藥又產後水腫於服藥之外食水禽亦佳因水禽有利水之功此中尤以蒼鷺之功爲最大

此係友人屢試屢效之經驗。

赤小豆湯(防己 桑白皮 茯苓 **萨**歷子 杏仁 赤小豆)

此方用於諸般之水腫脹滿婦人胎水爲小林舜屢試屢效之方

另有一方用百部根 商陸 兔絲子 蒼朮 接骨木葉 赤小豆者此係吉益南涯家藏之方與前方之功。

堪爲難兄難弟

凡治腫脹(水腫之意)以圖利尿為上法攻下者為不得已之下策然觀今時醫生之醫腫脹者往往率意用下 劑不愈時則云自力已竭欲圖下洩已屬不及此天命也退一時之能促人於死猶委之天命不知其心中能自 禹水丸(鍼砂 禹餘糧 蛇含石焉主從證而加諸種之樂桂里偷盛推獎此方謂誠治水腫膨脹之神方也)

安否至於小兒之腫脹尤不得不慎用。 (千金方) (原著者按)桂里翁時代盛行所謂東洞流之治術有濫用下劑之癖故桂里東郭二大家均諄諄以此 久患氣急(呼吸促迫)而不愈則成水腫其皮中之浮水攻面目身體從腰上腫用甘草麻黄陽以

發汗可愈

(千金翼) 麻黄湯(麻黄甘草湯)主治風濕水疾身體面目腫脹不仁

[醫宗金鑑] 水腫之症兼咳嗽腹中之動氣甚者爲必死之趙。 小青龍湯對於雜病之膚脹水腫者用以發汗利水有效。

〔類聚方廣義〕 療治茶談 妊娠每現水腫因而有流產者不用逐水之劑而以葵子茯苓散煎服之挾喘咳者合甘草麻

黄湯服之

苓姜朮甘陽中加杏仁名腎著湯治妊婦之浮腫小便自利腰髀冷痛喘咳者有效。 第九章 **俘題水腫**

產後現水腫而 有腰脚冷痛小便不仁小便不利之狀者八味丸可食

加朮湯或合葵子茯苓散亦佳。 栗性薄弱之婦人。妊娠每現水腫因而有流產者如用越婢加朮附湯、木防己湯等即有墮胎之虞此宜用麻黄

妊婦浮腫喘咳息迫或身體麻痺或身體疼痛者麻黄杏仁薏苡甘揚可愈

從何審辨爲太陽病之熱乎少陰病之熱乎抑或陽明病之熱乎傷寒輪金匱要略中關於熱體之用方甚多茲 從證歸納而採擇之如左 無關反之。皇漢醫學上,將辨爲陽證之熱平陰證之熱平。實熱平。虛熱平更進一步,如巳認爲陽證之熱者又將 為型熱勢熱型分稽留熱光張熱間歇熱熱勢分亞熱輕熱中等熱高熱過熱但此等分類法與直接治療法者不必達體温計之標準始謂之凡局部之有熱感者亦可謂之熱同時熱之云云即寫今日炎症之意西醫别 熱爲陽證但亦有陰證之發熱者大凡陽證及實證者易伴熱陰證及虛證者易伴寒皇漢醫學要訣云所謂熱

黄耆芍藥症枝苦酒湯(奚熟出汗口渴)

桂枝二越掉一湯(發熱惡寒多熱少寒

桂枝麻黄各半湯(發熱惡寒熱多寒少)

桂枝湯、喬番惡寒淅淅惡風禽禽發熱頭痛發熱發熱出汗頭微痛惡寒時時有熱

桂枝加黄耆湯(發熱)

若苓湯(脈浮發熱) 五苓散(發熱頭痛發熱)

麻黄湯(頭痛發熟無什發熱身疼痛)

小青龍湯(心下有水氣乾嘔發熱而咳咳而微喘發熱不竭麻黄附子細辛湯(少陰病始得之反發熱脈沉)

大青龍湯(發熱惡寒身疼痛)

小柴胡湯(嘔而發熱者傷寒蹇後更發熱者)

柴胡桂枝湯(發熱微惡寒支節煩疼)

厚朴七物湯(病腹滿發熱十日脈浮數)

調胃承氣湯(太陽病三日汗發不解蒸蒸發熱者屬胃也)大黄附孑湯(脇下偏痛發熱其脈緊弦此寒症也下温藥治之)

大黄牡丹皮湯(時時發熱自出汗復惡寒)

四逆湯(吐利出汗發熱惡寒四肢拘急手足冷厥者)

栀子蘗皮湯(身黄發熱者) 真武湯(太陽病發行汗出不解但仍發熱)

麻黄杏仁薏苡甘草湯(發熱日晡更劇)

消石攀石散(黄家日晡所發熱惡寒)

大承氣湯(發熱多汗)

三七

寒熱 小柴胡湯(往來寒熱胸脇苦備)

柴胡桂枝甘姜湯(往來寒熱心煩者

大柴胡湯(往來寒熱)

潮熱 柴胡加芒硝湯(潮熱)

大承氣湯(短氣腹滿而喘潮熱日晡發潮熱不惡寒觀語潮熱不能食者

小承氣場(輟語發潮熱脈滑者

大陷胸湯(日晡稍稍潮熱

煩熱 小建中湯(手足煩熱)

八味丸(飲食如改煩熱不得臥)

小柴胡湯(四肢苦煩熱)

栀子豉湯(煩熱胸中窒者)

温經湯(手掌煩熱)

瘀熱 茵陳蒿湯(渴欲飲水者此瘀熱在裏也)

麻黄連輕赤小豆湯(瘀熱在夏身必發黄)

熱入血室 小柴胡湯(熱入血室其血必結故發作時如煙狀)

身熱 小柴胡湯(傷寒四五日身熱惡風)

栀子或湯(傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者)

梔子乾姜屬(傷寒醫用大下之丸藥身熱不去微煩者) 白虎加人参陽(熱結在內表裏共熟)

三八

周胃承氣易(不惡寒旦熟)白虎加桂枝湯(身不寒但熱)

四逆湯(出大杆後熱不去者)調胃承氣湯(不惡寒但熱)

通服四逆湯(裏寒外熱)

微熱 五苓散(微熱消竭・梔子豉湯(熱在外者)

小柴胡湯(身微熱)

大承氣揚(時微熱)

四逆湯(治身微熱見厥者)

章莖湯(欬微熱)

潮熱此 熱如太陽病之熱狀極不能 用小柴胡湯均發熱之症也而用熱認定為陽熱更觀陰虛證之發熱用四逆湯或真武湯其發熱也咸惡寒發 通覽右列表實證之熱用麻黄湯表虛證之熱用桂枝湯陽明病之熱用調胃承氣湯大承氣湯治少陽 此外尚有越婢汤及麻黄杏仁甘草石膏汤以治大熱之語大熱者體衰之熱之意非熱大之說也 種病症欲擬對症之方不得不先明脈狀矣。 般的定方。余於臨牀時。會屢見陽明病或少陰病者亦惡寒發熱或往來寒熱或 病 之熱

傷寒雜病辨證日蓋發熱一證頗多類似脈浮而緊發熱惡寒者傷寒之候也脈浮而數發熱惡寒或有痛處者 弦發熱惡寒或思飲食者化為煙疾之徵也能辨此脈又能辨驗其證者方可無誤 癤之兆也脈浮而 按之反濇發熱惡寒或膈 內實而嘔吐者傷食也脈浮而滑或頭眩嘔吐者風痰也。 脈呼

前篇 第十章 熱

來寒熱者寒與

熱相

往來也寒去則熱現熱往則寒來雖如發熱惡寒但熱與惡寒不同時此

往來

寒熱者示

邪在少 〉陽部位 也柴胡樹可治之故小柴胡 湯 爲少陽 病正 面之治方。

結在裏者也往來寒熱屬少陽為柴胡之正證若表證則多加桂枝裏證則多加大黄是其大法也 熱是皆專治 疾 辨證 邪在 日小柴胡湯用於往來寒熱柴胡桂枝乾姜湯用於但頭犴出之往來寒熱奔豚湯用於往來 少陽者也一主胸脇滞微結一主胸腹之痛。但俱無下之之法大柴胡湯之用於 往來寒熱熱

潮熱者如海水之潮水時身體手足胸腹中無不充滿其熱故日潮熱此爲邪氣熾盛於陽明部位之徵應用大

黄芒硝之配齊

傷寒雜 煩熱者用小建中場八味丸小柴胡湯梔子豉湯温經湯以上五方前已分列主治病症則煩熱與潮熱 未入之兼少陽證者也先當和解其外若小便利而大便製者攻之但痨瘵(肺結核)而潮熱者必屬虛 為陽虛(有時陰虛亦有此苦) 自明即潮熱者概爲陽實證煩熱者悉爲虛證有手足煩熱者有四肢苦煩熱者有手掌煩熱者手足煩熱者多 病辨證日潮熱者邪氣入胃而現之證也若 脈浮而緊潮熱下痢或小便難出大便溏者邪 氣 入 **二之相異** 胃

不可混 心煩熱蓋煩擾者無奈何之義也又有僅僅足下熱或足心熱者此皆係胃中蓄血所致與手足煩熱相似 寒雜病辨證曰煩熱者熱之苦煩者也其症在心胸之間如蒸如燃熱氣佛聽煩擾不能安靜也有手煩熱

煩熱而 故始法亦有陰 臥者用八 之所致也。 中窒 味丸是皆在心胸之間其因有三一因下汗後虚邪湊於心胸一因風氣優心一因氣上而不能下運 墨者用梔子豉湯煩熱而心亂者用三黄湯(指金匱中風歷節病編之千金三黄湯)煩熱不得 陽之别手足煩熱者用小建中湯四肢苦煩熱者用小柴胡湯手掌煩熱者用温經湯皆屬四

瘀熱者用茵陳湯、麻黄連軺赤小豆湯、此二方治黄疸均有效、蓋黄疸者瘀熱在裏而發者也瘀熱鬱於裏故發

瘀穢之熱也熱入血室者所謂血熱也熱與血之結也

因身熱係裏熱非表熱也故不當與以瀉下之劑 身熱者用小柴胡湯梔子豉湯梔子乾姜湯潮濕可下而去之身熱則雖下而不能除故雖大下之後身熱不去

傷寒雜病辨證日身熱者大(大者大表之大非大小之大)熱也太陽上黛云身大熱者其病屬陽明與微熱相 反微熱者熱潛在裏也身熱者熱顯於衰也中西深齋云身熱者胸腹常熱熱在肌膚其人身重而微煩云

熱也自虎桂枝湯證之熱身不寒而但熱之身熱也梔子豉湯證熱於外之身熱也四逆湯證之熱出大奸而熱 熱之含義甚廣不能一例而論宜考其前後而後能判其爲何種之熱白虎湯證之熱熱結在裏表裏均熱之身 身熱者邪氣傳於裏而未實也表裏俱熱。但純裏熱甚輕耳此外尚有表熱外熱之名亦屬身熱均不用下法。

微熱者有五苓散小柴胡湯大承氣湯四逆湯葦莖湯諸方、柴胡桂枝湯用於寒多微熱微熱者無熱之謂有陰 不去陰證之發熱也通脈四逆湯證亦陰證之熱也。 有陽有虛有實參考其他之症候始能知其如何之種類爲

傷寒雜症辨證日微熱亦屬裏熱微即幽微之微隱邃而不大顯之義熱微如無之謂也

第十一章 不眠 議語 狂 癎

獲賽等而不能眠者亦有種種傷寒論金匱要略中言及不眠之方有五 不眠有努力不眠無心眠及不能眠(因疼痛瘙癢等)眠之不能久者多為狂者之症狀當於次條論之因疼痛 栀子豉湯(發汗吐下之後虛煩不得眠劇者必反覆類倒心中懊躁)

第十一章 不眠 課語 左 掏 棄仁湯(虛勞虛煩不得眠

猪苓湯(少陰病下痢六七日欬而嘔渴心煩不得眠者) 乾姜附子湯(下後復發牙畫間煩躁不得眠夜間安静不嘔不渴無表瞪脈沉微身無大熱者)

皂莢丸(欬逆上氣時時唾燭坐不得眠)

當務之急也 云虚勞云云下之後虛煩云云對於最初或奸吐下者排除病毒不留體內反覆丁寧要之從證驅逐病邪實爲 上列五方中。末二方因欬而嘔渴或欬逆上氣而不得眠在本章之範圍外通觀其他三方爲發汗吐下之後云

鄭聲由於虛宜用温藥白通湯主治之證語者為實調胃承氣湯主治之此不過一例耳茲舉傷寒論金匱要路 傷寒論云實時爲讝語虛時爲鄭聲鄭聲者反覆重言其聲無力而低精氣虛也活人醬云病人有鐵語有鄭聲, 中言及治議語者共六方如左

柴胡桂枝湯(發汗多亡陽讝語者與柴胡桂枝湯以和其榮衞通其精液後自愈)

柴胡加龍骨牡蠣湯(傷寒八九日胸滿煩驚小便不利讝語週身覺重不能轉側者)

白虎湯(三陽合病腹滿身重難於轉側口不仁面垢讝語遺尿發汗則讝語下則額上生汗。三足逆冷或自汗

(陽明病,其人多汗以津液外出故胃中燥大便必鞕鞕則臟語此以小承氣湯焉主)

調胃承氣湯(或胃氣不和識語者調胃承氣湯與之) 大承氣湯(陽明病識語有潮熱不能納食而胃中必燥屎五六枚或有能納食而屎鞕者)

小承氣湯

統観以上柴胡桂枝湯與白虎陽亦可以治讝語則讝語一症即非實證矣此點先醫論點亦稍有矛盾矣

狂癇

癎 概起 於氣與血之 變傷寒論金匱 要 略中有治方二

抵當湯 桃核 一下乃愈太陽病身黄脈沉結少腹鞕小便不利者非血證也小便自利其人如狂者血證也當湯(太陽病六七日表證仍在脈微而沉反之不結胸而其人發狂以熱在下焦故少腹故不無緣(太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下則愈) 其人發狂以熱在下焦故少腹當鞕滿 心病自利

血

除右二 方之外又有防己)地黄 湯亦係驅瘀血之劑大有注意之價值此外可參用讝語條下所揭之方劑。

心氣不定之瀉心湯等因讝語亦屬狂之一症而心氣不定亦現狂人之徵候也

桃核承氣湯抵當湯均爲驅瘀血之劑前者用於輕症後者用於重症似狂者用前者發狂者用後者余嘗 者用抵當湯似狂者用桃核承氣湯之區别矣。至於患者大便鞕,小便自利云云可不拘泥於文字云。 先以抵當湯與之不效轉而用桃核承氣湯(腹證上無桃核承氣湯之證存在)即見輕快從此一例可知 二十九歲之婦人。產後八個月(此期間無月經)而發狂、入精神院而不效。迨後亦經過不少醫師終 於無效余

考

緩體而似輕者能治者甚稀治後亦有一 [本間棄軒之說] 狂爲腦之變證即腦病也故多難治者此有緩急二症急發之證及似甚重者大抵可治其 旦復發者狂者初雖不死但稀有不死者熟察其脈證即 可判断 其生

急發者 便 與之則以 有安靜 自 面 在若走獄飛鳥力倍於平常二三倍往往兩三人不能制止見人時不論親疎往往轉出名陽在,其初因思慮過度日夜不眠。遂致精神錯亂此證行走漫無定則有時踰牆越 或 者但 咬其衣狀類風犬有時或歌或笑或哭或拉或現恐人捕捉撫手防禦之態或發被人殺害之疑。 後雖 不能 遇無毒之飲食亦噤口不敢嘗食矣眼生稜角之光舌上作白胎或黑胎乾燥 第十一章 保持其較長之短時間飲食倍於平常往往放飯流啜對於藥品每認爲有毒不 不戰 證話 产 滔 越窗有時 晋漫 而 罵 登屋 強制之則

敢

身體

中略) 腫之證小便不利者用牡蠣龍骨鉛丹等鎮墜之劑此亦因上衝而小便不利也凡陽狂之證治宜先與吐 緩發者即陰狂其證好閑居獨處不願近父母妻拏終日默默若有所思心氣不定言語錯亂有時聞輕微之音 人來捕捉有時懼 即驚而或躍 便 動 档 髙。 服藥用柴胡加龍骨牡蠣湯三黄加辰砂湯大柴胡湯黄連解毒湯等渴者用參連白虎湯(中略) 遠因 脈 弦 其一身中之水分。 數大 或走又處處有慮人誹謗自己之疑自身作羞愧無可處置之狀語之則恨不能刺咽截腹有時恐 便秘結小便遠者二三日不出其初小便不 被人殺害此名陰症(中略) 盡被氣化而 表散不到膀胱故也柴胡桂枝乾姜肠柴胡加龍骨牡蠣肠條 松下腹亦不 急脹凡悸動高 之氣上衝之病 芸不

骨牡蠣湯與寧心膏夜間眼氣清朗不能稍睡者用酸棗仁湯温膽湯竹茹温膽湯、 陰狂禁吐下二法及灌水等之攻擊思慮反覆不止者用半夏瀉心湯加茯苓有神驗驚怕甚者兼用柴胡 女子戀愛男子不能達意至於發狂者名為華瘋亦名花嫩(華與花通)其證亦有陰陽可用前之治法又妊娠 加大黄或哭或笑或歌或悲者用甘麥大棗湯(下 產後發狂者其治法亦可用前方血熱不解者用加 略) 味逍遙散惡露不盡而發狂者可用桃核承氣 加減温騰湯(中 加 龍

持桂里之說〕 按桂里翁之輪癇中有癡狂驚悸不緩健忘奔豚故其所謂癎非今日狹義解釋·草生姜也逍遙散者柴胡芍藥茯苓當歸薄荷白朮甘草生姜也。(黃連大麥門冬甘草生姜也加減温膽湯者竹茹枳實橘皮半夏茯苓酸棗仁黄連遠志)温膽湯者半夏枳實甘草竹茹生姜橘皮茯苓也竹茹温膽湯者柴胡橘皮半夏竹 茹茯苓香附子、枳 遠志菖蒲丹砂、

之管見先達之士已辨之審矣 癇之症狀千端萬倪不能一一縷皋其大者有六其中奔豚一病。古來雖自别爲一病。要之亦癇之一症此非余 有持桂里之說〕 之 癎。

麥運湯 俄然直視煩悶者先投此湯或加吳茱萸或加熊膽汁。

癲狂癇凡熱寰者總用此方吳山甫云治心火胸膈實熱而面赤狂躁者**。**

黄連解毒湯 無可笑處而頻頻爲可笑之狀者癇也此心火也用此方以撲其婚其病自止

大黄一 莫如大黄一物湯云云。又虞花溪亦有頗者吐狂者下之語。因恍然於二症療治之梗概且悟到頗亦可下狂亦 村氏。其後涉獵聲籍不見是說最後在邵氏明聲指掌訂補中得見一語云,大抵狂病宜於大吐下。而吐下之效。 物湯 江州民間所實之狂藥即是此藥此藥非多飲不效故宜多煎以代茶飲余嘗得自江州鄉

可吐之理是在因時制宜而已

柴胡加龍骨牡蠣湯。此方以胸满煩驚焉主症其餘皆爲客症。

鵲石散(治傷寒發狂或棄衣奔走或踰牆越屋之病,用黄連寒水石各等分、細末。濃煎冷卻後以甘草湯飲服

之每次二线)

麥門冬 癇疾其人不實難於用瀉心湯。鵲石散者用之此有止逆下氣之效。

風引湯 大黄 龍骨 洼枝 甘草 牡蠣 寒水石 滑石 赤石脂 白石脂 紫石英

石膏

各六兩)

熱魔癎奇疾也然亦有奇藥可以懷之所謂詹公之釣干載之鯉不能避 也。

余嘗治一洛西人年弱冠久患此症頭面歌糾,手足擊縮其狀恰如異形奇態之傀儡季醫用盡其技莫之能

爲期經過二三年。最後求治於余。余以此湯與之。一服即治其半四五旬後諸症盡去復態如常人咸驚 小兒之驚痼漠痰。 (於癇者搐搦症也寒痰者) 足牽引為或伸或縮之頭振也以上如腦膜炎之病狀) 每日

瓜蒂散

發作數十次者或亦能用此方教治之

桃核承氣湯

前篇第十一章不眠。 福語 任 胸門

抵當湯

鷓鴣菜湯 治蚘蟲之劑。

酸棗仁湯 酸棗湯(酸棗仁 桂枝 生姜 石膏

甘草瀉心湯

竹茹温膽湯(柴胡 香附 人參 黄連 甘草 桔梗 陳皮 半夏 竹茹 茯苓 枳實 大棗

茯苓

知母

甘草

人参見干金方)

生

姜治傷寒日數過多其熱不退廢寐不寧心驚恍惚煩躁多痰不眠者)

半夏

高枕無憂散 (陳皮 茯苓 枳實 石膏治心膽虛怯晝夜不睡。

竹茹

麥門

之, 桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 不寐之人徹夜一目不眠如及五六夜必發狂如恐其發亟以此方服 龍眼

甘麥大棗湯

茯苓甘草湯 心下悸者大率層癇與飲此方中加龍骨牡蠣絕妙此方又可治不寐之症又凡用酸棗仁湯或

歸牌湯不愈者用此方屢奏奇效此係余之經驗。

茯苓桂枝甘草大棗湯

苓桂朮甘湯

真武湯

歸牌湯(人參 茯苓 龍眼肉 黄耆 酸棗仁 白朮 木香 炙甘草 生姜 大棗)

人生經多年之苦志辛勞而致健忘者此方大有效驗

牡蠣奔豚湯(牡蠣 奔豚湯(桂枝 桂枝 李根白皮 半夏 甘草 甘草 吳茱萸) 可療奔豚氣從小腹起直撞於胸手足逆冷者。)

蝮蛇起廢丸 因

胡加龍骨牡蠣湯等。急病者。其治亦速緩症者則反費工夫。其經有年有月之滯患者多不治婦女因經閉而起 煎藥可用甘連大黄加石膏湯石膏黄連甘草湯白虎加黄連湯瀉心加辰砂湯大柴胡加鍼砂湯大承氣湯柴 將桶慢慢傾倒使水從桶嘴漏下人下水水由頭頂壤至兩層胸膈可愈心胸閉塞之症以瓜蒂散吐之有奇效 香可用桃核承氣湯抵當丸。 尾臺榕堂之旣〕 發狂之陽證者濕布水有奇效無濕布之處可用四斗之桶吊於高棚之上桶中盛備以水。蟲咬或觸毒而起癲癇者若其人未滿三十歲者用此方得效。

家之藥、凡上衝眩運耳鳴胸腹動悸要寐驚起精神恍惚等之症或無故悲愁者亦可從證擇用。 [蘇軒醫談] 類聚方廣義〕 產後不眠百治不效問之病人覺胸中煞刺煞剌而空虛以致不眠者名曰痰飲係蛻蟲之所爲 桂枝加龍骨牡蠣湯桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯桂枝甘草龍骨牡蠣湯三方所謂治癎

可與黄連阿膠湯每藥一碗用鷄子半個。三碗即得安眠此方用在下血多而不眠者亦有效但未試過。

第十二章 胸痛 腹痛

份寒論金匮要略中言及治胸痛胸痺脇痛心痛心下痛心中痛之方有二十二列皋之如左

小柴胡湯(脇痛脇下满痛)

十衰竭(脇下引痛胸中痛)

當歸生姜羊肉湯 (脇痛)

大承氣場(心下必痛)

(心下痛按之如石製)

第十二章

括養薤白半夏湯(心痛徹背者胸痺、小陷胸湯(在正心下按之則痛)

甘草粉蜜湯(心痛發作時)

桂枝生姜枳實湯(心懸痛)大建中湯(心胸中大寒痛)

走馬湯(心痛)

赤石脂丸(心痛微背背痛微心)

九痛丸(治九種心痛)

調胃承氣湯(胸中痛) 大黄附子湯(脇下偏痛)

括漢薤白白酒湯(胸背痛胸連)

大柴胡陽 (心中結痛)

樹皮枳實生姜湯 (從脇下逆搶至心)

人参湯(胸痺)

茯苓杏仁甘草湯 (胸潭)

枳實薤白桂枝湯(胸痺)

薏苡附子散 (胸連)

以上諸方劑與次舉腹痛條下諸方劑比較之兩方共通者有二三此外又有柴胡桂枝湯之治心腹卒中痛情 急丸之后心腹脹滿卒痛如錐刺等。又心與胸之部位完全同數抑不同數者謂同則何以又有心胸中大<u>寒痛</u>

腹平抑自腹至胸乎抑或常限於一局部乎不拘泥於部位實招誤治之基也。 甘遂大戟之組合為利水效藥附子乾姜屬城吳茱萸之為熱藥甘草蜂蜜飴之以治急迫等。在文字上對於心 痛亦各有不同之目標在實際臨牀時亦應審辨其痛究為陽性抑爲陰性爲實證抑係虛證痛之放散自胸至 處亦迄未能釋然也此則稱好姑置之耳。通觀右方如大黃芒硝之配爲冷性下劑巴豆之配爲温性下劑,芫花 云云,中抱此疑問數年來迄不得解釋或係心之病位深胸之病位淺即或胸近於表心近於裏數然經種種

腹痛

烏頭桂枝湯 (腹中痛)

小建中場 (腹中痛)

小柴胡湯(同上)

黄連湯 (同上)

芎歸膠艾湯 (同上)

當歸生姜羊肉湯 (寒疝腹中污痛腹中痛)

當歸芍藥散(腹中污痛腹中痛)

當歸建中湯(腹中刺痛)

烏頭湯 (腹中絞痛寒疝)

土瓜根散 (少腹满痛)

大承氣湯(腹中急痛)

大黄牡丹皮湯(少腹腫痞按之即痛。

枳實芍藥散 (腹痛)

新篇 第十二章 第十二章

胸層

腹肩

四九

瘀血 脈四逆湯(同上) 湯 (同上)

真武湯 (同上)

桃花湯 (同上)

大烏頭煎(腹中繞臍痛。

附子粳米湯 (雪鳴切痛)

大建中湯(出見於皮頭足上下不能觸近之痛

烏頭煎 (寒疝)

奔豚湯 (上衝於胸之腹痛

紅藍花酒 (腹中血氣刺痛

腹痛與腹中痛異此與咽痛咽中痛之異點相同但丟人於臨牀之際對此區别之點每每發生矛盾云 之膨出。寒疝起於水毒(或水毒與瓦斯相混)而常發動腸疝則瓦斯排出即消散如釋故寒疝遇温則輕快遭 疝痛用當歸生姜羊肉湯烏頭煎鳥頭湯污痛用當歸生姜羊肉散當歸芍藥散薑疝痛之痛其痛之局部 寒則憎惡是以配以熱藥温藥之方劑也污痛則在塞處無理押進時所起之痛也起時每每件以寒疝不 過可 如山

區别者為狹處似有何物欲爲無理之通過之感而已

以污痛故配用冷藥及寒藥之方劑(參照膽囊炎膽囊結石 一輪。金匱要略中祇言寒疝而不言及治熱疝不過在隨實炎或膽囊結石之際所見之痛。即熱疝也嚴厚件 之疝與今日西醫之神精痛烙伊麻甚斯相等 條。

備

五〇

篇云真心痛手足清至節心痛甚且發夕死,夕發且死此症雖亦有綿延二三日者但危急之症其痛異常往往 門專胸脇痛之源有從痰飲來者有自痃癖起者有起因於蚘蟲者又有真心痛者此係另一種之劇症靈樞厥 **輟轉狀第痛之地位大抵在膻中間亦引擴至左右凡脈結代者極惡之候也(大塚日真心痛等於今日之狹** 〔有持桂星心痛之旣〕 心痛胸痺結胸其脈其症雖有異同然皆心胸之病也脇痛亦不外是故茲包括爲

之病輕者即今之胸滿輕者即今之胸痛此非奇異之病。能自在運用藥方不多勢作,病自可愈 胸痺之病輕者僅胸中氣塞而不痛金鑑云胸中急痛者胸痺之重者也胸中氣塞者胸痺之輕者也又曰胸痺 結胸者其痛從心下而迄少腹也主在心胸故不結胸。

心症)

桂枝生姜枳實湯(心中痞諸逆心懸痛)

此方不必定拘於痛心胸痞塞即可用之凡心胸痞塞者與以此方得忽斃寬鬆焉。 凡逆於心脇者不論何病總稱諸逆也苓桂朮甘湯治心下逆滿者也枳實薤白桂枝湯治脇下逆搶心者也唯 有以逆註釋爲痰飲客氣者余未認爲的確蓋逆之云云義即上犯譬諸懸物必從上懸其向上者方可稱逆故 心中落即胸搏也諸家學說或云水逆火逆或云上逆吐逆嘔逆上逆者以桂枝治之吐逆嘔逆以生姜治之又

千金陷胸湯(栝葉實 大黄 黄連 甘草)

小陷胸陽

此在大小陷胸陽間之症用之極效主治胸中心下結積又飲食不消而痛者亦有效

大陷胸湯

甘草乾姜湯 。薤白桂枝湯 疝癥水飲之症心胸痛服苦味之藥不解者用此甘味之藥有意外之效。 此方治心中痞氣結胸滿。自脇下衝至心者。

前篇 第十二章 胸痛 腹语

茯苓杏仁甘草湯 治胸痺之輕症

小柴胡

薏苡附子散

篇目余亦祇好顰而效之耳。 [有持柱里腹痛之說] 腹痛病症也非病名也係兼諸病之症候不能别設門類然先哲之方書中處為特立治尤為的切其方在外臺中引千金之附子丸附子者。能治胸痺心痛者也。 九痛之用。詩於千金金匱程註云九痛者分為九種之痛也不外積聚飲痰血結蟲注寒冷此說於療

小柴胡揚 凡腹痛之於左脇者柴胡主治之但宜參酌用大柴胡揚(心下端痛)四逆散(腹中痛)柴胡桂枝小建中湯 腹中急病者小建中湯主治之凡小建中之腹候治之甚易但稀有無柴胡者

痛屢屢用柴胡劑治之也。大塚日。柴胡治左脇之痛對於右脇之痛則不效。此係桂里舜之說。自此以後咸寒爲定例矣。然余對右脇之大塚日。柴胡治左脇之痛對於右脇之痛則不效。此係桂里舜之說。自此以後咸寒爲定例矣。然余對右脇之

桂枝加芍藥湯

湯(心中卒痛)之類

黄連湯 此方用於心下中腕間之痛有嘔氣者為良或外邪兼宿食之痛或發瘡疹之腹痛者用此方皆有效。 桂枝加芍藥大黄湯 此係桂枝加芍藥症內實之治方痢病初起腹痛甚者用此方隨手可愈又疝癥之腹痛

大建中湯 大建中湯之痛從腹而至胸者。

附子粳米湯 甘草粉蜜湯 此本為治蟲痛之方其因飲水而腹痛者后用之亦甚有效此樂用後即手足身體發腫胃氣快 腹中寒氣者病因也雷鳴于下者病症也今觀此病多因於水飲與寒疝可名爲腹中寒氣云

愈者以後永不再發矣此真百試百效之神方也 復者住兆也其所現之浮腫不宜遠用利水之劑經日自能消散倘經日不消始可與腎氣丸大凡一經發題而

4

備急 丸 水 承 氣 湯

第十三章 腹滿

腹滿

尨隆忽而輕減按之抵抗弱而無底力者也陽實之脈緊遲或沉實而有力陰虛之脈則現遲而微弱或浮而微 腹满亦有陰陽虛實陽實之腹滿不似陰虛腹滿之隱見出沒且按之緊張而有抵抗者也陰虛之腹滿則忽而

弱 等。

劇同出一軌傷寒金匱之方中言及腹满者有左列二十五方。 陽實之病當下之則腹滿滅陰虛則雖下而不滅或更增大恰如陽實證之腹痛下則輕滅陰虛之腹痛下則增

調胃承氣湯(吐後腹脹病)

大承氣湯(腹滿腹滿痛腹中滿痛腹脹不大便)

小承氣湯(腹大滿)

桃核承氣湯(少腹腫痞)

大黄甘遂湯(少腹滿)

抵當湯(少腹鞕滿)

厚朴七物湯(腹滿)

前篇 第十三章 腹片

桂枝加芍藥大黄湯(腹滿大寶痛者)

玄頭蒿湯(腹微滿) 大黄消石湯(腹滿)

走馬湯(腹脹不大便)

己椒毉黄丸(腹滿)

大黄塵蟲丸(腹滿)

消石整石散(腹脹如水狀少腹筋·

三物備急丸(心腹脹滿)

桂枝加芍藥湯(腹滿時痛者)

四逆湯(下痢腹脹満) 小青龍湯(少腹篇)

土瓜根湯(少腹滿痛)

白虎湯(腹濡)

小半夏湯(腹滞而喘)梔子厚朴湯(腹微滞)

厚朴生姜半夏甘草人参湯(腹脹满

温經湯(腹滿) 枳實芍藥散(腹痛煩滿)

以上十六方之中。有芍藥者五方有厚朴者二方。

吸 迫促。 形次數減其後全身浮腫心下部尤甚轉與以桂姜棗草黄辛附揚即全愈此患原來爲純然之陰 通 利者一 與 例 詩時 薬温藥爲主之劑而尿量少再投以冷藥則更不治也 來余亦自詫焉粗忽即用大建中湯四逆湯半夏厚朴湯合方與之即見尿量增加腹滿減大便呈黄色之 腹 日繼與猪苓湯僅一帖而 一日從三百煙至五百嫗屎適微痛余始與以大建中湯服藥一二日疝痛咽乾舌燥腹滿疝痛瓦斯之排洩多大便如泥狀量微一日數十回而不間斷無食慾食味之變化食後腹 痛。 痛。 瓦斯之排洩多大 已有數月經 满减然四 逆 湯條 西醫診治 便如泥狀量微。 下 尿量减 有下 漸 次 痢腹 增惡初診之日咽 而爲閉尿狀態腹滿 脹之語: 此 想係陰虛之腹滿也友人某氏。 乾舌強燥(口不渴) 更強時訴苦悶有至急宜處置之必要急以電 脈 傲 弱 其 而 叔 父就余 遲腹滿 不减 满 尤 診 虚證故投 增加。 在 擦 而 呯 尿

備考

外堅內空故名。 四肢悉膻者水也或腹脹而四肢不腫者蠱也蠱即鼓脹古人蠱鼓通後世方書稱氣虛中滿者即 (有持桂里鼓脹之說) 有持桂里鼓脹之說」 孫思邈云蠱脹者腹滿而不呈腫狀者也水脹者四肢 孫思邈云叠脹者腹備而 真仲景所謂愚瞀 面目俱腫脹 殺 人 也, 明 世。 醫者不 孫 鼓脹 奎日臍 也。 察 因其 腱

鼓脹 千金脹滿 之满臂細 門云病者腹满按之不痛者虛也按之痛者實 臍凸。 手心足心及背平 满 筋繞腹等種 也凡 種惡 症齊 腹脹凸滿 現者 杳 不 音。 治。 平 満者 凶。種 毒之漫 腫者 其 病

厚朴七物 《面目按: (之解云 金匱水病篇 湯 先 哲 主治詳於金匱但 云腹大 鼓脹之脈說浮大者可治虛小 小便不利 不必待此症悉備干金七物場方 其脈 (沉絕者) 可下按凡病脈之見絕者決無攻下之理由此 者危急此其大法 也又脈似虛 下云治腹滿 氣脹但以 小而 實沉 小者。 脈 浮散 沉 此 往往 者 絕之絕實係 爲 爲 用 下 此

前篇 第十三章 腹偽

厚朴生姜半夏甘草人参汤

厚朴三物湯

大承氣湯

加味腎氣丸(八味丸加車前子牛膝治脾腎虛腰痛腳腫小便不利或肚腹脹痛四肢浮腫或喘急痰盛已現

腰痛腳腫,使不利者腎氣丸之本症人所熟知也喘急痰盛已現疊症,則用此者甚稀。

後篇 病證各論

第一章 風邪

風邪古名中風意即中於風之病也感冒傷風冒風等皆其異名也

機而來則疾病起矣因抵抗力城而受寒冷之損傷者曰感冒因感染而起疾病者曰感冒病而實際上感冒與 因甚屬不明普通之見解則謂寒冷侵入時人身之防禦力弱身體之某部因抵抗力低下於是某種之感染乘 【定義】 寒冷侵人為諸種病狀之動機其一般所知者為呼吸器系統之疾患今日醫學之範圍其發病之原

温體温常保一定之度偷寒冷倭入時體表之血管先起收縮而體內之體温居發皮膚之血管擴張致起充血 倘此反應之力不充分,則感冒起矣。 (一)氣温之低下 【原因】 考感冒之成立由於次之三要素即(一)周圍之氣温低下(二)傳染(三)身體感受性之銳敏 吾人之身體一方由筋肉腺等作體温他方則裝置皮膚之血管由擴張發汗等以發散體

感冒病則多混

同

焉。

最易起感冒要之在比較的短時間內不知不識之中體温下降之時四季約有罹感冒之危也 外界之温度為惡急性之下降時(例如天氣之激變因發汗後裸體而受冷風之時後展薄暮接觸冷風之時) 氣温之低下全起於急激時(例如爟冷水等之時)或起於衛來之時(例如從秋至冬之移行)罹感冒者甚少

康之體內後乘機活動而起流行性之感冒病矣。 寒邪動時因身體之防禦力不充分。身體某組織之抵抗力衰弱種種微菌遂乘機侵入居住於健

起感冒病之菌時時處處種種不能枚舉重球菌連鎖狀菌葡萄狀菌以及其他之菌究為單獨之原因物抑爲

後篇 第一章 風邪

多數之原因物則尚不明瞭也

也而甲焉加答兒性乙爲洛伊麻基斯性丙爲神經病性亦有同時種種疾病混合襲來者又凡易起腎臟炎與統之疾患甚或同起於一家族也而甲爲加答兒性乙爲洛伊麻基斯性丙爲神經系病性又同一年齡之個體之局所亦有異焉甲起於呼吸器之粘膜乙起於消化器粘膜之加答兒丙起洛伊麻基斯性疾患丁起神經系 三一愿 炎之個 受性 體此等感冒 人身所受之寒冷 病 亦起 ĚĿ 詩 同. 而感受性 則 因個 豐或 身體之狀態如何而 里, 訂 ョ 感冒病也 而

惡寒發熱頭痛鼻塞咽喘鳴汗不出腰痛身體動時,手足筋肉關節感痛口微渴衂血則頭痛减輕臭咽喉不痛不咳脈浮弱舌無苔聽診打診無變化腹部無特别徵候者宜與桂枝湯【療法】 惡寒發熱(大多在三十七八度之間)鼻鳴不塞寢時微汗。愈然不變口不渴頭痛而項: 病大多嘔吐下痢或全身之筋肉與關節疼痛、大概多為輕症狀性流行感冒者往往呈重篇之病 人罹微毒之人亦易犯感冒至於塵埃煤煙有毒物質等之物或化學的刺激、後天性之感受性亦有注目之價值凡身體衰弱疲勞過勞睡眠之間易罹感 症候】 風邪之症狀普通始於噴嚏惡寒其次發熱頭痛鼻塞或件以咽喉痛、 疲勞過勞睡眠之間易罹感冒。 亦 又凡 咳嗽小兒屢現消化器方面 為感冒之補 凙 慶感冒之人 助 原 、 稍強大· 態。 因。 、 結核病 小無 之

平時無甚相異脈俘緊而 證與 麻 黄 湯證之鑑 别 要點在平斤之有無脈之浮弱與浮緊。 有力舌無變化稍覺乾燥聽診上有響性腹部覺變異者與以麻黃湯。 食慾大 一級汗則 愈。

湯證之風邪為惡寒發熱頭痛鼻塞 **一个一个** 翔者多 小柴胡湯瞪平又本方瞪之患者鮮有麻黄湯瞪之喘鳴焉。 焉本方證或黄芩湯證若尚有嘔吐症 不出 汗與麻黄湯證相同。 狀 者。 則 又不得不多照其他症狀以鑑别之究係萬根加 但患者多項背強急時感口喝若

證之脈浮緊舌不大變聽診打診上無變化。

知 寒去則熱現熱去則惡寒來有時現所謂微熱或身熱而不全然惡寒非從他覺胸脇苦滯以證明而不能 現白苔、大便不規則或便祕或下痢咳則嘔吐惡心耳寒手足熱口渴此時易與五 凡小柴胡湯之證脈失浮之性質弦細或弦數有時近似於滑有時浮數脈狀無確定熱不與惡寒同時存在惡 睫。 柴胡 較錯 桂 枝湯 證 葛 根 湯 證麻 黄 (湯證 更進一步此時不復惡寒發熱而變爲往來寒熱食慾疲乏舌 一苓散體混淆。 宜十 分鑑 别。

办 而乾燥口苦胸脇不苦滿。 小柴胡湯證更進一步則為大便祕結小便減量心下脇下如有物然不思食物脈較普通小柴胡湯證更進一步則為大便祕結小便減量心下脇下如有物然不思食物脈較普通 便而後發汗。自能 輕快。 心下堅在觸診上多覺胸脇下有抵抗壓重之感此種患者宜與 大柴胡 更沉一步舌現 湯以通其大

痰沫若其 平素心下停氣水之人因冷性而易感風邪一犯風邪則因喘咳激而 病卻感冷而在不知不識間流出 此外尚有麻黄 水狀之透明 如頭被雪 以明鼻汁在桂枝湯證葛根湯證麻黄湯證等之鼻腔感熱分泌物多粘稠而在麻黄附子細辛湯二而感冷痛。食慾非特不變反較平時爲盛不喜行走而多欲横臥口不竭大小便無變化屢屢流に麻黄附子細辛湯證凡生來虛弱冷性之人或者年人遭遇風邪有惡寒之感而體溫不昇觸遏 脈浮細或浮弱或頭痛或輕熱者。 鼻汁脈多細沉或沉遲舌溼濡。 可與 小青龍湯若 煩躁 切均熱 而 上氣者宜加 排洩多多之稀薄 狀 少而寒狀多。 石膏。 清 冷鼻汁 子細辛湯證之 或 泡沫性 冷物。 出

之頭痛發熱甚身痛 [弱之婦女老人等在發病之初其邪已有一部分倭入少陽者柴胡 /小便不利。 口渴服! 口渴 沉細或遲弱者樂胡桂枝乾姜湯之證 煩躁脈浮緊者宜與大青龍湯以發汗。 也。 桂枝陽之證也邪全入於 少陽惡 寒多而

乳兒犯風邪起鼻加答兒苦於鼻閉時。麻黄湯與之 飲水飲町吐出或 尿量 减而起水瀉下痢者。宜與五苓散五苓散股後尿量 有神效幼兒犯風邪伴

築

章

以胃肠加答兒之症狀飲食與

增加熱下降嘔吐下

止則身體即輕快矣

億考

過數 神湯。参蘇飲芎芷香蘇散藿香正氣散之類大抵而愈考之築性病理。是等藥劑對於感冒多不適當,其所以能 微者。往往啜稀熱粥一盌覆以被而取汗。或吞生姜酒。或食豆腐肠,大抵可愈故後世之醫亦有用荆防排毒十 治之。莫使延長時日致因種種變化而發為重症入手即宜發散如其邪難於急去時可用建中場之類發表之 愈者病輕則藥到自愈也又後世有勞役感冒病者。此因腎虛之人或勞心之後外邪侵入之故宜在初時速 裏症。而用大承氣湯者亦稀有少陰病而用附子人參者。最初多服桂枝湯、葛根湯之類以發散之其感冒之輕 中風傷寒論之中風即係傷寒之輕者最初惡寒發熱頭痛鼻渡人 雜病紀聞 日而熱仍不去時用補中益氣湯以清解之益氣湯者。小柴胡湯之變方也。 古書稱中風之風後世醫書稱感冒後世醫書之中風指偏枯半身不遂之病而言即今俗 人所知其理與傷寒同邪甚輕故稀 有陽

第二章 氣管枝炎

織之抵抗力弱其發生以天候不定之季節爲多 本病爲世上最頻繁之疾患不問老幼男女均有罹過之患而尤以羸弱貧血者爲甚其病原由

本病大體區別爲二種一日原發性,一日續發性前者爲單獨之痰病後者起於其他諸病之續發續發性氣管 感冒疫咳窒扶的里麻疹腸窒扶斯等之傳染) 一因於隣接器官病之蔓延(如咽頭喉頭氣管肺臟等疾病之蔓延)一起於種種之急性傳染病 (如流

本病之原因可分傳染性中毒性器械的血行性四種傳染性之病。起於細菌之感染中毒性之病起於刺戟性 吸引或其他藥品器械的之病起於器械的刺戟(如吸引塵埃等所謂職業的加答兒是也)血行性之病

定症 起因於鬱血(氣管枝炎局處的症 主因 在 心臓 疾 候中最緊要者厥惟刺芝叟兒之聽取此 患及慢性 呼吸器病 之續發或因腹部疾 患解 刺芝叟兒在分級物之性質中有乾 脈 血 循 流 かさ 心臓 起 摩 礙 之 性

與煙性 種

物時則聞 私膜腫 温 性 展排 刺芝 /叟兒(即水饱音)此即經性氣管技炎通列本靑以色生則与見己含人是上,洩粘稠之分泌物時則開乾性刺芝叟兒此即乾性氣管枝炎若生液性而易發: 動

吐或喀出血痰此外往往頸部及前額靜脈怒張頭部之靜脈鬱血以致眩暈、 **咳嗽爲本病必發之症** (高年婦女尤多但大便之失禁者甚少)在頑固之咳 候患者甚感痛夜間防其睡 眠加之胸廓之筋肉緊張過大胸中劇 嗽往往脫出 直腸。 頭重頭痛有時咳嗽甚劇。 痛。 咳 嗽 走 時。

加但呈液性類於透明粘液性物質混以綠色不透明之膿塊此名熟痰。急性氣管枝炎初期喀痰之量極少質粘稠呈透明玻璃狀及粘液狀此名生 痰在疾病近終末 時。 痰之

氣管枝炎因經過之長短。 炎症在廣汎之際呼吸 色愈盆顯明但件以 而 呈藍色眼球 鑏 因 脈 迫 眼球 鬱血 促 而 後靜 一之症狀,此際頸靜脈屢屢腫大現手指大之字索物吸息時收縮呼息時充 困難助間在 脈 之鬱血而突出於前方聲音斷續往往 吸息時陷沒副 種。 呼吸筋現收縮。 呼吸困 嘶嗄。 難甚者 則因喉頭之鬱 皮膚 及 、粘膜之 血 芝故。 紫藍

又可分别為急性及慢

性二

起炎症時往往胸骨 (患之決) 管枝炎雖 芝叟兒打診上無 可以輕 屢 視 厚 下有感覺創 件 因 何 其 以發熱但 每致併發氣管枝肺炎容易促起窒息也毛 種 傷之狀。 化此病之不良轉歸為炭酸大多樂積於血 稱 有 細小之氣管枝起炎症時 達 於 高 熱度者咳嗽 類發 呼吸 (此名毛細氣 細氣 迫 促。 液中 普枝炎之 吐 出 管枝 喀痰。 全身呈基 (炎) 在 特長 一如前 阿 在 小兒及 聽 述若 述 診 呼吸 上有 大 高 氣 篬

丽 困 難 雕 倂 起全身之搐搦 而 死 者

慢性氣管枝 炎因 喀波之多少與性狀區别爲左之數種

乙)單純 甲)乾性 氣管枝 性氣管枝 炎 漏 此症頻發咳嗽雖經患者極努力之結果 此症出多量粘液膿狀之喀痰混以灰白綠色不透明之膿塊(即球 僅能 稍 稍 喀出透明玻 璃狀之粘稠 痰

丙)漿液性氣管枝漏 丁)氣管枝漏 膿 此 症 喀痰呈 此症喀痰極 膜性容易流 一稀薄恰呈稀薄之橡皮溶液。 動。

亦感居室污毒。推人惡心。遂致食思滅損。喀痰之量多者。每日達五百立方仙米以上暫時喀 環之範圍呈鬱血 慢性氣管枝炎往往誘 色之一種塞子。各奇脫里希氏塞子。或曰菌性氣管枝塞子。試壓之,其硬度如糜粥狀,且放極甚之惡, 三層。最上層為泡沫。含灰白之膿塊第二焉灰白色之漿液層。最下者焉沉澱部此沉澱部中有類: 戊)腐敗 於其擴張部分而起其喀痰與 性氣管枝 狀初起時與以興奮劑雖能圖一時之恢復但其症狀反有進無已至於鬱血而 起肺胞: 炎 此症喀痰腐 性肺氣腫 肺壞疽患類似所異者缺少肺壞疽片耳患者當呼吸氣) 敗而 此際呼吸困難增劇右心室擴張肥大故若右心室之力萎弱時肺 放惡臭。 此症 因 慢性 氣 管枝 炎而 起 氣 管枝 痰放 時口臭特甚自己 暖。 置可以 黄色 死腐敗 分 分 妼

氣管校 竹站湯腹筋之拘攣甚 以去其表 者此因 炎有起敗血 邪。則 喀 急性 逐粘稠之故可多用石膏之配 燥喀痰粘着咽喉難離或聲音嗄者用 氣管枝炎之 咳自收而 一症狀之變且有續發而成肺 咳時覺痛者用四逆散大便祕脈沉實舌苔黃者用大柴胡湯。 痰 初期不必用鎮咳祛痰之藥其治方可做風邪表證用麻黄湯、 自散表證 旣 去循 利如越 默默不思飲食而身熱者可 壞疽之虞。 一麥門冬湯。 |婢加 小半夏湯、 加 運用 石 湯白虎加人參 小柴胡陽 口退甚喀痰粘 或小 萬根 湯、大 柴胡湯合橘 小 咽喉 石 龍

症

類咽乾口

麥門各湯之目的在咽喉不利此方對於滑利潤澤去痰均有效石膏劑之目的在口舌乾燥而訴口渴喀痰粘

稠此方有稀薄喀痰 之效。

。 身無熱不見表徵而咳嗽不止者用苓甘五味姜辛湯及其加方病陷於陰位身上無熱惡寒脈沉微或沉遲弱

者應用真武場。以上二方應用於老人氣管枝炎者爲多。

咳嗽甚聲音嗄者用半夏厚朴湯麥門冬湯。

廣敗性氣管枝炎用桔梗湯排膿湯章莖湯。

毛細氣管枝炎用還魂湯屢收偉效如用桔梗湯桔梗白散或瓜蒂散亦能一舉而收奇效

焉肺浸潤之徵候。焉當歸芍藥散之症狀。此外復見脈之沉遲弱直腹筋之攀急下腹腰部之冷感小便不利耳之幼兒染疫痢而亡。終日悲悶漸次喘咳。食氣不振。夜不能眠體温常在三十六度二三分以下。聽診打診上認 余嘗用當歸芍藥散治一羸瘦而貧血甚之慢性氣管枝炎所謂虛勞狀之一婦人一月餘而根治。 此婦 因

重蓋均當歸芍藥散之證也。

類聚方廣義〕 老人在秋冬之交咳嗽胸背脇腹擊急惡寒桂萎棄草黄辛附湯治之

第三章 氣管枝喘息

喘息之義。古今相同上氣而呼吸促迫之謂也

管校狭窄之原因有二一則細氣管枝之漏斗上移行之部分因周匝括約致起細氣管枝之痙攣一則由於氣 管校粘膜之腥 氣管枝喘息者呼息的呼吸困難發作性出現之症也由於細小之氣管枝一時性之狹 脹前者名神經性氣管枝喘息又名氣管枝括約筋上分布之迷走神經之神經病後者名加答 室而起此

見性 氣管枝喘息有人云神經性氣管枝喘息由於橫膈膜之痙攣但徵諸經驗在喘息發作之際橫膈於 膜 亦能

營呼吸 動也。

本病往 往爲遺傳的疾患發生於其一家族中此外具有神經的素因之人亦屢罹之後天性神經質亦

種原因。

加答兒性氣管技喘息僅基因於氣管枝粘膜之變化神經性氣管枝喘息可細别如次。

甲)因延髓 出血軟化竈腫瘍形成等刺戟迷走神經致招所謂中樞性氣管枝喘息此爲無疑之事

(乙)中毒性氣管枝喘息此亦爲中樞性氣管枝喘息之一。起於鉛水銀等之中毒及尿毒症之際因其 原因

m 有鉛毒性喘息汞毒性喘息尿毒性喘息等之 各秤。

丙)末梢性氣管枝喘息此由於頸部之腫瘍及淋巴腺之腫脹等刺戟迷走神經而起。

(丁)反射性氣管枝喘息此為最頻繁之症因其他駭器之疾患而起反射性之病者也概率之如左

兒而爲本病之原因者此因人體嗅入薔薇槿花等香氣而 而爲本病之原因者此因人體嗅入薔薇槿花等香氣而發一)呼吸器疾患之際如鼻殼粘膜之病的腫脹鼻茸慢性鼻加答兒聲帶茸腫喉頭及氣管枝粘膜慢性加力

(三)泌尿生殖器疾患亦招反射的本病如子宫之位置異常等致起本病者(二)消化器疾患之際如因咽頭茸腫扁桃腺肥大慢性咽頭加答兒便祕腸寄生蟲等致惹起本病者有時因(二)消化器疾患之際如因咽頭茸腫扁桃腺肥大慢性咽頭加答兒便祕腸寄生蟲等致惹起本病者有時因

四)心臟疾患時亦屢屢發作喘息然不可即誤認爲心臟心喘 息也。

汗眼目因眼球後靜脈有轉血故向外方突出口唇腫脹而帶藍色頸靜脈怒張體温大抵無變化脈搏頻數其 而不能預知發作之初感呼吸困難胸部放咿軋音及笛聲聲高者隔數室能聞之顏貌呈恐怖之狀前 、症候] 氣管枝喘息有突然起於健康之時。患者在夜間就轉之際不呈何等變狀追夫半夜醒來忽然 被冷

發作時呼吸困難者因其時吸息筋之力須大障礙氣道呼息筋弱動作困難也故此時副呼息筋甚需努力此

際腹筋盐形板堅尤以直腹筋為甚又下部筋骨因損腹筋之收縮因向內方牽引。 發作之時間。短則一二小時。長則亘數十小時亦有每日反覆或發或止者發作之終每喀出少量之粘液膜液。 ,喘息用麻黄劑如麻黃杏仁甘草石膏湯甘草麻黄湯、越婢加半夏湯、小青龍湯等麻黄配劑之藥方。

最能見效喘息用麻黄劑而不治者可用大柴胡湯、大承氣湯、半夏厚朴湯。

以半夏厚朴湯而痰咳不止乃與小膏龍湯三日而愈統計一週之間病已全治此婦會云服過麻黄有效成分 草麻黄湯而頓挫其發作會記有一某西醫之婦人苦喘息就余診治余先用甘草麻黄湯以鎮其發作其次與 發作激烈時西醫注射阿獨里那林或實篇棒其不能鎮靜漢醫用麻杏甘石湯亦不能抑制者此時余會用甘

之歐夫歐度林及其他西醫用之諸種藥劑。迄未見效云。

噹嚼麻黄味覺辛而遊者爲有用嚙後辛而不遊者無效

甘草麻黄汤瞪之病。焉喘鳴急迫非口渴或發汗之症狀若上半身被冷汗口渴而喘急強者當用麻杏甘石湯 主治之眼球突出頭靜脈怒張流冷汗者應用起掉加半夏邊喘息而伴肺氣腫呼吸困難吐出炮沫狀之痰者。

多爲小青龍湯聲或用小青龍加膏湯

氣揚木防己湯等證其原因爲反射性氣管枝喘息因腹壓或胸壓高而起之喘鳴余會用疏通劑或瀉下 麻黄湯所以治喘息發作時喘鳴促迫發作止即歸平靜者多用之平生不絕發作喘鳴者多爲大柴胡湯大承 以减輕腹壓頗收意外之效茲舉實驗例二三如左。

一)埼玉縣大里郡〇〇町。女年五十八二三年前起喘息發作時苦不堪言。不能模臥身體肥滿腹部膨大便 後篇 第三章 氣管枝喘息 六五

祕屑凝。 之夜發大汗。翌日下痢八回。自後喘急半減前後經二十天之服藥喘急消散身體輕快矣。 脈 最高血壓 百七十。無口渴頭痛食慾等之變化小便一日六七次因投與大承氣過服藥第 E

淡黄之苔微覺乾燥聽診時胸廓全部有笛聲呼吸音極微弱左右之胸脇苦滿直腹筋攀急胃內證明僅僅停 料此次飲後即能一夜安眠兩個月之後遂恢復健康云。 水大便二日一行。食慾少因與大柴胡湯夕間頓服甘草麻黄湯據患者語余飲大柴胡湯已經四十次左右不 (二)芝田區村町原(郎男年四十一數年前得喘息之病的在半年以前病狀日益增惡歷訪 咸不能奏效僅在伊豆之温泉遊覽中稍較輕快歸京復發夜間不得安眠身體稍肥滿血色佳良脈緊實舌有 東都有名病

治驗中,所謂大承氣湯或大柴胡湯證時。倘用阿獨里那林等注射,則反起頭痛及其他之副作用。爲效亦少云,凡麻黄劑證輕快之患者,用阿獨里那林或夫歐夫獨林等亦有效果即激劇發作時亦能稍稍抑制惟在右之 心臟疾患而起之喘息多用木防己或木防己去石膏加茯苓芒硝湯。

備考

阿芙蓉液(用三十五滴至五十滴)病已難治而能節攝飲食並禁滋味膏粱則服增損木防己湯一年或二 己湯虛陽上攻者蘇子降氣湯津液枯竭者與定喘湯滋陰降火湯動悸高而脈結代者鍼砂湯一 可以全治定喘湯亦佳 本間棄軒之說〕 從感冒起者用小青龍湯合麻杏甘石湯桂枝加厚朴杏子湯華蓋散酒客者用增損 時救急者有 木防

湯中加紫蘇子桑白生姜也華蓋散者。麻黄湯之桂枝以紫蘇子、茯苓桑白陳皮代之也。 大塚按本間棗軒先生治療喘息之病極能自信推獎阿芙蓉液亦毫無賺遜之詞。 增損木防己湯者木 防己

藥致變他病其例甚多故此病不可不從瘀毒之處下工夫此篇所載乃治之大法亦間錄 有持桂里之說) 哮以聲響名。喘指氣息言。喘息者痰之患也其源多來自毒。幼時頭面瘡毒用外傳速愈之 一二奇樂

小**青龍加石膏湯** 桂枝加厚朴杏子湯

麻黄杏仁甘草石膏汤

越婢加半夏湯

千婚湯(半夏 皂肉 甘草 生姜) 喘不得臥外有寒熱之證者可用此方。

症發動亦用前腸四五日不治氣促倍於前因仔細摸其腹心下痞堅宛然即投以木防己一二日間心下痞散。 木防己湯 平野屋某之內人患哮喘數年每發時用小青龍加石膏湯或麻杏甘石湯四五日而得安近來前

諸症亦消。

蘇子降氣湯(蘇子 半夏 或小便不利而履然在哮喘變爲水腫者多難治。 陳皮 厚朴 前胡 桂枝 當歸 甘草 生姜 大棗) 此方治痰喘氣急

真良場(茶實 南星 薄荷) 治小兒喘急有神驗。

破方 射干麻黄汤 哮吼發欬不解之兆者用此方有效。

厚朴麻黄汤

以上二湯症候大略相似以主治藥品比較之前者爲淺症此爲深症此湯活用於水腫亦能見功。

喘四君子湯(人参 甘草 茯苓 陳皮 厚朴 砂仁 蘇子 桑皮 當歸 白朮 沈香 木香 大

寮 生姜)

生脈散(麥門冬 人參 五味子) 此方治哮喘之壞症虛候

大塚日華岡青山翁用麥門各場加沒食子以治喘息其取意正同。

六君子湯

後屬 第三章 氣管枝喘息

附子理中場

地豆兒(鼹鼠籍) 十五歲以內之兒有效

燒鴞霜 此係川島氏實驗而得相傳謂係三角法眼之方。

起於秋冬春夏之交時候不正之節或陰兩非時之冷氣其因係疝治疝宜通察腹候治喘亦然 用以祛痰其病多為長期病有年發三四次者有月月突發者有一二日或三四日一發者有夜發置安者大概 [原南陽哮喘之說] 哮喘古但稱喘今别焉二證仲景用桂枝加厚朴杏子湯之喘即哮喘也此證中有竹應

喘息兼胸痛者用栝葉枳實湯上氣強者用蘇子降氣湯頸背強急者用萬根湯心下急迫者用甘草乾姜湯中

兼用底野迦

感來者用麻黄汤麻杏甘石湯大青龍湯等因過食或大便不利而發者先取陷胸丸紫圓等吐下之劑以硫萬 **宿滯然後用對證之方** 、類聚方廣義〕 哮喘症大抵一年一二發或五六發亦有每月一二發者其發也大抵由於外感與過食從外

、焦窗雜話) 長病之喘喘而甚者每不治然始終用大柴胡湯加以灸治者可治。

第四章 肺炎

長病患喘四逆散中加麥門各石膏用之

(甲) 加答兒性肺炎

於肺胞或氣管校炎之病原菌於吸息時吸入肺胞之內而起 本病常為檢發性疾患多趨發於小氣管枝炎故又稱氣管枝肺炎本病因氣管枝之炎症直接傳播

小兒或高年者易罹此病此病亦續發於諸傳染病如麻疹百日咳流行感冒猩紅熱腸窒扶斯等病後往往有

續發者亦有因唾液飲食等物寬入氣管校內違於肺胞致誘起炎症者而在重症室扶斯患者衰脫之癌腫患

者嚥下筋麻痺之症者亦往往見之。

凡一經患過加答兒性肺炎者愈後每不易再發

【症候】 肺臟上發見加答見性殊為困難因其病竈狹小故理學的診查法亦難證明大多為氣管枝炎之症

候所掩。

叟兒有時獨音亦因發炎竈多數融合現五仙米之廣二仙米之厚但此時若行輕打診不能得陽性之成績本 理學的診查法中以聽診爲本病景重要之診斷法氣管枝肺炎往往能聽得氣管枝呼吸音及有響性之刺芝

症之獨音同時常帶鼓音

正之弛張性恢復之時不現分利的症候。 氣管枝炎持續數日者不可疑爲本病也本病之體温與纖維素性肺炎之體温同樣無一定之熱型大多呈不 體温亦爲本病診斷上緊要之症候基庶隨氏以爲氣管枝炎之體温不超過三十九度故凡超過三十九度之

點此外在咳嗽及深呼吸之際屋屬胸痛 蒼身症大多件咳嗽之頻發喀痰在小兒及高年者每多嚥下故所見甚稀所喀之痰呈粘沒膜狀外無特異之 肺臟中顯現瓦斯之交換障害呼吸促迫間歇不正呼息時呈中吟之狀肋間於吸息時陷沒副呼吸筋收縮是

乙 纖維素性肺炎

化與熱性全身症狀。 本病爲急性熱性傳染病之一。有整然之經過二週內以分利性現象而結了本病之症候可大别爲局處的變 冒狀之補助原因本病之傳染或直接或間接介行於人體壯年男子易罹一經犯病時有反覆之傾向 本病名克洛芝浦性肺炎爲日常頻繁遭遇之傳染病發病素爲夫倫克兒氏肺炎球菌但必件以感

後篇 第四章 肺炎

覺煩 亦 亦 「慄及罐」 性之消散比分利尤多起於夜間但有時亦有遷延性分利徐徐熱下者又 渴。 有選四十 食慾全無尿量 全 語者。 旧至 度 狀 亦有名假性分利者此在真分利之前一 上者脈搏頻數而緊張強大多呈重搏 起 四 於 减 日 (少脾臟屢) 者本病在就業之際 肺 炎菌製出之毒素與其他之急性傳染病所謂曆 屋腫大如此全身症狀持續五日至七日高 或 睡 眠之時 性顏面潮紅舌苔生白色或灰白色眼目放 俄然起戰慄尋來稽 時見其熱 下者之謂也 伏期 熟俄然 在分利之前反見體温上昇惡 图 者是也此 性熱 **必發於皮膚** 候達 期間不 三十九 更加 過 發汗。為 輝。甚 四

期時。 打診音變爲強度之濁音如氣管枝呼吸音喀痰呈新鮮之鐵銹色所謂銀銹色痰者是也從變肝期發於融在吸息時有捻髮性之刺芝叟兒喀痰多帶粘稠性呈玻璃狀血點及血線交見一到變肝期則聲音之损量, 一一局所的症候之中先現胸部患處之刺痛咳嗽及喀痰其他之症與炎症之時期相 胞 內液性 喀痰呈枸橼色或芙蘭色此時獨音漸次消失再呈肺胞性呼吸音及捻髮性刺芝叟兒其後此刺芝叟兒 期(即初 一後出 (期)中打 物而完全 診上呈鼓音。 消失。 輕打 時稍有濁音此因 肺臟組織之緊張力微弱且乏空氣之故也。其他之症與炎症之時期相異今摘要如次。 聪

脈類數患部之呼吸運 患者之類貌 潮 紅。 往往呈紫藍色肺之患部亦顯潮紅患者多仰臥 動緩 慢且有斷續性之肋膜炎性疼痛言 語亦斯 而 不能向疼痛 綾不能出高 之一 面 側 臥 呼 吸 困

又 有各種之異常症如頓挫性肺炎一日性肺炎無熱性肺炎遷延性肺 炎. 無力性肺炎等 症.

邪從少 療法 陽更 加答兒 進入 陽明 性肺 者大承氣揚類適 炎續發於氣管枝炎者 用之 亦甚多其方劑揭示於氣管枝炎條中可以 参互選 用。 外

肺炎於發病 青龍 湯燈也 初期已呈大青龍陽镫者亦多症候條云熱而戰慄達四十度以上服數而緊顧面潮紅舌

白

斤劑爲這應數日之後大抵呈寫下劑之病狀。 本病病邪之轉變甚速從太陽忽而少陽從少陽忽而陽明或從太陽直接轉入陽明多爲大柴胡揚白虎揚大 小承氣湯調胃承氣湯或桃核承氣湯之證本病以身體強健之壯少遭遇者爲多故呈陽實證是以初期以發

抵發譜語潮熱或呈惡寒大便祕結妄行妄走。初期與大青龍湯或大柴胡湯後用大承氣湯、桃核承氣湯、 小兒肺炎用小青龍湯越婢加半夏湯小柴胡湯排濃湯等為最多。 承氣湯等亦 余於昭和三 多有用瀉下之方者其妄行妄走者以白虎湯則輕快亦有用桃核承氣湯而收意外效果者。 年末至四年之春在土佐漁村開業之際該處青年曆本病者甚多除一日性肺炎無定型之外大 調

老人多易陷於陰虛證多用附子配劑之方劑如真武揚桂枝加芍藥加麻黄附子細辛揚麻黄附子細辛揚等

第五章 肺壊疽

肺壞疽當即古人所謂肺癰今人之肺膜瘍

之釀膜性葡萄狀 本病因肺 球菌為甚罹此病者以十六歲至四十歲間之男子爲多。 嚴組織死亡起腐敗性分解其死亡之起因由於釀膿性球菌侵入肺臟之內而尤以諸 種

帶腐敗性之甘奧患者周圖臭氣瀰漫令人不耐對座 本病在診斷上所必要者為喀痰之性狀凡患此症者其所喀之痰臭氣特甚刺戟性如山椒大蒜或

塊。 喀痰之量一日不過百立方仙米(亦有達千立方仙米者)痰爲稀薄之液呈粘液朦狀其膿爲透明灰白之球

將喀痰放 為顆粒狀質 置則可見其分爲三層第一層污穢灰白色之中當粘液濃狀之物質第二層灰白色稀薄之漿液。 梭鷹 淹此外混 築五章 血色素時。喀痰類黄赤色。但此喀痰之性狀非本病所特有如腐敗性氣管枝炎之 肺壞疽

其數種穩並無一定此為診斷上重要之點。 喀痰亦同一狀態所不同者本病之喀痰中必含有肺壞疽片其片爲黑色或煙灰色細者如小點大者如拇指

部倫分泌物接觸於氣管枝分歧部時必忽然起劇繁之咳嗽 本病對於患者之體位。亦宜注目。當患者向患方下臥時其分泌液必豬留於壞疽空洞內不違於氣管枝分歧

肺之局處的變化有燙潤症狀與空洞症狀二種此種患者類貌每呈腫白色體力衰弱大多件以消耗性之體 温昇騰食慾城少喀痰嚥下之時容易引起下痢之傾向。

者雖用桔梗配劑仍甚危險。散桔梗湯,體力已衰弱者或虛弱者用華莖湯。巴陷於陰證者用薏苡附于敗醬散其形空桐而達喀血之傾向散桔梗湯,體力已衰弱者或虛弱者,用葦莖湯。巴陷於陰證者,用薏苡附于敗醬散其形空桐。而達喀血之傾向 【療法】 本病奏效之方有桔梗湯桔梗白散章莖湯薏苡附子敷醬散凡初期發病體力未衰弱者用桔梗白

備考

紫菀散(紫菀 古今錄驗桔梗湯(桔梗 後云服之則吐膿血而白散條則云此方下後吐膿血有力,一二字之間分别至此焉。〔有持桂里之說〕 桔梗湯 此場平易金遷所謂救肺癰始朝之方也但其主治與桔梗白散一字不易然方 知母 貝母 白朮 人参 當歸 一 桂梗 地黄 茯苓 甘草 阿廖 敗晉 甘草 薏苡仁 桑白皮) 五味子 生姜) 以上二方均本於桔

章型湯

梗場而組立之方劑也

黄昏湯(黄昏手掌大一片)

章莖湯在金匱中引用千金今閱千金則未載此藥只與方名外臺中引古今錄驗有章莖湯之名而在黄昏湯 方下有療肺癰一語葦莖陽主治亦「療肺癰」三字故今人互用此二方云黄昏者合歡木也可用其皮柴野

栗山先生壯年病肺臟諸藥不效服黄昏湯而愈云

桔梗白散

擎歷大棗瀉肺湯

肺癰丹方(肺癰潰後排膿者熱服薏苡根搗汁)

[本間棗軒肺癰之說] 初發惡寒發熱者先與小青龍湯發表之可愈已成膿時與肺癰湯則治此方為先師

肺羅湯者甘草桔梗貝母栝葉根杏仁白芥子生姜七味也。南陽翁之紀方有百發百中之效此外葦莖湯桔梗之類亦能奏效。

第六章 肺氣腫

吟咏演講負重登山等之日久努力或喘息發作等亦爲本病發作之原因。 【原因】 本病多與語種之咳嗽性疾患供發就中尤以與慢性氣管枝炎供發者為最多其他職業的努實作用如吹奏 本病起於諸種之呼吸障礙氣壓持續的亢進肺胞內但此種障礙在呼吸時則頻繁吸息時則稀

【症候】 胸廓擴張如洋瓶狀呼吸運動甚少打診上呈輕度之鼓音(即紙匣音)此因肺組織缺乏緊張之故

聽診上肺胞音减弱心臟濁音部狹小或完全消失心音幽微 本病進行時靜脈之鬱血著明起浮腫腹水鬱血肝尿利減少胃腸之鬱血加答兒等。

甘草湯苓桂五味姜辛湯或苓甘姜味辛夏仁湯苓甘姜味辛夏仁黄湯 【療法】 有肺氣腫之表證若用小青龍湯小青龍加石膏湯桂枝加厚朴杏仁湯無表證者用茯苓桂枝五味

起鬱血肝而訴胸脇苦淸者可從證用大柴胡湯柴胡加芒硝湯或柴胡加龍骨牡蠣湯。 現浮腫者可別其陰陽用木防己湯木防己去石膏加茯苓芒硝湯桂姜棗草黄辛附湯八味丸等

後篇 第六章 肺氣窟

實驗例

龄呈鼓音聽診之呼吸音嗒嗒然證明胃中稍有停水胸脇不苦滿左右之直腹筋強攣急及於脇下腹部 絕感乾燥喀痰粘着難離體動時。呼吸促迫增進。言語斷絕不能流暢上眼瞼下垂,肺之下緣在三横指經下,打 堅硬如板大便一日一行。小便普通有食慾因與小青龍加石膏湯馥服一年餘自覺的痛苦漸次消失目下猶)患者六十四歲男性(住所姓名等省略)數年來苦肺氣腫脈浮稍緊大口渴。舌白苔乾燥無滑澤咽喉不 一艘

第七章 肋膜炎

扶斯桿菌麻毒球菌普通大腸菌等。 菌及葡萄狀球菌爲主有時亦有特殊的分裂菌存在於肋膜渗出物中如夫倫克兒氏肺炎球菌結核桿菌窒 原因 本病起於細菌之發生至於因化學的刺戟物而起者則無其實例細菌之種類以釀讓性連鎖狀球

管器波及肋膜而起本病者如肺炎肺結核肺壞疽心囊炎肋骨膜炎腹膜炎等但不能發見其誘因焉此外如感冒外傷急性傳染病肋膜結核肋膜癌及消削性慢性病等亦為誘發本病之補助原因又有從鄰接

是短最精密之聽診其初不過證明有幽微之抓爬音有時亦能極容易聽得高調之爆鳴音有時音調硬固【症候】 (一)乾性肋膜炎 本病在聽診上有肋膜炎性摩擦音此摩擦音之音調極爲不同存在時期亦: 摩擦靴革之音。故名新革擦鳴音。有時又聽得如掌握雪塊之音。故名握雪音擦摩音旺盛時。以手掌安置於胸

部亦能觸知之 續回數過數月而在反覆行深呼吸時摩擦音即一時消失。 膜炎性摩擦音直徑紙一二仙米一小局部能聽得之。但有擴及胸腔全部者此種摩擦音或小時消散或持

狀。 心呼吸障 外 聚要 碳亦 (之症 爲 候為別膜炎性疼痛患者當咳嗽及呼吸時患處覺疼痛 主要徵候之 有時更呈強度之呼吸困難 一息 部一方面之 呼吸運 動緩徐後薄往往帶斷裂性此焉肋膜性疼痛 而於肋膜炎性疼痛之外全無何

咳嗽多而 乾燥性 咳嗽之喀痰則缺 如焉。

其

、呼吸音

亦

(CE)之微

弱。

合故與心臟之肥大擴張併發。 本 病大多引 性癒着為本病之後發症此即肋膜腔癒着致起障礙呼吸運 起俄 然 之熱候其 初大抵數次惡寒次示不定型之熱候脈 動之病也病之過甚者往往全肋膜腔癒 搏頻數強煩竭。全身困憊尿 利 波 少。

(二) 經性肋 膜炎 溼性肋膜炎者。 有滲出物之謂也其主要之徵候爲獨音與聲振 盪減 羇。

望診上: 面之呼吸徐緩或者消失此因滲出 堪注目者為患者之體 莅. 卽 患者向患部方 物之壓迫阻礙胸廓及肺臟 面下臥時其上方之健康部營充 擴張之故又因患部方面之胸廓廣心尖搏動 分之呼 吸運 動。 而 患部方

壓迫健方肝 臟轉移至下方之故

胸廓壁 聲音振盪 之間。 之微弱或消失觸診上能知之因觸診能知聲音振盪。 存在液體 時氣管枝之 聲音波動傳達於胸壁 乏故. 故亦能知逢出 物 之高其理白 為肺 面 與

打診上 物之 部位呈濁音滲出物之層厚大者濁音亦顯著

現。聽 因此 診上 而 沿途出物之上 起 此 種之摩擦音 一界。發見肋膜炎性摩擦音者亦多此摩擦音其始 呼吸或呈微弱之 肺 胞音或帶氣管枝性在肺 吸收 蔵因 後出 歴 物則 迫 而 纖 含 有 維 素性 部 分空氣時 沉着 物 再 則

發微 弱 之 肺 胞音空氣缺乏時則發氣管枝 性。

患 香之 全身狀態多渗出物呼吸困難胸部 種 無 定尿碱 少脈 摶 刺痛。咳嗽至於化膜性肋膜炎之患者必顏面 蒼白食慾不思

第七 童 肋

意翌日之夜排尿十數次其量實太多余越三日往診時獨音已滅成爲呼吸音示肋膜腔內之滲出物顯然滅吐云云余因告其此宜以鎮吐爲先急之務遂與小半夏加茯苓湯翌日惡心嘔吐已愈食慾亦來驚喜之至不 肋膜炎性癒着亦用大柴的湯四逆散或小柴胡湯荷永永服之可以漸次輕快 物入口即吐不能入 余會診察一婦人左肺下葉結核浸潤右倒有溼性肋膜炎而兼麻痺性腳氣初診之日惡心嘔吐不論藥與食 少於此可知小半加茯苓湯不必全爲鎮吐從證運用能收意外之效更可見漢醫學之微妙而具哲理也 苔白而 者與白 胃其原因該患者語云西醫因欲從小便除肋膜之水與服利尿藥因此非常痛苦致起嘔 虎人參湯胸痛不堪者用甘草湯芍藥甘草湯四逆 溼性均以柴胡焉主藥小柴胡湯大柴胡湯四逆散柴胡桂枝 散小 陷胸 仍湯等能力 湯等應用最 奏效 多高熱口

實驗例

煙性肋膜炎用柴胡加龍骨牡蠣湯去鉛丹亦能奏效

弦而 壓重氣分不勝檢溫三十七度五分以上此患者絕對信任余之技倆翌朝來院求治經診察爲煙性肋膜炎,月上旬耽於麻雀徹夜留戀次日右腋下至背部感輕傲之鈍痛漸覺倦怠至四月二十三日覺頭痛與右胸, 急之證明投以小柴胡湯逾七日再診時自覺的痛苦已全消失滲出波亦已消散更七日再診時在聽 上均恢復常態服藥因此中止,一日出釣於東京灣操舟中流遇強風以全力支持。傳養登岸來院再訴胸痛。 稍散微)男。年三 非肋膜病矣經數日之休息即復健康云。 十一六年前歷經性肋膜炎勉力醫治約經一年,漸輕較快自後健康至今不自知其有病也本 有舌苔食慾不振體動時有呼吸迫促之感覺胸肋有苦滿之證明大便一 日一行直 性肋膜炎脈 腹筋亦無

打鈴上無大變有食慾大便一日一行,月經正調與以小柴胡湯合桂枝甘草湯服藥三週微熟與動悸均

(一)女年三十。去春程肋膜炎已經一年。診時脈搏九十六至有動悸胃內無停水左背下部呼吸音微弱聽診

次得復健康

三遇左胸輕快知得全治之喜矣此患者所謂肋膜炎性癒着也短時日中能奏偉效實深自喜。三日一行心下部及肋下有抵抗之感直腹筋不攀急腹部一體緊張不輕弱與以小柴胡揚合小陷胸邊服藥(三)男年二十三罹肋膜炎已經歷十閱月左胸壓迫之感不去他無所苦體温平常有食慾亦動悸無奸大便

信者

(張氏醫語) 凡咳嗽面赤胸腹別常熱性手足時涼其脈供者熱痰在膈上也小陷胸場治之。

第八章 肺結核

肺結核性疾患在漢醫學上有種種病名如勞察膏蒸肺逐肺勞勞咳勞症痰勞奪勞風勞傳生勞達傳尸勞花

顏勞奔馬勞桃花蛙等

【原因】 本病有一定之補助原因促其傳染大概如次。 本病之病原菌為結核桿菌但多數為釀膜球菌之混合傳染而尤以連鎖狀球菌為甚。

- 程本病也此體質由於家族遺傳者也 (一)禮格 短续方形之人。程肺勞者少身長繼弱藩自胸廓長茲。及其擴張少者即所謂勞瘵質體質之人易
- (一)空氣 新鮮空氣之缺乏者易促本病之發生也如終日密閉於工場或生活於作業之室或呼吸塵埃之 人以程肺勞之傾向多耳
- (三)身體之抵抗力減弱之狀態 營養不給長時間之疾患焦心苦處憂鬱及精神與奮者亦易增傳染之危
- (四)因肺疾患或其他之疾患亦容易爲結核菌所傳染。

十七歲至三十歲之間多易糧本病之傾向

本病之原因可分爲原發性與續發性二種

甲)原發性肺勞者獨立的發於肺之自臟也可區别爲如次之原因。

一)空氣傳染

一選傳 往時所謂遺傳肺勞非直接遺傳病菌乃係遺傳體質即癆瘵之遺傳也。染。空氣與肺結核菌同行吸入而起。

(三)食物性肺結核 此因攝取有結核菌之食物而起。

四)交媾或接吻之傳染

者亦多云。 發而起肺結核者是也而氣管枝缘巴腺之結核往往焉肺結核之前驅尤堪注意此外因肋膜炎之續發而 (乙)續發性肺痨者續發於其他臟器之結核也如因骨關節皮膚淋巴腺腸管喉頭泌尿生殖器結核之續

(一)大多為營進性徐徐而起發病之初期往往看過未能注意女子初發此病往往觀認爲頑固之萎黄病其本病之經過有種種摘其要者如次。可以見貨幣狀痰球狀痰但此甚少亦有不吐出喀痰者此時則不得不診定其他之症候矣。 出於喀痰中也是故喀痰之中。彈力纖維愈見其多者可以測知肺組織之崩壞愈盛若肺已形成空洞時期,則 力纖維因本病而致肺組織崩壞而其抵抗之力。比較強大故其他物質雖已潰滅而此彈力纖維循 【症候】 肺結核確實之診定為證明喀痰中有結核菌此外彈力纖維存在於喀痰之中亦不可不注意此彈 存其形而

神經衰弱之症而不知實係本病之初期也。有時呈神經衰弱狀之症狀對於事物處處倦怠睡眠不安食慾不振此際倫輕忽於診察往往亦誤認爲單係 例也此外如慢性喉頭加答兒慢性胃腸加答兒洛伊馬基斯性筋痛關節痛等皆爲肺痨初期之一症 也。

睡眠其 間。 則後 實 綾 亦 媝. 漸 係本病之 明 次咳出 其 原 因. 喀波稍稍 其後 初期 也。 漸 次瘦削成層進性 運動即覺心 悸亢進呼吸迫促 之肺痨者其始早晚咳嗽初焉乾性每 全身違和。 輕度發熱夜間 亥 嗽 尤甚 、之後僅 極

精神之大與奮俄然喀出血 不思就 反於上述之曆進症突 醫迨至突然喀血始 然發病 痰者 驚而乞 是也但為數 者亦 J診者故此 有之即 甚稀大抵在喀血之前。 向來健 時往往發見 康 而 就 肺已 職 業。 肺上 達中 或因 身體 等度 總有多少 之變潤 過勞 一變化患者 或 者 因 過 酒。 蚊 罹 感 留. 或 症 以

所致也 此外 而來故 此消 度向前方突 格細筋肉 本病之理學的 其狀恰如 之初 耗 虰 初發期於甚重篇之熱性其全身症 此 從類 髮顯 性類 育色之量翳胸廓異長之長而扁平 顏 名痨瘵性 期 面 瘻 部之 出作 著乾 天使之羽翼故名翼狀肩胛骨連 潮 削 當此之時 紅 檢查先 皮下脂; 紅 往往現於肺之患部與 成所謂羅 燥而且纖細背部纖毛 皮 **望**診亦可以推知病之犯肺也又患部方面之瞳 一胸廓 膚 診查 亦呈 肪 爲垄彰觀其有無 亦 組 胸廓 特維芝克氏角心窩之季肋 產白色軟弱而 織 日麻痺胸如 僅 微颜 往往 示 患部之一面。 面 此 茂生眼耳放一 能 候 蒼 胸 且菲薄背部毛細管透映類部呈限劃性潮紅此名爲消耗 白、豚管運動神經系統有容易與奮之傾向稍稍勞動或精 種特有之體質即所謂癆瘵質 認識 鴚 前後直徑甚小 間廣者 是頭 廓 爲 其所營之呼吸運 與他一 痛高熱舌乾食思缺乏便通 肺痨之徵 脇間 角大多 種特有之光 方面比較之能顯然 筋 脇 間腔顯 羸 候須經一定期間 弱之 灰銳 動 孔 然之 輝 角肩胛骨之內緣與 甚 開大亦可爲診 所致也肩 少須在 廣 者凡有此質之人大抵身長 膜呈带青白色眼球 胸骨體 後始見 **心區别此** 印骨 一架吸 不整睡眠不 断之一 離開者鋸 與把柄部 息時方能 出本病。 因頸部交感神 **胸廓** 安其狀酷 助其理由 之背 往往 幽 之結 드 一健康 択 面 凹 筋 合 題 陷。 與 經歷 神稍 部 性 而 似 軟 之 頄 眼 前 高

理學的徵候因病期之早晚而有千差萬别大略可分左之三時期。

形而起於肺之下葉之肺結核者此則於診查上不可不精密者也 打診上音之相差甚微往往難於聽取非熟練者不能聽診上呼吸音微呈弱或呈粗裂或呈不定性有時呈斷 初期 呼吸音當咳嗽之時,大多在瞬間呈無響性之小水炮音。此所謂肺尖加答兒之徵也但亦有異於上述情 候大 多現於肺尖就中來自右面者最多此種患者之整診爲呼吸時患部之運

爲緩慢呼氣延長屢現氣管枝音。且能聽取得中等大或小之水泡音。患部之聲音振盪旺盛 (二)確定的肺痨 一癆疾病此時患者之肺組織陷於結核性浸潤疾病若在一面者在深呼吸時呼吸運動較諸健康之一面 初期肺痨之局處加答兒症狀已判然者即可確定為肺痨其病狀更進一步即能明白其

所見即打診的音響變換。聽診上有高調之氣管音及屡發空**惡性呼吸音。吸氣往往銳利。有多數之養沸性大** (三)完成期肺癆 此時期肺已形成空洞故患部陷沒呼吸之際呼吸運動全無打診上帶鼓音一種特有之

水泡音。或大水泡音與中水泡音交發。

名曰亞消耗熱此熱見於初期肺痨者焉多亦有在消耗熱亞消耗熱之中間呈幾多不定型之熱候者此外有 體溫無變化大多上昇朝展正常或在正常以下薄暮遠三十八度乃至四十度名曰消耗熱此熱在確定及完 成期之間最顯著屢屢始於惡寒發熟終於發汗又有朝間與夕間之體温相差一度乃至一度半者此種之 日間最低三十六度六七分最高三十七度三四分者非用檢過器不易明瞭因患者決不自訴熱感也此 障礙訴食慾不振惡心嘔吐 癆之際見之來於肺尖加答見徵候之時機者爲多此際患者大多神經過較些細小事即易興奮且自 重篇病症之苦慮多數低恨盜汗(盜汗從夜半至天曉者爲多)因之妨及睡眠心神甚形困憊此外

肺痨之經過以上述弛張性熱型緩慢進行者為多但亦有一種名奔馬性肺痨者乃從急性者經過中件以稽

留熱患者多係衰弱者或併發症一經遭罹至多二週即死但如此者亦甚稀云。

併發症分限局性轉發性及衰憊性三種述之如左。

洞喀血 (一)限局性併發症中最頻繁者爲喀血喀血有初期喀血與空侗喀血之分。初期喀血對於生命尙少危險空 而血量較多則易致失血而死。或血液填充於氣管惹起窒息而死,又在本病之經過中所起之喀

量之程度亦有種種

起於肺上葉之下綠或肺中葉之上緣乳腺及腋窩之間此時患者突然覺劇烈之胸痛與呼吸困難但穿通則 之過勞。亦有起於安靜之時者。此因脇膜內皮之直下。有乾酪性樣病竈。穿通脇膜腔而 本病之患者。五分之一必發氣胸而水氣胸尤多其渗出之物以漿液性爲最多氣胸原因於劇甚之咳嗽身體 限局性併發症有與纖維素性或漿液性脇膜炎併發者出血性脇膜炎則在脇膜結核時見之 **占漸漸而起者不伴顯著之痛苦** 起其穿通之部位大多

(一)轉移性併發症發於諸多之臟器或起於含有結核菌之喀痰或起於結核菌從肺臟輸送至血管及淋巴

管名為栓塞性者

喉頭咽頭口腔粘膜及舌之結核性疾患大多因喀痰潴留於該部致起結核傳染而來因喀波誤嚥犯及腸粘

膜之淋巴濾胞故形成症核性潰瘍也

血器性續發結核除前述器官之外。尚有現於其他諸臟器者如腦膜泌尿生殖器腹膜等肺痨患者因結核性

腦膜炎或全身粟粒結核而死者甚多云。

為多三其他諸種嚴器中乃由起潑粉樣變性所致。倘起腎臟之殿粉樣變性則下肢起強度之年腫若腸粘膜 (三) 麦憊性併發症中厥為惡液質浮腫及衰憊性靜脈血塞此靜脈血塞每發於股靜脈 內尤以左面 一股靜脈

筠八章 肺結核 一般粉模變性不能制止時則誘發下痢

【療法】 肺尖加答兒之時期中應用小柴胡湯及其加減方者最多。

龚血甚呈萎黄病狀之症狀者當歸芍藥散黄耆建中湯、黄耆桂枝五物湯亦兼用之但黄耆建中湯若久用之

反有病勢增惡之懼

慢性喉頭加答兒之症狀從證可用半夏厚朴湯橘皮竹茹湯麥門冬湯等。

者可用一時權宜之計與黄耆建中湯或桂枝加芍藥湯余會診一 如患洛伊馬基斯性筋痛關節痛者應用柴胡桂枝湯四逆散或桂枝茯苓丸當歸芍藥散擊急狀之疼痛 慢性肠加 答兒之症狀除柴胡劑之外亦可用生姜瀉心湯、甘草瀉心湯、黄芩湯、人参湯、大建中湯等。 右肩背有強急之狀右腹直筋攣急而 有疼 而

痛之肺結核患者與以黄耆建中二帖而見效此不過一時權宜用之耳不宜永久服用也 效但有下痢之傾向者若與此方。反增下痢也至於分量方面用時亦宜注意 勢盜汗而兼不眠之苦者應用酸棗仁湯酸棗仁湯不限於結核余對於盜汗不眠者屢屢用此方而屢屢收奇 呈神經衰弱症之症狀中。以胃阿篤尼症者爲多屢屢 證明胃內停水此種患者宜用茯苓飲胃內不停水易疲

姜湯症狀可以速治(喀血可參照症候篇喀血係) 與以麥門各湯僅二日而血即止又凡發作性劇甚之咳嗽。全身流冷汗。手足厥冷喀痰有紅絲者與以甘草乾 乾姜湯柏葉湯等。余會診一病。喀少量之血。西醫用手術不能止。診時發熱三十九度餘咽乾枯燥。有上氣之聲。 初期喀血者用瀉心湯黃連阿膠湯桃核承氣湯此外亦可從證選用麥門冬場炙甘草湯苦參湯人參湯、 甘草

往來寒熱者。以用小柴胡焉定則,日暮時達三十八九度,日晡亦有潮熱者。應用小柴胡湯或柴胡去半夏 效已經形成空洞而喀血者如用石膏劑則見效者甚稀。 石膏配劑之方劑可寒效肺結核用石膏劑與梔子劑者比較爲少云又初期喀血之際用白虎人參揚亦可奏 [湯其他如麥門各場苦參場亦可用之身熱或煩熱者可用以上方劑及其加 减方結核熱者脇 膜炎 性者。 加

盗汗除用酸棗仁湯之外可應用小柴胡湯及其加碱方.

前輩醫家、凡遇咳嗽之病。往往配用桔梗或五味子配劑之方劑。但桔梗往往妨害食慾而誘起惡心或招喀血,

濫用者不可不慎也

門各湯證也以上證狀之外,兼動悸強呼吸在淺表者,甘草湯之證也以上二方證對於熱之高低血痰之有無 喉部有枯燥之氣味腹部一體無力大便多而不通快軟便少日一二回有殘剩之意味感壓出之力不足者麥 病症進行中從柴胡劑應用麥門冬湯及炙甘草湯之時機爲多凡頓上有限局性之潮紅赤舌或無**苔乾燥** 可不必顧慮但二方證亦爲陽虛證非陰虛證也凡有熱狀而無寒狀者用之。

實驗例

本病爲人人所忌故患者姓名從略左揭諸例均爲西醫所難治者至於輕度之加答兒因無引例之必要故亦

血痰不止體温依然加以一方漸次衰弱於是有人勸入本院乞治於余。 用鳥伊達兒檢查反應為陰性經過十四五日始出血痰此時始診斷為肺炎開始用肺炎之注射與煙布然而 診斷之結果。認為流行感冒與以發汗劑以圖下解不料高熱依然在三十九度以上經過十日猶爲腸窒扶斯。 (一)男年三十數年前罹輕度之肺尖加答兒約在二個月前忽然惡寒戰慄發近四十度之高熱請附近

有之速脈舌鮮紅中有乾固狀態經不足因之唾液粘着於舌致言語不能流暢喀痰多泡沫稍稍多量則出血初診在昭和七年十月四日脈稍浮而底無力近脈不頻數體温三十九三分脈搏八十二至無結核性疾患特 日浣腸則通所下者為軟便每夜必盜汗食慾少。 有小水泡音呼氣延長則右上葉發鰈咖聲腹部稍陷沒而少抵抗直腹筋左右均不攀急大便每

佘與以麥門冬湯。翌日血痰止便自然出,漸次口內濡。全身有元氣,十日之後體温降至三十八度下,漸次有食 肺結核

漸能起步自行來院此時起下痢腰椎覺痛已屆肺癆去之時期其肛門起炎則用權宜處置投與黄芩加半夏仍爲小水泡音因在小柴胡湯中兼用橘皮竹茹湯前後七個月漸次體温恢復常態咳嗽大半去體重增加漸 慾一個月之後降至三十七度六七分**盗**奸亦止但入於十二月三十七度五六分之熱不去。咳嗽不止聽診上

一年中發一二次之大喀血發高熱平素則有微熱之程度在余初診(昭和七年十月二十一日)之前約二週(二)女年二十四年前因肺結核病名而就醫約一年前訴腹痛與一日二三回之下痢醫者診斷爲腸結核每 間會大喀血心藏衰弱浮腫。高熱嘔吐醫師宣告絕望放棄投藥注射。家人亦相圍以待其死鄰人有勸說本院 生姜湯柴胡桂枝湯桂枝茯苓丸

苦满在他覺的不能證明直腹筋攣急大便二三日一來喀血巴止咳嗽殆無右背之肩胛間部發見水泡音胸 不口渴右胸下部證明有輕獨音發見呼吸音極微弱之部分右膝下淋巴腺腫有一個腹部無軟弱之 初診之日。顏色帶熱氣之潮紅而不蒼白。全身有輕度之浮腫脈搏爲二十五至而細。心悸亢進舌鮮紅 /態胸脇 色。溼

枝茯苓丸翌日下痢四次熱亦急下。最高者三十七度二三分入於十二月最高三十六度五六分全身肥備一日一行。元氣次第出來。但夕刻仍有近三十九度之熱顏面潮紅恰如酒醉之狀因從十一月十三日始兼用桂 見如健康之人於次年一月之下旬見月經自後每月整調此患者月經年無二三回月經來時必起大喀血然 余對於此患者先用麥門各場次轉方用柴胡去半夏加栝羹湯服後尿利增加全身之浮種去食慾有大便一 部亦有水泡音,月經已二個月不通 自每月見經血後喀血全無輕熱亦無反覺身體健旺矣。

見之症狀者。用桂枝茯苓丸多有效又此種患者月經時期與推定每月交移者、桃核承氣湯瞪也經血下則 月經不順與肺結核兩者有微妙之關係罹肺結核者在病狀進行中,月經屢屢但反之,月經逆顯出肺尖加答

目頓挫矣.

不勝其煩茲述處方之異度並述當時之症狀 中而漸次登上鬼籍。入余手時已達結核末期諸症蜂起。然倖能教起。殊足自快其間經過複雜詳細記述殊覺 三)此例已命迫旦夕。從昭和七年一月至十一月十七日受西醫之投藥,其後修得西式強健術在醫學之手

麥門各湯服後喀痰之排洩亦不感困難體温亦往來於三十七度三十八度之間。 耆建中湯二帖後呼吸已不感困難。但同時咽乾口燥甚發熱越三十九度此亦黄耆建中陽之所致翌日投與 汗恙。右直腹筋攣縮,只能行潛在呼吸。言語斷續西醫診斷爲心臟衰弱故注射噴爲棒因之更形危險。自服黄 七月一日投與黄耆建中湯二帖鎮服此時患者訴臥不得臥呼吸咳嗽均不能右面從肩胛部至腰部疼痛晚

七月十六日訴不眠因兼用酸棄仁湯。

七月三十日兼用三物黄芩汤因有蓐瘡故也續服不滿一月麝瘡大半快癒此時已在八月之未熟度降至三 以熊膽末自後時時有此種情形發作。每發作時。與以熊膽末必奏效從此日起中止麥門各湯而與炙甘草湯。 七月十八日心悸亢進呼吸迫促遊家人認為轉歸之期已屆咸苦悶不堪招近鄰之醫師注射康浦兒是日與 十七度三四分左右。食慾亦有一般狀態頗呈平安之象。

九月十三日又投與黄耆建中湯因從七月一日起至現在胸背起痛故也

此患者左肺浸潤。右肺上葉亦浸潤從九月上旬起病狀非常輕快或能得慶全功惜平十一月十七日服藥中 語亦不能飲水。口腔內有微細之泡沫。此日與甘草乾姜湯自後凡發作時,投與甘草乾姜湯則堅快。 九月二十日來一種無名狀之急迫性之咳嗽(咳嗽與噦逆症狀有區别)發作時全身厥冷流冷汗不能

備考

止又乞西醫治療以後則未知其如何結局也

後篇 第八章 肺結核

惟 竭者養肺 方爲宜長久不止者用斷 六黄汤最初 沙勞者 竹茹温 實之證所謂真寒假熱也竹葉石膏湯爲宜亦可用滋陰降火湯久患勢而不欲飲食者補中益氣湯 胸 塞者柴胡枳 日之咳日日往來 扶 瀉 多 嬴 甚者用吐酒 湯等治 如 湯之主證也清肺湯亦宜如前證而咽喉微痛吐白抹甚多時時不能離痰盂者加麥門各湯 食體自能 人参養榮 散亦宜 湯或在 無寒熱 枯 榜之良劑不過此三方耳。鼈甲爲治勞聖樂楊氏家藏方中治勞之方。多有鼈甲組入之 湯 《湯爲宜。 又用 為宜此 寒熱 痛處 石得 而 自愈蝦蟆亦 喀 初 贴 四陰煎甘露飲等亦宜疲 紅飲花藥石散阿芙蓉液之類潮熱盜汗咳 血者涼膈散焉宜勞證已 效。 咳 日 (嗽氣 簽 種 夜 而 此逕云吐法可知肺病實爲最 佨 情 骇 急脈 膏亦宜多出盜杆者柴胡桂 形。 嗽 可食用食蝦蟆可愈疳勞其 類 見 浮數。 似 恋 肺 癰. 覓 微 秋 不 痰 可不熟察儒 者。 《勞甚而五心煩熱舌胎黑而 之症狀者柴胡桂枝湯 宜 備而吐血 用 小 者三黄陽加犀角犀角地 有趣味之病 門 效能甚著潮熱咳嗽擊嗄 枝乾姜湯可 事 親 合 中 嗽、 麻 脈 有 杏 公矣胸? 之證 得奇驗血虛 勞行: 出 散等諸證備者選 石 痛喘咳痰 吐法之 乾燥衣被盡欲退者是極 也 湯。)胸脇 熱多出盜 、咽乾。 語。 製痛 黄湯柴胡四合湯之 雖 多 查 (者可 一披勞非 身體 用緩 起 居 技場 汗者 熹 用 中 根 瘦津 栝 吐 治. 為宜氣 解勞散、 劑 或枯 與 但 之 實 枳 虛 液 口 中 合 枯 實

大塚按)以上揭內科祕錄中虛勞 一之通稱也。 虚勞與骨蒸 皮 若不 瓜 勞瘵 仁枳實茯苓貝母生姜竹瀝也竹站温膽湯者。 小柴胡湯 别其病名如何。 倂 爲 梗、 方中去人多大東加桔梗枳,如何將金匱之方劑運用於 談棗 麥門冬也 金匱之方劑運 勞際骨蒸編之說據今日諸家之議論虚勞即 軒翁云勞之別 當歸六黃湯者當歸生地黃熟地黃黃柏黃芩黃香黃 名 雞 實、 多古名虛勢。 、括葉仁 一條。而 不問其 小 也瓜 柴奶 金 湯合橘皮竹茹湯方中去黄芩 為虚 貧 載 枳 營肺勞同 其 實湯 治 今 者。 法 公云夫虚 當歸、 ·日之肺: 視之不已 砂 仁木香 紶 一勞之 建也 核余 市市 矛盾 虚文 亦 不

人多升麻柴胡橘皮當歸白朮也人多養榮湯者人多白朮茯苓甘草乾姜大棗當歸芍藥地黄桂枝黄養之火湯者當歸白朮熟地黄天門冬麥門冬生地黄陳皮黄柏知母甘草生姜大棗也補中益氣湯者黄耆甘草芍藥百合砂仁茯苓也甘露飲者、枇杷葉熟地黄天門冬枳敷茵蔯生地黄麥門冬石斛甘草黄芩也滋陰及天門冬麥門冬五味子甘草黄芩大棗生姜也瀉白散者。桑白地骨皮粳米甘草也四陰煎者生地黄麥門冬天門冬麥門 皮也。 藥石入於童便 草五味子具母杏仁茯苓桑白枳實大棗柴胡也清肺湯者桔梗茯苓陳皮桑白具母當歸杏仁山秦艽扶羸湯者秦艽鼈甲人参當歸半夏紫苑甘草柴胡地骨烏梅大棗生姜也養肺湯者人参阿 四物 消、甘 與酒 湯者。 草連翹山梔子黄芩薄荷桔梗也三黄湯者為 小柴胡 或 醋 而飲之也緩痃湯者柴胡桂枝乾姜湯加鼈甲芍 湯加地黄當歸 芍 藥川 穹也 斯紅飲者大麥地黄 心湯也 犀角地黄 藥也 玫瑰花甘草也花 解勞散者四逆散加髓 犀角、 石 門冬、 梔

能般下劑可以攻擊而勝邪在表則可以發行治之發行吐下之藥中多大力猛酸之品病重者循能施民的胎而滑邪不入胃陽氣不入於表也然則邪何處曰入於臟腑中入於胃則舌上現黑胎而乾燥病 道但入於臟腑或三焦者。其力已不足。難於當大敵故不得不用消化ç通之法凡 至輕是爲治勞咳之第一 等之症醫家多常用 其藥之立意非疎通三焦不可以治。三焦疎通之藥本草干七百餘種中。僅有柴胡升麻之類數品。 湯生脈散逍遙散盆氣湯柴胡養榮湯清燥養榮湯人參養榮湯柴胡去半夏加瓜養 勞咳之病。因三焦之膜原。年久損壞。不表不裏。無上部亦無下部病在半表半裏少陽之部位 小柴胡湯四逆散麻杏甘石湯麻黄升麻湯麥門冬湯竹葉石 義傷寒論藏結條中舌上勻胎滑者難治其理同也沒因 症之方也此外脈症之方其奇酸者。肉多雜見於偽寒金匱時後方外五千金以及 膏湯 勞咳 寒邪不過 白虎 m 湯. 脈數潮紅盜 表而 加人 而乾燥病雖重。 入於裏 病至重 療治之 表 時 、 其

志橘皮五

一味子也,

過之類所謂應勞咳

脤

籞 Ņ

肺

結核

近世單方彙編等等民間之草藥亦有合理者但不知其理而漫用奇方或高價之藥徒足害病人耳此尤不可

不知者也。

第九章 心臟瓣膜症

後天性心臟瓣膜障礙爲心臟疾患中之最頻繁者其症狀有種種總括之分爲左之二種。

(甲)心臟瓣膜閉鎖不全。

(乙)心臟辯膜孔狹窄。

此兩症隱屢併發於同一之瓣膜且大多不甚顯著不能辨其是甲是乙

後天性心臟瓣膜障礙發於左心室瓣膜者最多尤其在僧帽瓣上屢屢見之 者亦多此中尤以急性關節洛伊馬基斯之經過中焉甚此外避膜瘤腫瘍形成瓣膜破裂過度之心筋緊張等。 本病之原因有種種其主要者為心內膜炎與動脈硬化症最類者為來於心內膜炎之後而從急性傳染病來

亦爲本锅之原因。

【症候】 (甲) 局處的心臟症候 大動脈瓣閉鎖不全之主徵為舒張期的大動脈雜音左心室擴張肥大虎

骨動脈上有速脈與硬脈

本病患者在數年之間不訴痛苦其外之快活不異於常態此因左心室之筋肉鞏固容易調節血液之障礙而

能保持血液循環之故。

自覺症焉不快之心悸動(體動則增劇)與眩暈頭貌多蒼白色屢屢反覆衂血 大動脈孔狹窄則起收縮期的大動脈雜音左心室擴張與肥大機骨動脈上顯徐脈邊脈小脈顏面是蒼白色

往往陷於腦貧血而致不省人事。

僧帽辯之閉鎖不全則當左心室之收縮期中血液不能循流於大動脈管內一部向左心房內逆流此際左 房受容之血量非常之大,一因肺靜脈血,一因逆流之故致血液充盈左心房因之擴張而其壁菲薄。但不顯著

抑制遂起肥大也 狀。死及肺靜脈之範圍達於肺毛細管及肺動脈。遂致波及右心室於是右心室亦因鬱血而起擴張又欲努力 鳴、又因左心房之壁菲薄致收縮力乏而又容受肺靜脈及左心室所來之多量血液致起鬱血症狀此鬱血症 因肺靜脈及左心室兩方所來之血流相合於左心房內形成旋渦故聽診上現收縮期雜音其性平等且如

损頭但右心室之擴張與肥大在代償之機能盛時往往不見。 右心室壞惡在打診上心臟濁音部境大其右界超過胸骨左線此際第二肺動脈音旺盛胸骨體上起强盛之

室之肥大。 常之血液。同時又容受逆流之血液於是多量之血液整積於左心室而起擴張矣又在收縮期中此多量之血 液奔出之際,血液不向大動脈內順流,而向左心房逆流左心室又不得不努以輸送此血量的結局至招左心 左心室因本病而努力血液在左心室收縮期中從左心室向左心房逆流在其舒張期時一面容受左心室正

本病在保持代償機能之間脈搏正常。

僧帽瓣孔狹窄之主徵為收縮期前雜音。或舒張期的雜音。並右心室之擴張與肥大此外則為心窩搏動。

搏動之範圍甚為廣大

音此雜音通例能在心尖部顯然聽得右心室移動於前方之時在心尖部稍左上方可以著明但音調雖 本病在左心室舒張之際。血液從左心房經價帽瓣之狹孔向廣大之左心室逆奔形成旋渦至發舒張期的 時而傳播於其他部 分者則僅微亦不傳達於動脈瓣孔卻僅於左方之背部。

後篇 第九章 心臓瓣膜症

本症之雜音粗糙而不軟純呈轉輪狀或凹凸狀

左心室之血液為狹窄之值帽瓣孔所隔致肺靜脈肺毛細管肺動脈起鬱血狀態波及於右心室右心室因合

容多量之血液而呈擴張打診上濁音界廣延於右方右界超過胸骨右緣而至左方。

橈骨動脈搏小而緊張力弱,且多不正。

三尖瓣閉鎖不全之主要症候為三尖瓣孔之收縮期的雜音右心室之擴張肥大陽性靜脈搏等此陽性靜 脈

搏在診斷上殊有價值。

陽性靜脈搏者當收縮期間從右心室逆流於右心房之血液因心筋收縮之力不衰致入於兩大靜脈故現靜。

脈搏也。

橈骨動脈搏細者其緊張微弱也

(乙)全身靜脈鬱血 心筋衰弱代償機障礙心瓣膜障礙者因心臟之擴張與肥大至一定之度而止則血此外尙有三尖瓣孔狹窄肺動脈瓣閉鎖不全肺動脈瓣孔狹窄等因其稀有故省略 液之循環適宜代償亦適當但心筋之力。一有萎縮之時而不能適應於是代償機能亡失矣此之謂代價機障

砭代價機一有障礙。这呈全身靜脈鬱血之症狀矣。

牌臟動脈形成血栓則當脾臟部發劇甚之疼痛起戰慄患者之顛貌變蒼白色甚苦悶伴以發熱嘔吐脾臟腫生痛苦此血拴由於瓣膜之增殖物崩潰混於血液而入動脈管因輸送於遠隔之器官致作成拴塞也 大壓之訴疼痛腎臟動脈之血栓亦誘發嘔吐戰慄及發熱訴激甚之腎臟痛屢屢漏血尿。 丙)羟塞性症狀 本病患者於代償機障礙之外。又形成血栓屢屢陷於重篤血拴形成之特徵為俄然發

腸間膜動脈中作血栓則俄然發腹部疼痛起腹膜炎排洩便血。

肝臟動脈之血羟茜稀其主要症狀爲強度之黃疸急激之肝臟縮小。

四肢動脈中作血栓則位於閉塞的動脈管部之末梢的肢部失脈搏而厥冷若副行循環之形成不充分時則

該部起壞疽。

如腦出血發作之狀醒覺之後右側來偏癱多陷於失語症。 腦動脈之血控起於左頸動脈之枝流者最多且常惹起奇兒皮斯氏窩動脈之閉塞此種患者多失神卒倒恰

網動時之血拴則俄然起失明

滿或胸腹須動呼吸迫促者亦可用桂枝甘草龍骨牡蠣湯、茯苓甘草湯之類。 【療法】 心悸動眩暈衂血頭面蒼白者用當歸芍藥散苓桂朮甘湯桂枝茯苓丸之類現緣血症狀浮腫喘 藥散之類或兼用。或合方亦可此外柴胡加龍骨牡蠣湯可以去浮腫動悸神經過敏小便不利此際若胸脇苦 肝不肥大而訴胸脇苦滿大小便不利者亦應用前方或從證明苓桂朮甘湯、桃核承氣湯、桂枝茯苓丸當歸芍 訴尿不利。心下部證明有痞堅者與以木防已湯、肝臟肥大大小便不利者用大柴胡湯、柴胡加芒硝湯之類又

第十章 心囊炎

|照「症候與治方」第八章第九章及動脈硬化症像

中如急性關節洛伊馬塞斯或結核猩紅熱敗血症(二)寒冒外傷及消耗性疾患(三)鄰接器官之炎症(四) 【原因】 本病爲分裂菌侵入心囊內逞發炎作用時所起而誘助分裂菌傳染之誘因爲(一)諸種之傳染就

本病以外之心囊炎等。

【症候】 本病之症候以局部之理學的變化為主全身症狀缺如或甚不定 纖維素性心囊炎以心囊性摩擦音為主徵心囊摩擦音之特性為表在性其性帶爬抓狀在心囊搏動期大多 機完全一致者甚稀心囊性摩擦音有時甚爲顯著。手掌可以觸知甚至患者自己能感觸其在胸腔之內云。

後蹈 第十章 心囊炎

患者之禮位變化其音調亦變化若患者前屈則聽診時其音明瞭而調高。 性雜音大多限局於心囊獨音部出於此部之外者甚稀其音幽微用聽診器歷之方能聽得高調之音又

界超過心尖伸至外方。常是三角形,其尖端向上方。基底部位於下方。 溼性心囊炎者心囊內豬留液體致心臟潛音部增大,且其形變化也其病爲心臟獨音部上下左右增大,其左

因此心囊內之沒。重而下降,超過心臟之邊緣滿留於左右,經過久液體之量增加時則心失搏動漸次消失心

音亦幽微矣。

檢查之際能證明心臟濁音部增大同時有心囊性摩擦音但液性渗出物量多之時摩擦音 上述本病有乾性經性二種,其症狀現時,大多爲液性渗出物潴留於心囊內。同時形成纖維性渗出物臨牀的

全身症狀體温壓屢上昇心臟部中訴苦悶壓迫之感又往往訴疼痛脈搏頻數而不正甚至失其緊張 余對於本病治驗例之一 十九歲之處女已於半年前權本病人某醫院醫師云無相當之 辦法。

種用藥不效於是來本院求治

主證爲心臟部感苦悶壓迫脈搏頻數呼吸困難有食慾不口場月經自發病之後爲量至少尿量亦減 少體

無昇降

打診上心臟濁音部顯著增大觸診於左右之下。顯然有胸脇苦滿之證明直腹筋左右均攀急以指壓於左腸 骨窩之部分發見類敏感之部分有縱之索條物長約三橫指徑關不備二橫指徑所謂桃核承氣揚之正面腹 聽診上不斷摩擦音。心音達極微之程度。

氣湯,投後這服一週患者自覺的痛苦已輕快。尿量非常增加。 舌有淡黄之苔見於根部脈沉細數而結代大便隔日一回形硬余以大柴胡陽合枳朮陽爲主方兼用桃核承 一個月之後自覺的呼吸迫促及其他之症狀完全消散此時全身現浮腫下肢尤甚於是時行一權宜之計 胸脇苦備輕減心臟 獨音亦縮小脈搏之類數漸

投與木防己湯、二週之後更續服前方於是月經恢復如常自覺的一切異常症亦全無矣。

第十一章 脂肪心臟

【原因】 脂肪心臟來於肥胖者為多過食與運動不足亦屢爲本病之誘因

【症候】 際心悸亢造呼吸迫促眩暈及一時性失神病勢進行則夜呼吸迫促打破好夢苦惱不可名狀所謂心臟性喘 有脂肪心臟之患者心臟部訴狹窄壓迫之感常惱胸內苦悶又在輕度之身體運動及精神與奮之

心藏濁音部增大尤以向右方焉著。

息也.

疾病增惡則是心臟衰弱之徵起全身之靜脈鬱血症狀而死。

【潔法】 脂肪心臟之患者大部分焉實證如脈沉微而見陰虛證者用藥大抵失敗其實證可從證用大柴胡 陽大小承氣湯木防己湯及其加去方桃核承氣湯大黄牡丹皮湯大小陷胸湯等。

第十二章 食道炎及食道狹窄

甲 食道炎

灼熱及嚥下困難此際大抵可用梔子豉湯治之皆有一十二歲之少年於正月中喫燒餅因吞食非常灼熱之 覆花代赭石湯小陷胸湯等 一片致起食道炎嚥下作痛與以梔子豉湯、一日而全治若伴以云酸嘈雜等胃之症狀時可用生姜瀉心湯旋 撰用梔子或湯梔子乾姜湯生姜瀉心湯旋覆花代赭石湯小陷胸湯等。飲酒甚豪之人往往感食道 臨牀上殆不示何等之症候但或在嚥下之際訴胸骨部之疼痛有時感灼熱有時呈嚥下困難

後篇 第十一章 脂肪心蹟 第十二章 食道炎及食道狭窄

食道狹窄附食道

有更性惡性二種更性者由於食道之慢性潰瘍藥品之腐蝕異物之誤嚥及從食道外之壓迫而起

如起於甲狀腺腫或動脈瘤等是也惡性見於食道癌之際 本病狀態則嚥下困難吐逆或食道之一定部感食品之介在等狹窄甚時僅得通流動食物癌腫時往往 訴疼痛或壓迫廻歸神經而起麻痺致來聲音之障礙此外陷於惡液質者衰弱日加者以及他部之癌腫者同 患部

【療法】 翌日而疼痛去三日而血便止一月之後得在庭中散步矣。目下僅有時感嚥下困難别無他苦但後果已全治 與否則將俟諸異日而知矣, 半年貧血甚有心悸亢進與息切時時吐出粘稠之粘液吐時食物往往隨之而出自投旋覆花代赭石湯之後 此。 在食道癌之患者與以旋覆花代赭石場可得非常良效之成績余會診一五十八歲之男子往診時。

道友木村長久君對於西醫診斷為食道癌之症引用名古屋玄醫之利膈湯短時日中完全治愈利膈湯者半

楊氏家藏方中有二氣散之方。二氣散者即傷寒論之梔子乾薑湯也此方之主治云二氣散者治陰陽痞結咽 夏附子山梔子甘草生姜之方也。 臺狀如梅核妨礙飲食久久不愈而翻胃者。其病證實相當於今日之食道癌也。

第十三章 胃加答兒

急性胃加答兒

【原因】 本病爲日常頻繁之疾病其主要之原因爲飲食不攝生也如過量之飲食冷熱失度之食與咀嚼之

不充分腐敗食物之攝收等均爲本病之主要原因。

之食物口渴甚目擊食物心中已發生某種想像而惡心起矣此外爲屢發嘔吐甚至有吐出膽汁者。 【症候】 本病之症候中最主要者為食思缺乏與心下部感壓重膨滿患者頻頻欲食香氣高之鹽味或鹽味

中等度之加答兒症則屢屢發噯氣吃逆排洩酸味之瓦斯。

此外酸性之胃內容物有時逆流於食道內胃部或食道下部起灼熱之感此之謂嘈雜

局部之觸診覺胃部膨滿壓迫之發疼痛且往往訴該部之緊發感與壓迫感 胃液中鹽酸缺如含有多量之粘液胃之運動力減弱食物久久停滯其內。

舌現舌苔放不快之口臭患者訴糊狀之味覺

便通不正或祕結或下痢尿利殘少。

疾病之中等者不見全身症狀患者感全身倦憊訴輕度之頭痛體温三十七度五分左右重症則全身感強度

之倦怠頭痛眩晕發三十八度之熱。

二 慢性胃加答兒

【原因】 本病之原因有種種約其要不過次之五項

- 一)食餌攝取之不良
- 二二不良之齒牙
- (三) 濫用酒精喫煙過度
- 四)來胃之鬱血狀態後諸種之疾患
- 五)其他之胃疾患

後篇 第十三章 胃加答兒

本病之症候與急性胃加答兒同但其狀不急激耳大多爲食思缺乏但有時起極甚之善餓症且屢

屡欲食有香氣之刺戟性食物。

口渴之來亦較諸急性症爲稀舌多被灰白色或褐色之苔患者訴屢屢有糊狀或腐敗狀之味覺又屢屢放不

快之臭氣唾液分泌往往亢進。

此外訴不快之噯氣呃逆嘈雜噯氣從胃中出。五斯中有酸味之臭氣患者胃部訴膨滿緊張之感時時覺痛甚

者起激烈之疼痛

嘔吐亦較諸急性症爲稀吐物放酸性反應之臟臭此與其謂爲由來於鹽酸毋寧謂爲來自乳酸。

飲酒之人屢屢在展間惱嘔吐吐出唾液狀物質。

胃之運動力減退因之食物久久停滯胃中胃粘膜之吸收作用亦緩徐從望診上覺胃部膨滿壓之發疼痛亦有不少放輕度之張水音者。

便通不正大多祕結下痢者甚稀尿之量減而濃厚。

惡者之營養狀態漸次減退若不與胃弛緩症倂發者則保存營養之時間比較稍久尤其在飲酒之人因脂肪

沉着外觀不甚羸瘦

此外患者往往起精神之異狀嫌忌與他人談話思考力缺乏不欲就業自己對於生趣絕望強迫觀念屢屢襲 來其他則頭痛頭部之搏動及頭內朦朧之感尤其屢屢有眩暈之苦惱此種苦惱特稱之曰冒性眩暈又或發

心悸亢進心臌運動不正心窩苦悶狹心症或起喘息之發作。

上之方劑及甘草瀉心腸等發熱而訴全身倦怠者用小柴胡緣大柴胡緣瀉心揚承氣揚類飲酒之人早晨嘔 生姜瀉心湯噯氣甚時與旋覆花代赭石湯。舌上現舌苔(大多灰白色或淡黄色)而放不快之口臭者撰用以 不問急性慢性凡無食思心下症有壓重膨滿之感有嘔吐之傾向者與半夏瀉心場吞酸嘈難時用

吐者多用 生姜瀉心湯、小陷 胸 汤。

嘔吐激劇飲食物不能受入時先用小半夏湯、小半夏加茯苓湯、若宿食充滿胃中不下。呈微微欲吐之狀時與 起精神異 若振水音著明件胃阿篇尼症或胃擴張之症狀者用茯苓澤瀉湯茯苓飲等 瓜蒂散即可吐出若進食魚肉停滯胃中而不消化又不能吐出時與橘皮大黄朴消揚。 常者從證用以上方劑之外。並可用苓桂朮甘揚、苓桂五味甘草湯、半夏厚朴湯。

實驗

化喬灰爐近鄰祇有德宗乃西醫非漢醫也惟逢坂下有漢醫但不甚知其技倆於是伴同夫人叩余寓居。 滿之感歷之訴鈍痛。同時訴惡心食思殆無好冷飲頭重極大便三日一行尿量亦少胃部證明有輕度之振水 昭和七年八月十四日初診全身稍淡黄褐、震瘦、脈沉舌根部有淡白之苔、稍乾燥、上腹部陷沒腹部一體有彫 根治,于思萬想。思及漢法醫藥,其夫嘗憶牛込區模寺町,有淺田氏。因往訪之,人云淺田氏早已物化,其即亦已 急性症容易治癒亦可引用症之治驗左舉之例會登載於「古醫道」雜誌茲再採錄之 (一)小石川、麦町、某氏、夫人、年三十一。數年來。在慢性胃加答兒診斷之下。歷訪帝都之病院。荏苒光陰。迄不能 心悸眩暈之症狀無,月經整調因投與半夏瀉心湯。

同年十月二十四日覆診前投與半夏瀉心湯每日服之迄今從未有一日之間斷以上之症狀患全愈體重增 如昔日。

日叩余門求治。診其脈。仍中帶弦舌為厚之白苔無食思胃部有壓重之感下腹有鈍痛,大便不正胃中證明 (二)芝區新橋某男年四十三歲頭重多夢不眠。心悸亢造感疲勞。脅迫等之神經症狀於昭和八年二月十四

此君自訴在京帝國大學真鍋內科診治半年餘其間有徽毒之疑會在槐氏反應器檢查之終焉陰性目下就 第十三章 胃加答兒

頭部亦見爽快繼續服至同年七月十二日以上諸症得完全消散。 山下紅療院之治術頭痛稍稍輕快但其效果祇見於當日終不能根治云。 余因與茯苓飲合半夏厚朴湯服後數日大便調整食思稍有。

備考

後右脇下急結者用柴胡湯焉宜發黄者加茵蔯湯傷食之後脾散而消化不良微微飲食便覺心下飽悶而無 予從先師南陽之遺法專用中正湯若毒深者投草兵丸備急圓紫圓之類先取其快利然後與以前方吐下之 本間棄軒之說〕 內科祕錄傷食之條曰治法仲景之療法其毒在上焦者與瓜蒂散在下焦者用大承氣湯

飢餓之感致出噫氣吞酸等者加味平胃散爲宜 草霜也即走馬湯加百草霜也。 中正湯者。半夏、花藿香、橘皮、乾姜、厚朴、大黄、黄連、木香、甘草也加味平胃散多看胃擴聚條。草兵者。巴豆杏仁百

熨法於回春中行姜熨之法。即煎生姜之汁以熨之法也又日本有葱熨之法。即葱之汁以熨之法也葱熨姜熨。 導之藥也。行吐下之二道中從吐之變變而焉下。或行吐而仍不吐時,則行下但決無從下而變爲吐者若傷食 俱有功效予因節省麻煙用滾沸湯熨之亦收同一效果此等熨法不但可用於尋常之傷寒在霍亂時與以備 而與下劑仍屬不下。致煩悶極甚者用鍼灸熨法。完熨法有種種凡腹內鳴噫氣或矢氣瀉下爲始之疾患者。 〔有持柱里傷食之說〕 傷食之治法、祗有吐下二法。其中加以消導(消化之意)平胃散與枇杷葉湯之類,消 急圓走馬湯之類而循下所謂揮霍捺亂之際行此法亦可以助藥力之速下。 大凡傷食者已於吐瀉後發熱大渴引飲者宜與平胃散之類不可用解毒劑中之白虎腸或猪苓湯之類,

大塚日如此情形之下予等大抵運用小柴胡湯) 鹽場 (凡多食而不消化、少腹堅滿而疼痛者可與鹽湯、此方之成分每鹽一合入水三合先將藥鍋

量於火上使熱氣通徹然後將鹽塗於鍋內乘熱投水煮之一二沸之後銀意頓服以得吐爲度若不吐則用手

指採入喉中必吐出矣)

難於辨樂之時頓服極賦之鹽場一盞其效較瓜蒂散爲捷而甚方便云。 干金方云。此法大有效果爲俗人淺近之法鄙而不用者。待死之道也凡逢此病即刻先用之爲宜凡倉卒之間。

大承氣湯

枳實大黄湯(小承氣湯加檳榔甘草)

桂枝藿香湯(桂枝 **整**香 檳榔 木香 縮砂 茱萸 较朮 甘草) 傷食之症輕無吐下之必要者。

以不用此方爲宜

方篇宋代以後之新方。然凡造詣古聖之方域。與古方柴桂湯爲用之廣堪稱伯仲。此方之症食不消化心下痞 偷水穀停滯可加神麵麥芽魚肉傷可加山查子麵類傷可加杏仁生冷瓜果傷可加桂枝乾姜附子之類按此 平胃散(蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 大寮 生姜) 此方爲消導之劑或可加莎草縮砂木香藿香之類。

塞者用之。又吐下之後食毒未全盡者亦用之。

筋之狀筋通任脈者脾胃虛也此其人者必平生泄瀉下痢或不食或飲食過度者也宜調理脾胃其中有建中、香砂六君子湯(人參、蒼朮、茯苓、甘草、半夏、橘皮、香附子、藿香、砂仁)、大腹(上腹)有伏 理中六君子之類此症切忌攻擊若誤攻擊則咽喉乾燥或竭諸症從此生矣。 大腹(上腹)有伏

養脾圓(理中場加茯苓麥芽縮砂、大棗、生姜)

方則愈方可吐下而食毒去此活變之法也 附子理中場(理中湯加附子) 生來贏弱之人食毒未達內不吐下則痛者此時若用下劑痛反加劇與以此

《大塚日此時與大建中湯則吐下屢屢輕快此爲余之經驗》

四順湯(四逆湯加人參)

四逆湯加猪膽汁湯

吳茱萸湯

夏方吳茱萸湯(吳茱萸 木瓜 食盥)

以上四方爲治霍亂(即吐痢)之劇者及霍亂轉筋之劑其詳細多照霍亂條 人糞汁 土漿(同地漿)也掘地作坎其中沃以水攪濁之待其澄清而飲之。

大豆澳煮汁

以上三方治食諸菌之中毒悶亂欲死之方。

萬根黄連黄芩湯 能解酒毒。

龍生丸(石硫黃 玉穗湯(荆芥 橘皮 胡椒 山查子) 食輕之類而中毒頭痛寒熱面紅腫或身生赤斑(幕麻疹)者用此劑治之 用以上二味糊爲丸白湯送下每服五七粒)

此為魚村翁之試用方余亦屢屢試用甚有功效用此丸則吐可早

第十四章 胃潰瘍

幼兒羅本病者甚稀。鐵之抵抗不足遂焉本病。鐵之抵抗不足遂焉本病。如是對於之一爲處案侵害血行障礙鹽酸在該局部逞其作用以致胃組、如果,以以以外,以以以外,以以以外,以以以及,以以以及,以以以及,以以以及,以

茲舉本病原因中之重要者如次。

一)萎黄病及貧血屢屢爲本病之一原因。 委黄病者胃組織之抵抗力弱之故也由此而呈胃酸多之症又

有血色素障礙而起之說

- (一)攝取過熱之食物亦爲本病之誘因。 三) 胃部之外傷亦屡屢爲本病之原因。 如打撲之傷強度之嘔吐多易起本病
- 四)傳染病尤以肺結核及徽毒最易發本病。

五)從大火傷而來之本病 此恐係赤血球之分解或血小板之拴塞或胃粘膜血管之閉塞

貧血之結果來眩暈耳高難聽黑視眼火閃發心悸亢進呼吸迫促人事不省等甚者起間代性痙攣这至於死 搏微弱。呈重搏性心音幽微呈收縮期的雜音。心室擴張此外有排洩蛋白尿下肢或頭面現輕度之浮腫又腦 有時在胃出血之後起盲目其他在胃出血之次排洩黑色之糞便 固之殘餘食物呈酸性反應其吐出之量有種種量微者患者無異常之經過量多者患者之顏面變著白色脈 【症候】 本病之症候中之最緊要者為胃出血起胃出血時,大多吐血其吐出之物質呈褐赤色一部分混 六)攝取有害食物之食與亦促本病之發生。 例如澱粉性食物之攝取過度酒精之濫用等

其痛尤甚觸診胃部。在發作性疼痛部位。訴限局之疼痛,但本病之疼痛。起於胃內容物之存在之時倘胃中完 胃痛亦爲本病重要症候之一,大多來自發作性限局於一局所食物之後驟然而起而在攝取消化 全空虛則潰瘍並不發痛僅胃部感覺有不快之鈍痛狀態胃痛之性狀亦有種種或如灼熱或如刺或如變又 2食物之後

其痛雖限局於一局部但亦放散至胸部上臍脊部。 食物後起疼痛遂致嫌忌食物口渴增進舌呈滑澤之赤色 **嘔吐亦屢屢頻發,大多與胃痛之發作同起噯氣嘈凝,亦爲往往兼見之症候食慾大多無障礙。但因恐怕攝取**

本病患者於吐血之外大多嘔吐訴胃痛厚味之藥物胃中大多不能容受在嘔吐之時先用甘草陽或大半夏 胃出血者選用人参湯柏葉湯瀉心湯桃核承氣湯炙甘草湯(參照吐血下血條)

後篇

第一四章

胃煩癌

湯若嘔吐與胃出血同來。舌呈赤色而滑澤胃部膨滿感輕度之胃痛吞酸嘈噪強者用旋覆花代赭石湯屢屢

第十五章 胃癌

能奏偉效。

胃癌之原因今尙不明。而胃粘膜之刺戟如慢性胃加答兒胃潰瘍濫用酒精等實爲本病之誘因。

物初期不過焉不消化食物之殘片病勢進步則呈污穢之暗赤色甚至放不快之臭氣胃痛但痛之程度不及胃潰瘍之劇甚癌腫從幽門出來時胃部感痙攣性之蠕動殊覺不安嘔吐屢來吐出之 者訴食慾不振稍進食物胃中即感膨滞壓重之苦惱發噯氣吐出之瓦斯放腐敗性之臭氣或食後嘔氣時時 本病在癌腫之中的占半數尤在四十歲至七十歲間最易犯本病。 自覺的局所症候為癌腫之所在部其大之程度特異初期胃癌不過呈輕度之消化不良症狀即患

腫腸顯然增大其時大之動脈管破裂致起大出血倏忽致死。

食愁隨病勢之進步而日益減但有時反食慾亢進。

時見心窩部一體膨大胃之下界有弓狀現出於臍窩之上方或下方腫也當呼吸之時則上下動若胃之小彎上起癌腫則在吸息時季脇下顯然可見幽門癌則同時呈胃擴張其 他覺的局所症狀。初期中不呈特别之變狀病勢進步。在望診上能望見菲薄之腹壁有限局性之隆起此即癌 大便多祕結但在末期反起頑固之下痢。

舌現灰白色或褐黄色之苔常乾燥有時完全無舌苔。

病勢進行則全身營養障礙漸次增進患者衰弱之度逐日增加皮膚呈蒼白色而乾燥皮膚之彈力減殺皮膚 上生多數之小數裝皮下脂肪組織亦瘦削筋肉之營養亦大損害呈所謂癌腫性惡液質之狀。

降者有神效

地榆二味之煎劑此法在藥物之厚重中。卻不受容而愈且時時奏效。 便祕尿量減少屢屢吐出飲食物呼吸訴迫促幽門部訴壓痛觸之有腫瘤余先考主訴胃痛嘔吐屢屢與半夏 去後與旋覆花代赭石湯而一切自覺之症狀消失。一個月餘體重增加此時患者口渴強有胃內停水之著明。 歸芍藥散之合方於短期間完全治愈余亦會診斷南大曹博士之幽門癌始與茯苓澤瀉湯而胃擴張之症狀 恩師湯本求真翁嘗於「古醫道」雜誌上報告診斷南大曹博士之胃癌用小柴胡湯大建中湯當

問雖稍有差異然大體則同。 左項引用「內科祕錄」膈噎條之治法因當時之所謂膈噎與今日之胃癌或食道癌名稱雖異而實相 同。

予雖常欲推究古方奏神驗而終不可得故後世有人逢到膈噎難症往往鐘投古方堅守百中求一生之識者 枳園高階先生用利膈湯或梔子豉湯均有奇驗。于用半夏瀉心湯亦常收效。但亦有不能全治暫荷延其命者。 [本間兼軒之號] 此固焉不治之病藥與當然亦不奏效但如其原因爲癇及起於四十歲以前者百病之中 往往能救二三名古屋玄醫之利膈湯在傷寒論梶子或湯條中云胸中窒者以此爲本是主藥爲槐子也先師

名古屋玄野之利膈湯為半夏山梔子附子、甘草生姜、而枳園之利膈湯為茯苓、半夏橘皮甘草養朮乾姜吳柴 萸牡蠣生姜梔子。

、鐵病捷法〕 桃核承氣湯治喧膈(與膈噎同)積血有效。

錦囊祕錄〕 周揚俊三余每借用代赭旋覆揚(旋覆花代赭石陽)治反胃噎食(飲食後嘔吐之病)氣逆不

第十六章 胃擴張

金匱要略云朝食寒吐暮食朝吐宿穀不化者。名曰胃反胃反正與胃擴張相當又職胃反胃之義與胃反同。 【原因】 胃擴張者胃腔後天性擴大之症也常件以胃內容物之蓄積與酸醇其原因類别爲左之五種

- (一)幽門狹窄。
- (二)食物過大之充盈
- (三)胃壁之疾病。
- (四)由於神經作用之胃筋纖維之衰弱。
- (五)隣接器官與胃癒着之時

小水泡性剌芝叟兒。 膨滞。空診上既能見本病之存在而在打診上則發空氣枕狀之鼓音大彎達於臍下聽診上沿大彎能證明有 之水溶解之,將此咽下之後即用重炭酸那篇里烏麻一茶匙溶解於一盞之水中攝取之經過一二一秒時間部 本病檢病方法中最簡便而正確者爲用炭酸瓦斯膨脹胃之一法其法將酒石酸一茶匙以一盞盛

肉眼能目擊之。 甚至有達膀胱部者胃之左界達於左側前腋下線右界越右側副胸骨線而及於右方胃之小彎向下方沉下。 者之胃之境界,一般增大健康之人其大彎在腦上一模指至二模指之間,有胃擴張病者則大彎達臍部以下。 又患者當朝展空腹時起立欽二盃或三盃之水則打診上見有胃弛緩症其獨音界每發動於下方胃擴張患

均擴張而爲先性之巨大者則不能認爲胃擴張症。 胃之大變雖遷於臍下。而側部之胃界則無異於常時者此非胃擴張乃胃下垂症也又胃部之境界左右上下

戟性之臊臭此外患者往往訴酸性之噯氣及吃逆嘈雜胃之運動微緩舌無苔多帶赤色屢屢訴煩竭尿量城。 本病用指頭衝擊患者胃部時證明有著明之振水音嘔吐不頻頻但一次吐出之量帶多量之強酸性更帶刺

【療法】 茯苓澤瀉湯證最多其他如茯苓飲五苓散吳茱萸湯生姜瀉心湯等亦可用之

實驗例

大便多秘結

擴張因氣候之變或飲食之消長依然不能全愈每年初夏時候病勢增惡屢屢併發脚氣病。 (一)患者五十八歲男子。二十九歲時罹脘疸入病院爲生活者前後八年。失去數個趾指漸次病苦自後罹 主瞪腹满與呼吸迫促口渴甚。舌白苔大便祕尿量亦少吐一日一二回其量頗多每次近一面盆吐後腹滿去。

中倂發糖尿病之症也。 呼吸平靜胃內著明停水噯氣腹中當鳴耳鳴不絕低聲不聞脚力頗弱甚疲勞尿中證明有糖醫師云胃擴張 投與茯苓澤瀉湯患者不努力進藥,稍稍輕快藥即暫停緩一二日再投藥。在再二年近訴耳鳴尚有至其他症

狀。已大半消散矣。

備考

吐其有不納而微渴者用茯苓澤瀉湯五苓散小半夏加茯苓湯。 藥方先用生姜瀉心湯理中湯不效時用化食養脾湯香砂六君子湯加味平胃散若吐稀粥者可以上刻諸方 (本間東軒之說) 珍奇之物。消化較難。故宜專食稀粥等易消化之物品。多飲藥則起藥煩。故一帖之藥宜於一日中分二次服之 反胃之症重者第一用減穀法少造飲食則脾胃雖衰弱尚能消化也又腹中不慣之食物

所謂香砂六君子湯者。人多术甘草半夏橘皮(六君子)香附子藿香缩砂也化食養脾湯者、六君子中加砂仁 麥芽山查子也加味平胃散者北厚朴楠皮甘草神麵麥芽山查子也 第十六章 胃機張 第十七章 胃下垂及腸下垂症 0五

(時選讀我書繚錄) 苓桂甘棗湯治澼雞艠(胃擴張)栗年不愈心下痛、吐宿水者甚啟。

第十七章 胃下垂及腸下垂症

【原因】 胃之運動力薄弱者爲多後天性因分娩後之腹筋弛緩或腹內臟器起慢性之疾患而發本病單屬胃之下垂 有先天性有後天性先天性者生來虛弱有細長之胸廓(即上腹角之銳角之強者)或領血性同時

者甚稀往往同時伴以腹內其他臟器之沉降。

無一定之症候自覺的症狀中而最多者為便祕與神經性狀即頭重眩暈耳鳴心悸亢進不眠疲勞

【療法】 本病訴便祕者所謂陽實證之便祕非下劑之適應症却先用收斂藥如芍藥或止瀉有效之黄本以 倦怠等胃部有壓重澎滿之感食氣不振噯氣嘈凝等症此因榮養障礙之故。 爲配劑便通自住又胃阿爲尼症同時來者用所謂温藥自能便通本病之患者屢屢訴小便頻數苟大便變爲

整調則以上自覺的症狀自能漸次消散也。 本病常用之方劑為外柴胡湯、半夏瀉心湯、甘草瀉心湯、生姜瀉心湯、茯苓飲大建中湯等。胃阿篤尼症供發者。

第十八章 胃緊張力衰弱症(胃阿為尼症)

用胃阿篤尼症條所揭之方劑。

【原因】 來自先天性與續發於其他之胃疾患

自覺的症候。感胃部膨滿者最多食慾雖有。但稍稍攝取食量即有充滿之感此外感噯氣腹部無力。

頭重眩暈耳鳴他覺的症候證明胃部有振水音。

【療法】 本病於診斷上重要之手設為患者之脈搏凡阿篇尼之病狀顯着者其脈散弱輕者脈亦較良故在

切 脈 時已可預知胃內之有無停水矣阿篇尼症者胃內停水之症也

用苓桂朮甘湯茯苓澤瀉湯、吳茱萸湯茯苓飲大建中湯、真武湯、人参湯等。 本病在傷寒論爲痰飲用温藥以温通之與温藥以刺戟則胃之筋肉有緊張力胃內停水可以驅逐故從證宜

第十九章 胃酸過多症

或憂鬱等此外如慢性腸疾患膽汁分泌障礙生殖器障礙等反射的或過飲酒精喫煙過度多食香料等多易 (原因) 本症爲日常屢屢遭遇之疾患二十四歲至四十歲之壯年罹之尤以男子爲多誘因爲精神之過勞

起本病。

之多者口內上昇酸性液此外訴便祕口渴。空腹時攝取少量之食品則暫時緩和嘈雜與疼痛尤多起於攝取硬固之食品及野菜與失鹹味之強者殘渣空腹時攝取少量之食品則暫時緩和嘈雜與疼痛尤多起於攝取硬固之食品及野菜與失鹹味之強者殘渣 【症候】 本病通常發於徐徐自覺症爲胃部感不快壓重吞酸嘈雜大多訴疼痛疼痛起於食後二三小時或

生姜瀉心湯旋覆花代赭石湯柴胡加龍骨牡蠣湯小陷胸湯等從選用之

第二十章 腸加答兒

甲 急性陽加答兒

「症候」 本病之症狀視所犯之局所炎症之质狹而異

大成為鼓陽。故起陽鳴。此瓦斯之排洩。即為甚奧之放屁在放屁之先大多腹痛下痢時屢屢伴裏急後重糞便 管之運動旺盛腸內容物速速輸送於腸管內同時腸內容物因分解而發生之瓦斯蓄積於腸管內致腹部膨 大腸上起炎症則起下痢小腸上起炎症則不下痢又迴腸與結腸同時冒者曰迴結腸炎因迴結腸炎而致腸

後攜

第十八章

胃緊張力衰弱症

第十九章

胃酸過多症

一〇七

呈褐色黄色綠色或灰色帶極稀薄之水性其臭氣亦強糞便中混粘液或血液下痢一日十數回或數十回,

患者訴全身倦憊增口竭壓其腹部則覺疼痛尿量減少。

直腸炎則便意頻數裏急後重排便時訴疼痛與肛門之灼熱。

乙 慢性腸加答兒

【症候】慢性炎症最常現之部分爲迴腸及結腸

慢性迴結腸加答兒便通多不整屢屢起便祕及下痢便中混多量之粘液此外訴腹鳴鼓腸腹痛等與急性症

之情形同

慢性直腸加答兒與急性之情形同亦訴裏急腹重大便往往失糞性以粘液為主有時挾血液。本病之經過中,大多無熱但其營養顯然障礙筋肉瘦削形容枯槁又往往精神異常或訴眩暈心悸亢進等。

以衝病敵之虛一 【療法】 急性大腸加答兒之初期與萬根湯發汗後大多頓挫習慣性每年起一二回大腸加答兒西醫用腸 桂枝湯以愈腸加答兒淺見莫知其所以竟有認焉迷信的行爲者。其中可以深長思也。 能愈陽加答兒寶屬不可思議。」此近人之語也其實非不可思議也漢醫往往用側面攻擊或背面攻擊之術。 洗滌之三術,最短期間亦非一個月以上不能全治若與萬根湯以發汗,則數帖之藥即可氣振而全愈「出汗 皋而殲滅羣魔與西醫之專用正衝突毫無奇策者不同中神琴溪會用始一般風邪之藥之

股痛裏急後重強便中有膿血示狂煩之狀者用桃核承氣湯裏急後重肛門感灼熱者用白頭翁陽虛甚者與苓加半夏生姜湯若不裏急後重呈所謂水穀不分離之水瀉下痢者可用猪苓湯五苓散人鑫陽等。 迴結腸加答兒訴腹鳴鼓腸腹痛下痢者與甘草瀉心湯若腹痛強而下痢亦甚者用苓湯嘔之狀境加 者與黄

白頭翁加甘草阿膠湯。

病久體力虛衰肛門不收,大便流下者可用赤石脂禹餘糧場、桃花場之類。

用大柴胡湯、大承氣湯等。 脈沉微沉遲弱或呼虛而微惡寒不熱完穀下痢者與真武揚此外急性加答兒之際宿食殘留於體內者亦

参照下痢赤痢霍亂等條

第二十一章 盲腸炎

漢醫之腸羅與西醫之盲腸炎相對

起上者。各蟲樣突起炎又限局於盲腸及蟲樣突起之漿膜上者。各盲腸周圍炎。 【原因】 本病大多俄然而起右腸骨窩上形成劇痛與急性之腫瘍其炎症單在盲腸者名盲腸炎在蟲樣突

此炎症若傳播於鄰接腹膜則起盲腸周圍炎。 蟲樣突起炎者糞便堆積於蟲樣突起內而硬固形成所謂假性糞石,刺戟該部之壁則其上起炎症及壞死,但

會腸周圍炎最頻繁之原因爲蟲樣突起炎此外如子宮周圍炎喇叭管炎,卵巢炎等,亦爲此病之誘因**。 盲腸炎之原因主在大便祕結者。名滯糞性盲腸炎。**

藏多量之瓦斯於腸管內壓壓右腸骨窩上起強度之膨隆觸診上初期腹壁一體緊張而強抵抗甚但右腸骨 窩上無糧瘍之狀 症候】 **直腸突起炎及盲腸周圍炎者右腸骨窩起突發性疼痛其些時輕按之亦訴劇痛腹部大多膨滿包**

自覺的症候除右舉之外。訴嘔吐嗳氣嘈樂。食氣消失,增煩竭。舌被淡黄白之苔至往往放口臭大便多秘結初

一)廣汎性急性腹膜炎此為最危險之症腹壁一 梭篇 第二十章 腸加答兒 第二十一章 體訴疼痛膨大脈細數體温上昇頻發嘔吐。全身症狀漸次 盲腸炎

(一)含氣性腹 音部之消失及全身虛脫症狀 膜炎此症在蟲樣突起之穿孔上空氣與糞便均進入於腹腔內起強度之 腹部膨滞劇甚之

三)利尿困 難 亦一 併發症也此因盲腸周 圍炎性傳播於機轉之膀胱漿膜 而

之發生致膨滿而且緊張無熱候即或有之亦僅微。 性渗出物相異之濁音不帶鼓音。此腫瘍不達於身體之中央部及肝臟下緣腹部因糞便之潴留及多量 滯糞性質腸炎者在便祕之後俄然右骨窩發疼痛局部隆起如腫瘍狀壓之訴劇痛打診上呈與盲腸周 五)膿液穿漏,亦爲併發症之一,其穿孔起於種種之方向,如腸管穿孔、泌尿器穿孔、子宮穿孔或腹壁穿孔 四)肋膜炎焉本病之併發症者亦不少尤以右側肋膜炎焉多此大多焉漿液性。其滲出物之吸收頗迅 起。

已長腹部已軟弱無抵抗強犯營養局部之腫瘍上軟而不熱脈細數微數一言以蔽之病勢陷於虛證時洪數已化膿不得不下改余於此時與大黄牡丹皮湯屢收大效次為意苡附子與醬散用此湯時必時間 因此時忌下劑也 腫瘍其腫腸或自發痛或壓之痛腹壁一體緊張舌多白苔或黄苔乾燥。訴口竭脈邊緊或洪數金匱要略全此係西醫之說但余等對於盲腸炎症以大黄牡丹皮場為最多大黄牡丹皮湯之證為右腸骨窩上觸 滯糞性盲腸炎可投稿片馬非噴德扑之類以鎮靜蠕動此種病以外科的療法爲正道且絕對的 用之。

此外亦可從證選用大柴胡湯桃核承氣湯桂枝茯苓丸大承氣湯厚朴七物湯等。

醫對於輕症之盲腸炎不用手術而以冰囊貼於腹部往往有逾月不愈者余對 藥散屢收奇效此種之痛所謂弛緩症也大多因水毒停滯腸管故宜用温藥以温之「古醫道 一文揭載茲錄之如左。 於此種患者用大 建中

輕症之重腸炎荏苒不愈者投大建中湯而速治此漢醫所謂久寒(陳久之水毒)停滯於腸致盲腸部之附 近

食思全無大便祕結因乞余診治余與以大建中湯服藥約二日後之午前腹中大痛難堪即以電話請余余日 發疝痛也在患處貼冰囊以冷却之病勢惡化不治亦當然也。 病近於治矣。更囑連續服此藥後五日由其幼兒背負以來。乞再用藥診後更命連服三天而病遂愈矣。 戶塚町山口。從七十日前得直腸炎因係輕症。故不用手術僅施以服藥及局部之冷却法不料身體漸次衰弱。

後則下腹痛便祕腹部膨满等之症狀蜂起維用盡百方不能全治也凡有此症之人其所訴之症狀大抵相異 **盲腸炎即用開腹術在盲腸上亦無何等變化却如子宮附屬器之炎症此余等所屢屢聞之者也但若誤診之**

而在施用手術之後其所感之苦惱其狀一也

今之名醫多云盲腸爲有害無用之物係二十年三十年之經驗然則切除之可以又往往不能蘇其再生此點 甚望吾醫家真挈而研究之也。

實驗例

(一)麴町區下六番町郡司正一氏之母年五十八歲白近鄰之醫師斷定焉盲腸炎除手術之外無良策於是

求治於湯本先生白湯本先生病介紹於余

投與大黃牡丹皮湯次日即二十四日下痢八次尿量增加二十五日下痢三次腫瘍軟自發痛苦體溫最高三分觸於右陽骨窩上,有爭學大之腫瘍有自發痛對於壓則過敏大便自病後未有一回。食慾無亦不嘔吐 初診昭和八年六月二十三日在發病後之四日脈滑而有力舌上有淡黄白苔乾燥訴口渴體温三十八度五 服棄三日即能離狀云。 十七度五分二十六日下痢一次體温如尋常能離牀七月四日起步來院診斷之下腫瘍及壓痛全無此患者

(一)目黑區中摂町旭丘小林菜氏男年十八歲從道友權藤成章君之介紹於昭和八年六月二十九日招余 第二十一章 盲陽炎

是日天骑時訴腹痛 體温上昇達三十九度有口場煩燥之狀大便祕舌上有白苔而乾燥脈緊腹部一 鳢

抗感右腸骨窩特爲顯著

投與大黄牡丹皮湯從是夜至翌日瀉下四行翌日熱降自發痛去服藥至七月二日計三天理應稍稍靜養乃 此君不聽家人之勸告。盤桓於友朋之家而不歸至七月十四日再發腹痛倍於前日。注射喷篇擇二簡亦僅能 鎮痛體溫近四十度脈洪大而緊再投與大黄牡丹皮邊翌日瀉下體温亦降口竭煩燥減續服十日而圣治。 電報告故林氏急電余也因告知將各瓜子、桃仁牡丹皮、薏苡仁各别包之。看其如何情形則用如何關合之法 (三)與右同日横濱本木之林氏以至急電話乞余作盲腸炎之藥是日林氏在哪里之祖母因盲腸炎危篤去 而與之其後二週,林氏上京叩余門。謂僅一帖之藥十四日間不通之大便快通危篤已免近日已在遊居之中

甚感困難妻子到處乞方聞余名來乞余。 (四)嘗經淺田診療所施盲腸炎手術後手術孔經十年至今不癒右脚攀急起居不自由因之失業此日生居

余於大黄牡丹皮湯合芍藥甘草湯中兼用伯州散投與之一個月未滿已得舍杖步行但此患者因無錢購棄。 苦不堪言以後即轉居田舍不知其消息云。

第二十二章 腸叠積症

本病可分麻痺性與痙攣性但前者多於後者。

時至三十四小時大多件以嘔吐大便稀薄如粘液狀屢屢挾血液肛門因括筋麻痺而撒開不絕漏出粘液樣 血樣粪便又肛門牽引至內部致其周圍之皮膚滑澤。 本病之來起腹部劇甚之疼痛患者呻吟難堪起發作性疝痛性狀之疼痛昼積亦反覆邊二十四小

期。不甚疼痛。此腫瘍有時稍稍變其位置而增大其廣袤此爲本病之特徵有時一側之腸骨窩横於他側又通 臺積症之診斷爲臍部或右腸骨窩上發見緊張之腫瘍此腫瘍爲長圓形而呈蠟乾狀表面平滑疾病之初

腹壁能觸知腸不蠕動。

現恐怕之狀脈搏頻數且細 本病中緊要之其他症候為患者全身之症狀即四肢厥冷眼球陷沒癡肉落鼻尖聳前額蒙冷汗層間呈縱 發病後一三日腸管內豬留之瓦斯愈益顯著腹壁之緊張其度增劇故此特欲從腹壁觸知腫瘍甚屬困 小。 皴

本病能喚起如左之危險症狀。

出物中含膽汁終至放糞臭之糞狀物。 (一)吐糞症 此症最為類繁因便祕頑固放屁完全缺如致來嘔吐此嘔吐最初僅吐出胃內容物漸次於吐

(二)腹膜炎 此症從昼積部起波及於全腹膜故腹部膨滿疼痛劇甚

(三)腸穿孔。

(四)陷於壞死之腸脫落不能則止而起腸出血

(五)腸管狹窄及腸管閉塞因腸管脫落部上有瘢痕組織故腸管顯然狹窄或來閉塞也

而宜用温藥熱藥如附子乾姜類之配劑如前述之方。 舉而可得效本病起時便祕者千萬不可用下劑如大柴胡湯大承氣湯大黄牡丹皮湯大陷胸等切不可用。療法】 本病忽然現重篤之症狀非初期也宜從證選用附子粳米湯大建中湯大鳥頭煎烏頭湯赤丸之類。

無何種抵抗胃腸弛緩有多量之停水余初亦用不少藥方結局使長服大建中合當歸芍藥散十二年後妊娠,余於鄉里開業時會診一婦人初因子宮病施用開腹手術,其後現常習性之腸叠積症狀診察時腹部極軟弱, 生產兒極健旺云

後篇 第二十二章 局叠積症

第二十三章 陽寄生蟲病

超蟲 古書所載之坑鼻即今日之蛔蟲此蟲類蚯蚓生鮮時帶赤黄色或帶灰黄色

【症候】 本病無自的特有之症狀或僅爲局處的或爲反射的神經症狀近來有主張本病有中毒之樣者藍

經幾多試驗的結果證明眼炎皮膚刺戟症狀為蝈蟲之中毒也。

屬於局處的症狀爲腹痛腹鳴便通不整肛門部感瘙癢食慾缺乏嘔吐放不快之口臭等。 反射的症狀以神經性徵候為主如眩暈頭痛瞳孔散大痙攣麻痺舞蹈病癲癇聽神及視神之障礙等患者屢

屡煩鼻腔內之瘙癢要用指尖搔爬此外呈貧血症甚羸瘦眼球陷沒。

健康之腸壁。家超之撲傷者所見甚稀但一旦形成團塊,則往往閉塞腸管通常蛔蟲占居於小腸內倫一 度寬

入其他臟器可招危險今將其主要之症狀列學如左

(一)侵入輸膽道時則來變血性黃疸脂亦來肝臟膿瘍。 (一)形成膽石之一原因即膽石中心發見蛔蟲

三)往往侵入胃中起該部之壓迫及疼痛。

四)有時超過於胃及食道之上方入於四頭內占居於聲帶之上部致睡眠時來窒息

五)或超過喉頭進入氣管枝喚起肺臟膿瘍及肺臟壞疽

七)罹潰瘍性變化腸粘膜因自己之頭部壓迫促進穿孔。 六)有時進入鼻腔鼻淚管入內耳。穿通鼓膜出於耳外時時欲以手指除之

本病之診斷焉發見蟯蟲盛其卵蟲在粪便之中(卵蟲的發見比較的少)蟯蟲之外形類乾酪蛆其

量瞳孔散大癫痫、舞蹈病麻痺鼻腔煩癢等。又夜間從肛門而出。至翌朝發見於臥牀有時超過會陰部侵入腔 【症候】 局所的症候焉腹鳴腹痛便通不整肛門上感瘙癢食思缺損口臭惡心嘔吐等神經症狀爲頭痛眩

Ť

內及包皮下喚起白帶下龜頭炎等 十二指腸蟲 十二指腸蟲為圓柱狀。难蟲多呈白色長徑平均八、三粍。隔徑平均〇、四六粍雌蟲呈淡黄

【症候】 色或褐赤色或赤色比之雄蟲長而且大占居於空陽廻腸者居多。 本病之症候爲貧血及貧血由來之症候其症候因此寄生島吸吮血液而起此種貧血通例自感染

少進於貧血之度時,身體之諸機能降退患者略略動作。即容易疲勞吸呼困難,訴心悸亢進,又容易發行貧血 本病後五週至六週而起皮膚變蒼白色檢其血液赤血球之數比通常減去五分之一血色素量然且顯然減

達於極度時。患者不能起坐起牀之際即來眩暈耳鳴視野暗黑及失神。 心臟右側擴大所謂左心室之貧血性擴張聽診之時,有收縮期的貧血性雜音內頸靜脈之球部有高調之獨

皮膚屢屢現浮腫外皮及粘膜往往來出血。

下痢。利尿大多增加。禮温有時降至正常以下亦有時發熱患者訴腹部壓重影滿及疼痛。形似鼓脹 食思減退口渴增進有時來反理的食慾即非日常食物之物質如土塊壁土等亦所數事便通不正。 或秘結

知須俟見節片或全蟲體發見於糞便之中。始可知焉但蟲全體與糞便同排洩者頗稀須在熱性病之下痢及 條之種類甚多臨牀上所必需認識者為有鉤條蟲無鉤條蟲廣節裂頭條蟲本蟲寄生於腸 內。 人所不

惡心嘔吐善飢食慾全無羸瘦蒼白頭痛眩量等。 **驅蟲療法之際方能見之** 「症候」本病全無自覺之症狀但亦有便通不整腹痛腹鳴肠內廻旋之感覺唾液分泌過多口臭嗳氣嘈樂

後籍 第二十三章 肠寄生蟲病

者服务緊弦然反洪大者蛔蟲之所爲也條)金匱要略云蛔蟲之腹痛時其脈洪大通剱腹痛蓋時脈沉緊或變弦蛔蟲痛時則洪大後藤艮山云凡痛 蛔蟲可與鷓鴣菜腹痛甚者用大建中湯甘草粉蜜湯蛔厥者用鳥梅園(多照樂方解釋篇鳥梅**園**

蟯蟲亦用鷓鴣菜湯、又金匱要略載用雄黄薰方即用雄黄之末,將五筒二枚對合之燃火於雄黄燒之即以其 患者腹痛如不明其原因可行今日粪便之檢查法如發見蛔蟲卵時必係蛔蟲之痛。

燒者向肛門薰之之法也較之今日西醫之用浣腸法者手續輕而效果著。

十二指腸蟲用大建中湯烏梅圓大建中湯加榧子貧血呼吸迫促動悸眩暈耳鳴等者從證用苓桂朮甘揚真

武揚八味丸當歸芍藥散麥門冬湯炙甘草湯之類。 條蟲用大建中湯、大建中湯加椹子、吳茱萸湯之類或應用石榴根、凡欲違驅蟲之目的者須於空腹時頓服爲

[本間棄軒之說] 菜之上鷓鴣菜一下。諸證即脫然近年西洋舶來之搜猛希娜其藥性可強健脾胃對於下蚘蟲有奇效(下略) 烏梅園甘草粉蜜湯鷓鴣菜湯應用之目標不同鷓鴣菜有效之病其他未必有效反之烏梅園甘草粉蜜湯亦 然所謂理中安蚘湯者人参湯加烏梅花椒也。 蚘蟲之藥初用烏梅圓甘草粉蜜湯理中安蚘湯之類後世方劑雖多然其效莫能出鷓鴣

〔和田東郭〕 蚘蟲之症強熱不解者如白虎湯之石膏劑久久服之有效又附子劑之證應用附子而不效者 可用烏梅圓大便不通者與鷓鴣菜湯。

第二十四章 黄疸

一)膽道狹窄為最頻繁之原因。 一)膽道狹窄為最頻繁之原因。 東疸為肝臟及膽道疾患最頻繁之一症候其原因摘舉要項如左。

- 一一)肝臟內性門脈管分歧部血壓顯然低下,大多來門脈血塞之結果,肝細胞形成之膽汁。不順流於肝臟毛
- (三)横隔膜之右半運動被障礙時則横隔及肝臟之吸息的壓減退膽汁流出於腸管內之力微弱致膽、細管却逆流於門脈管致惹起黄疸。 積於肝臟內性道而起本病因之右側橫隔膜起肋膜炎間起黄疸
- 成黄疸此名膽汁分泌過多性黄疸(四)膽汁之分泌過量充盈於腫道膽汁排除於腸管不充分時則其膽汁之部分與血液均移行於淋巴(四)膽汁之分必過量充盈於腫道膽汁排除於腸管不充分時則其膽汁之部分與血液均移行於淋巴

由以上四原因所起之黄疸。名器械性黄疸即鬱血性黄疸,一名吸收性黄疸。

病的狀態亡失排洩之作用膽汁不達於膽道瀰漫於淋巴管及血管惹起本病。 (五)此外又有瀰漫性或停留性黄疸者其通常焉肝細胞從血色素形成膽汁膽遠亦因此排出之作用形成

此原因之病之最頻繁者爲膽道之閉塞此膽道閉塞之原因大體如次。

- 腸粘膜上形成粘液拴子殘留於輸膽管或輸膽管之粘膜與腸管粘膜均陷於炎症因腫脹而閉塞 1)因胃腸加答兒而起者曰加答兒性黄疸此因十二指腸粘膜之腫脹輸尿管之開口部狹窄或閉 膧 管。
- (2)異物閉塞膽這其最頻繁者爲膽石亦有因肝臟奇斯爲馬或蛔蟲寬入輸膽管而致閉塞者但 較少耳。
- 宮及卵巢腫大等又肛門部之淋巴腺上腫脹亦足致膽道之狹窄。 4)外部之壓亦爲本病之原因其最多者爲胃腸膵腎上之腫瘍遊走腎腹膜炎性滲出物肝臟動脈瘤、3)膽道之瘢痕性及癌腥性狹窄亦爲本症之原因瘢痕性之狹窄基因於膽道粘膜之損傷而起膽石。

症候 黄疸著明之症狀爲皮膚及結膜之變質此症狀因膽汁色素侵入血液。在肝臟內吸收於直接血液,

第二十四章 黄疸

但大多先入淋巴管後進入血液中

褐色時則名黑色黄疸皮膚菲薄且富於血管之部分是黄疸最早故最早現黄疸之部分焉顏面而尤以 黄疸者皮膚 變黃色也此因膽汁色素之量循環於血液中致皮膚呈淡黄色或銅褐色或黄灰色如呈黄 顧觀

粘膜黄疸最著明於眼球結膜。

黄疸尿呈褐色或暗褐色間呈綠褐色振盪之時,作色之泡妹。染於白紙白布亦呈黃色 大便多秘大如團塊放腐敗性之臭氣糞便之色因腸管內膽汁流出之減少或消失致帶黄白色或灰白色甚

者往往帶銀色或放光輝此層尤宜注意。

亦起心悸遏徐及徐脈此外食思亡失感覺苦味。訴不眠及精神奮昂等。舌有苔皮膚粘膜網膜出 皮膚瘙癢亦爲本病屢發之症往往極破皮層而不自知,其癢尤以夜間爲甚故往往睡眠不安。 M.

黄疸之治劑大多使用黄疸色之藥劑與利水之劑及味淡如水之藥物共用此種自然妙理殊可

而又甚有趣。

劑。以多運用大柴胡湯小柴胡湯四逆散柴胡加芒硝湯之類此中尤以大柴胡湯合茵蔯湯為余等使用之好方以多運用大柴胡湯小柴胡湯四逆散柴胡加芒硝湯之類此中尤以大柴胡湯合茵蔯湯為余等使用之好方 茵蔯蒿湯茵蔯五苓散枳實梔子大黄豉湯梔子桑皮湯大黄消石湯等黄疸治劑之定名也患黄疸者便多松。 大便多堅硬。已如前述故多用大黄之配劑本病尤以肝臟膽囊膽道等障礙者爲多故多呈胸肋苦備 之 /狀那

以上雖 為黄疸之治劑治黄疸亦可兼治皮膚瘙癢且雖非黄疸而訴皮膚癢癢者居用之亦可奏效

飲而死死於黄疸者大多必現水腫不現者甚稀但亦有羸瘦而死者。 極濃之黄色黎黑如煙薰皮膚枯燥而落黄屑,小便盆見不利。全身現浮腫腹脹滿如鼓脹飲食不能藥亦不能 內而向肋骨下行。不能稍容指頭此時食思愈無或嘔吐或吐黑水或目昏身體羸瘦脈微沉面目及身體均 灰白與平常之色迥異奧氣亦與平常之便不同病勢更進一步則右肋下硬腫如癥濟積聚之狀其根核 睃亦黄。唾液之色亦黄而苦擦破皮膚。則出黄水汗亦黄色。染衣不褪小便赤獨如皂莢汁。大便大多如黑· 勢步步進行,漸覺心中懊惱右肋下急脹按之痛苦不堪默默不欲飲食或日暮微發潮熱或全身瘙癢發疹目 白晴黄如梔子之色小便亦呈黄色如梔子黄蘗之煎汁從白睛小便發黄漸漸變焉胸部發黄而及於全身 寮軒之記) 初發微惡寒而不發熱但心下覺有痞鞕而不爽快飲食亦與平日無異在明窗之前 在肋

此證不論少壯老大俱難治愈尤爲稀有之病就予經歷僅有數人。 蓋本病因膽汁之遠路卒然焮腫壅閉致膽汁逆流故其證卒然在一二小時中凡白睛胸肋及小便等齊變 色心中懊惱肋下急脹煩熱身重譫語妄語恰如狂人口舌乾燥有煩渴引飲之狀脈浮緊焉極甚之劇急症狀 急冀(大塚日此始今日急性黄色肝萎縮歟即急黄疸)見於隋唐時代諸醫籍,其候迅速疑急疫其實非 皆不得回春之術(下略)

通使 又曰小便正黄大便正黑正是候也二一年前已有查看大便之必要實不得不感昔賢之精神也(中略)黄疸 重視大便之色按金匱中有「六便之色正黑。」又有「大便必黑」云云用消石攀石之方後病從大小便去 黄疸之病。夜間不能認出即畫間黑暗之室亦不能認出。須在明窗之下細細熱視方能瞭然疫之發黃先醫 **多從永臥** 便呈黑色者膽汁腐敗之所致也大便灰色者放異樣之臭氣者膽汁注入之所致也故苟能將通路漸漸 隆汁 狀轉或病室幽暗而來,余初甚疑其後實驗之下,果然肋下有塊痞者肝膽閉塞之所致也吐黑水 回復本路。 則小便之色自白而大便可復黃色矣今之診黃膽者大多重視小便之色以爲心得而

饭篇 第二十四章 黄疸

黑水者。茯苓飲加茵蔯爲宜亦可用加減胃苓湯分消湯,回春茵蔯散等。食黄發熱而有疫之樣者。麻黄五味湯 巴歷傳八世。得奇驗者多用諸藥而不效驗,小便愈不通利。心腹脹滿全身浮腫不思飲食或乾嘔或飲食後吐 之類。吐下二方交下。香無微效而塊癖愈大面目變爲煙藥色之黑疸者正傳之當歸白朮散有神驗此方余家 軍之藥力不及時可與大黃消石湯若用下劑而猶不動者用吐方爲宜視其證之緩急選用瓜蒂吐酒石吐根 者用大柴胡湯茵荫蒿湯黄疸之治藥中以將軍劑(大黄劑之意)爲要藥用攻下之勢使閉塞自行 初發小 便其泡沫染紙則黄者可服大黄黄芩黄連梔子黄蘗等則小便雖黄而泡沫則呈白色(中略 便不利而發黃者茵陳五苓散焉宜心下有痞鞕者與小柴胡湯加茵陳助下急脹或鞕滿作 湖 通若將

柱枝加黄耆湯 仁則療急黄之方(療急黄之方爲麻黄 黄家以通大小便為大法脈浮時先發汗。但此方以陽浮陰弱之症為宜如俘緊洪數之類則 有八味。治瘀熱在裏發黄之方喻氏將此改竄爲瘀熱在表之方。 萬根 石膏 生姜 茵蔯.

唯三味。 (用麻 發黄之病。古來以茵蔯爲專藥但專用茵蔯一味往往不癒凡欲治疸以先去裏瘀熱爲本其次利 連翹 赤小豆)殊焉

合理。

連翹赤小豆湯

麻黄

連翹赤小豆湯本

小便又其次治黄则大熱解而黄退梔子利小便茵蔯治黄三味相次效用庶可全共

茵蔯五苓散 古訓黃家宜利其小便此方平淡為近世醫家通用之方。但五苓散非小便不利者無效茵蔯蒿

肠大黄消石肠亦小便不利症之治藥也但此二方以腹满焉主小便不利爲客。

梔子蘗皮湯 蒸蒸之發熱非翕霸之發熱者事以此藥爲解熱之劑

梔子大黄湯 此條治酒宜但亦不必限於酒疸凡諸疸心中懊惱或熱痛之症者皆可用之

大黄消石湯 此爲襄實之症凡腹滿大而堅小便不利便色帶赤裏熱甚明之重症用之。

小柴胡湯

大柴胡湯 黄疸之腹痛而嘔者輕則用小柴胡湯重則用大柴胡湯黄家不嘔痛胸肋妨脹者用此湯甚宜屢

試屢效。

黄疸或小便自利腹中急痛等不拘男女用小建中肠均宜

茵蔯四逆湯 (大塚日此方非古方茵蔯 附子 乾姜 炙甘草也)

發黄之治法。盡詳於傷寒金匱唯陰黄一症,仲景之方論亡佚千古以來唯王好古有茵蔯四逆之論以補仲

之關、由盡其微妙,但予尙以爲此症實甘草乾姜附子足矣

四兩一劑而愈外臺中引肘後云黃疸者一身面目悉黃如橘柚得熱以外冷迫之熱因留於胃中而生黄衣療 猪膏髮煎 猪膏於黃焉不可缺之要品醫宗金鑑云。余友駱天游病黄腹大如鼓百藥妄效用猪膏四兩髮灰

治之方用猪脂一升一味煎成温熱時盡服之一日三次爆尿當下。

第二十五章

加答見性膽管炎及膽囊炎

深質疸方(生小麥苗擣絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四日便愈) 生小麥苗者小麥之蘖芽也水煎用之

亦可

水莎用醋糊為丸)順氣和中湯(茯苓飲之加減方)人參賽榮湯理中加茯苓湯亦可選用。 此外有從石蓄根莽草二味之方絳礬丸(絳礬 、外臺秘要方) 集驗之大黃散(同瀉心湯)療黃疸之身體面目之皆黃者有效 厚朴 橘皮 三稜 装术 黄連 苦辛 朮 甘草

第二十五章 加答兒性膽管炎及膽囊炎

【原因】 膽道加答兒為甚頻繁之疾患其原因可分類如次.

病是也。 (二)急性或慢性傳染病之後有時亦發本病如纖維素性肺炎腸窒扶斯丹毒咽頭窒扶的里黴毒之際發本 (一)胃及十二指腸加答兒為最頻繁之原因因該部之炎症存在於輸贈及其經部波及於膽管故也

(三)獨立之傳染

四)中毒亦爲本病之一原因尤以燐中毒爲主要

(五)膽道之鬱血亦一原因尤以慢性心臟疾患及呼吸器諸病即所謂鬱血性加答兒者爲多。 (六)月經與本病之受生亦有關係即婦人在月經來時或月經之前膽道上來加答見性變化是也

(七)膽石之形成亦能銹起膽道之加答兒

(八)肝臟疾患亦爲本病之一原因

【症候】 本病之症候由於膽汁之鬱積而來者。日吸收性黃疸由於膽道粘膜之腫脹及粘膜塞子而來者,日

加答兒性黃疸

於斯上所必要者為黄疸之原因。旣往症及肝臟之診查亦屬必要大多踵食與不攝生惡心嘔吐便祕或下痢

前驅 症呈胃十二指腸加答兒之症狀

加答兒性黄疸之持續及過經因原因 疾患併發者雖不至死然亦不能 原發傳染性膽道加答兒其全身之症狀顯著肝臟及脾臟漸著增大往往來膽血症而至於死 而異如爲胃十二指腸性黄疸則一二週間即可治愈倫與不治之肝臟

茵蔯蒿湯栀子豉湯類大柴胡湯等均可選用。詳細情形多照黃疸條。

沿线。

第二十六章 膽石症

【原因】 不明女子爲多四十歲以上之女子醒者尤多。

疝不起。倘膽管從肝臟內至陽漸次增其口徑則膽汁之鬱積亦不來。 強通過於膽管之時此際膽石嵌頓於膽管致起膽汁之鬱積及疼痛但膽石從肝內膽管轉移於膽時則膽石 【症候】 本病 有時全無疾苦此之謂潛在性膽石症但大多誘起膽石疝膽石疝之起起於膽石從膽囊而出。

前額被冷汗有時甚至神識亡失全身筋肉起間代性之痙攣又反射作用上往往伴戰慄或誘起嘔吐 側肩胛部及右腕等其他之體部疼痛之發作性度增加則患者叫喊不絕或呻吟不已顏貌類促呈恐怕之狀 膽石症之主徵爲疼痛有時祇限局於膽囊部即右直腹筋外錄之右季肋下接觸之部位大多放散於心窩右

黄疸爲本病緊要之一症候發病後平均經過三日始現

膽石疝長短之持續不一短者一二小時長則亘及數週期間長者往往訴疼痛倫時時激增。 余對於此病常用柴胡湯加石膏而奏效有時於大柴胡湯或大柴胡加茵蔯 山梔子中兼用白虎湯 則 來 衰脫

一般例

第二十六章 腦石症

得學位者也平石博士同時又兼營優生病院適優生病院中來一膽石症之男子平石博士本以 胡湯合大黄牡丹皮湯加石膏送至病院服藥後二日發作大輕減服藥四日痛苦全去。倫篇擎寫真上膽石之 大比入院時减去其半云。 伎倆不料施行無效每日發疝痛狀之疼痛漢法無相當之藥一日院長偶談及此事湯本先生因作大柴 往年余隨湯本先生自晚至夜候診於日本橘區濱町之更生醫院所長平石貞市博士以蛔蟲之研究 利 法法

右直腹筋痙攣膽囊部住有抵抗鈍重之感與以大柴胡湯服藥二次發作不來已全治矣病院亦診斷爲膽石疝發作時每反覆施行利翁亦不輕快身體漸次衰弱進院乞治於余初診在腹診上顯然年五月起強度之發作。無鎮靜之模樣因入日比谷胃腸病院院中斷爲膽石疝治療不效轉入芝之鈴木胃腸 熱收疼痛去更於大柴胡陽中兼用白虎加人參湯發作不再來服藥一個月即能從事家事與平生無異。 著效但因發作猝然故對於漢法醫之不甚信仰者。往往中止服藥轉乞西醫甚至惡馬漢醫者此不僅膽石疝 (一)淀橘三丁目之松本氏近十數年來心窩部感發作性之劇痛某醫師謂爲胃痙攣其醫師謂爲膽 四十度更乞余往診診得膽囊部上有拇指大之膨隆甚 有黄苔而不乾燥右胸下有抵抗壓痛。余告以此膽石疝痛也與四逆散一帖服後發作襲氣不堪劇痛發熱毒 劇痛醫云胃痙攣反覆注射。注射後惡心嘔吐強身體頓覺衰弱脈沉緊稍似黄疸大便多祕三四日一行舌上 (三)此當揭載於「古醫道」雜誌中板橘區志村町板橘氏之母年六十五個月之前不能離牀時時心下 氣然凡慢性疼痛性之疾患一旦增痛往往見之 腎結石等中大抵現石膏之證先輩已言之矣余對於膽石疝痛用大柴胡湯中兼白虎人參湯 疼痛舌苔白而乾燥煩渴引飲與白虎加人多湯翌日 石疝本

第二十七章 結核性腹膜炎

疾患者其中漿液膜之結核性炎症之一分症來者甚多亦多有與結核性肋膜炎心囊炎及結核性肋膜炎併 結核性腹膜炎焉慢性腹膜炎中最頻繁之疾患常有續發的症狀此外亦有繼發於職器之結核性

以喇叭管卵巢及其他子宫附屬物之結核為本病之起點 此外與腸結核或腹部淋巴腺結核屢有關係。亦有現肺癆或全身粟粒結核之倂發症者婦人祕尿生殖器尤

時發熱甚不定或全不發熱或昇降不正常常至極低之度。 患者大多徐徐增加腹圍其時全無痛性或感僅微之刺摘腹部膨滿愈甚胸內狹迫及呼吸困難愈愈增 「症候」 本病往往形成滲出物其液大多為漿液性血性或鈍膜性敗膜性含脂性者甚稀。 加.

體温上昇頗多不定有時最高僅三十七度三四分昇昂者亦不過三十八度或三十八度五分患者往往發升 濁音。但若倒臥轉位時,其上側腹壁則變爲高調性之鼓音,尤其接觸於腹壁諸部發明其知覺過敏。診其腹部,純觸知腹腔內滲出物之波動。患者於仰臥時可得之打診上前腹壁證明有高調之鼓音側腹

或盜杆貧血羸瘦逐日增進

有時前腹部之臍附近,其面凹凸且能觸知硬固之索狀物此際該部能觸知而且能聽得腹膜炎性摩擦音

本症經過緩慢有時遷延至一年以上

本病之特徵在腹圍之增大即腹滿之顯現是也腹滿亦有實證與虛證但在實證中應用大小承

湯或大陷胸湯者甚 豨.

本病屢屢併發肋膜炎在初期腹滿之程度有輕度之壓痛與有抵抗之時期選用四逆散小柴胡揚合枳實芍 小柴胡湯合小陷胸湯大柴胡湯等從證用之。

腹痛已甚胸內狹迫及呼吸困難時除上舉諸揚外可從證選用梔子厚朴湯梔子厚朴合权朮湯梔子厚朴湯

合小半夏加 厚朴七物湯四逆散合梔子厚朴湯厚朴生姜半夏甘草人姜湯等如以上諸方無效又體

索狀 以上對於滏出性成形性者從證選用之體力已衰脫而贏瘦貧血盜行。在廣之附近能觸知有凹凸而硬固之 力未衰脫者可投與大黄牡丹皮湯 物者運用大黄蜜蟲丸八味丸之類。

實驗例

核性病對於下劑並不禁忌所困難者陰陽虛實難於確定所用方劑難於確合耳,伸長與股關節之少微畸形耳其中患者每日下痢三回乃至五回而在一年半中不少衰弱却見強壯所以結 伴流注膜瘍之結核性腹膜炎症治療半途中大腿之後面與臍部來瘻孔而排膿且起右股之股關節炎一時 甚難断定然病名可以不問而知其爲大黄牡丹皮湯證已屬無疑余旣確定治方即與投藥其後經過中患者 前年余診一少女訴腹滯與腹痛右側廻盲部附近有甚壓痛之證明究爲盲腸周圍乎抑爲結核性腹膜炎乎。 陷於步行困難余始終一 **黄亘一年半中常用大黄牡丹皮汤兼用伯州散連服之下終於治愈僅殘餘右足之**

第二十八章 腸結核

【原因】 於右腸骨窩者最多每在食後經過之時間其痛與來壓於該部則疼痛增劇。【症候】 本病病機雖已蔓延亦不現何等之疾苦者曰潛在性腸結核但有時亦起劇甚之腸痛此種腸痛現 便通展展不整或來頑固之便秘大多因制止而頻發下痢初期之疾病大便與其他單純之腸加答兒無異 本病多數為食饵性結核而續發於肺結核者亦甚多原發性起於飲食牛畜之乳肉與其調製物

断且其下痢對於止瀉法極頑固而右膈骨窩及臍窩之腹壁無力失其緊張以此情形推斷爲本病耳但病勢

焉不消化便與粘液耳。此時期欲診定其爲本病勢頗不易祇有從其他職器上體明有結核性變化之存在爲

進化,則大便中促血液更進化則大便呈汁粉之性狀其下痢往往頻發於近晚故名雞鳴下痢,

有時結核組織崩壞血管破裂若穿通腸壁俄然起腸出血或腸穿孔倫此崩壞之組織歸接於腸漿膜時則或

起廣汎性或限局性之腹膜炎

部瘦削腹部顯然鼓脹膨滿有時陽間膜腺累累腫大外部能觸知之肝臟大多腫大便遠不整 小兒之原發性腸結核往往呈特育之徵候者。各腸間膜療其主徵爲全身羸瘦貧血頑固之消耗熱四肢及胸

(深法) 腸結核患者之腹部一帶虛軟尤其在臍之附近以拳抵之常覺腹底下沉如掛餅之軟毫無抵抗且

氣味惡而乾因數脹或腹滿所以抵抗極弱也

腹診旣如上述則下痢脈細數者虛證也除虛證甚少陽虛證之病亦甚難治。

又陽結核之患者大部分績發肺結核此時治療上更加困難

從腹證上見腸結核者最多投與大建中湯人參湯之類但此等方劑為除虛證之治劑輕輕投之反有危險余

依病證改處分量屢屢運用小柴胡湯

陽結核之初期腹部軟弱左右之直腹筋強之變急迫於心下左右腹筋之空隙虛軟而上浮與前述情形迥然 不同本年二月余會診得此種病之婦人。(右肺下葉變潤呼吸迫促全身有輕度之浮腫下痢一日數行) 、小柴胡湯合真武湯而大見效又父執長野氏以麻黄一味煎汁治愈腸結核此亦足資考慮之資料也

第二十九章 腎臟炎

甲 急性汎發性腎臟炎

【原因】 (一) 傳染性原因最頻繁者見於諸般之傳染病之際。

一一)寒冷性原因所發之寒冷性(洛伊馬基斯)名急性腎臓炎

(三)外傷性原因而發者名外傷性急性腎臟炎

四)由於傳播性原因而發者名傳播性腎臟炎此種腎臟炎亦屬於傳染性腎臟炎起於痳疾膀胱炎腎臟局

五)中毒性原因來自中毒性急性腎臟炎此因服用某藥劑或某毒物或由吸下或由塗擦皮膚而

慢性皮疹及皮质遭火傷之後而來之腎臟炎亦爲中毒性。

羹汁狀。屢屢帶赤褐色或黑褐色但頻頻現血液尿,此際宜注意蛋白尿之現存及尿埑瘡中有無腎臟圖 、症候】 本病從諸多之腎臟疾患如尿之性狀而能下其診斷即尿帶血性。生血樣延濟有時呈淡黃色之肉

形細胞細尿管上皮。

尿之理學的性狀亦屬必要尿量減至千五百竓以下,其色濃厚,比重增大 皮膚浮腫為本病患者屢見之症候初發者見於顏面上或僅限局於該部門 眼瞼腫脹眼瞼裂顯然狹小但亦有

全身皮膚發強度之浮腫者漿膜腔亦屢屢浮腫見胸水及腹水者亦不少。 患者大多呈強度之蒼白色檢其血液。在發病後短時日中赤血球及白色素已滅少。

大動脈系之血壓變化亦現急速其度增大舒張期大動脈音旺盛屢屢帶鼓音橈骨動脈緊張此因血中存留

之新陳代謝物質刺戟心筋而發此外爲左心室肥大動脈血壓亢進,

眠不安食氣缺乏口渴增進又排尿困難尤其是屢屢尿意頻數而排尿時則來疼痛。 體温不變大多昇騰間有昇至攝氏三十九度或三十九度以上患者屢屢訴筋肉及關節上之牽引性疼痛睡

本病之持續有長短種種之不同傳染病(例如見於纖維素性肺炎之際)急性腎炎在一二日間即消 不少但此際宜注意者急性腎炎暫時治愈而其原因的疾苦依然留存或增惡此種情形往往持續四不少但此際宜注意者急性腎炎暫時治愈而其原因的疾苦依然留存或增惡此種情形。往往持續四 散者亦 逻

之久而亦有荏苒亘八個月以上者。

て 慢性實質性腎臟炎

要如爲刺星亞肺療徽華慢性化膿症鉛中毒酒精濫用等是本病大人糧之者爲多。 【原因】 本病之原因不知大多焉獨立的疾患間有起於急性腎臟炎者傳染性及中毒性原因爲本病之主

達五%或五%以上間於經過中排泄正常之尿量此外尿中有多量之埑渣以鏡檢之有腎圓柱圓形細胞細 尿管上皮細胞尤其緊要者發見腎臟圓柱狀中有多數之脂化之細胞顆粒細胞及脂肪 、症候】 尿之變狀。最為主要即尿之量減呈暗色或帶黄赤色其比重頗大達一〇二〇以上蛋白之量亦多。 小海。

本病大多徐徐而起以顏面蒼白及皮膚浮腫遂爲疾病之端緒體温之昇騰無供發症者不亮此外來動脈血 血中之赤血球血色素減少患者呈蒼白色皮膚腫脹漿膜腔中亦屢屢充盈滲漏液。

歷之增進但急性腎臟炎及萎縮腎則比較的稱患者大多食思亡失便通不整。 本病之經過大多緩慢。有時遷延數年之久其間如來急性增惡則血液中富尿恰如呈急性腎臟炎樣之症。

本病間有發行於續發性腎臟萎縮者

丙 慢性間質性腎臟炎

此而嫁故本病名腎臟萎縮但腎臟萎縮有原發症與壞發症之區別原發症中更有壯年性與老年性之區 腎臟萎縮 本病因慢性之經過間生質性結締織炎症之增殖此增殖使結締織暫時減少腎臟之廣袤常以

【原因】 本病之原因有傳染性中毒性及退行性。

鉛毒萎縮腎者鉛之中毒也脈管硬化性萎縮腎者退行機轉之結果也大多見於年高者續發性萎縮腎者起 屬於傳染性者現於馬剌里亞及徽毒之傳染病之後間亦有因膀胱炎及继疾而成本症者。

於慢性腎臟炎也

寒濕潤飲用酒精可誘發本病。

第二十九章 腎臟炎

之症候如心悸亢進恆久性頭痛視力减退反覆鼻血聲音嘶嗄嘔吐頻繁頑固之濕疹皮膚瘙癢等此外如急 於隱然皮膚不現浮腫故大多須經檢尿手續始能知本病之實在但本病之存在亦有可疑

癇痙攣發作。及 俄然發生胸出血等亦本病實在之表示也

屬放置之表面則生泡妹尿中有諸多之異物如蛋白糖分膽汁色素多含有之尿之比重碱至一〇一五以下 有時竟至一〇〇二,其反應為弱酸性。並渣甚多或竟缺如以鏡檢之有廣狹種種之物。或如玻璃或有少數之 尿之量增加一 日達三立至五立患者在夜間睡眠中。屢屢頻催尿意,其色呈淡黄屢屢交綠色又覺輕度之溷

顆粒狀與圓柱狀蛋白量甚少經數日或數週間完全不見 因上述之狀態故往往有誤診爲單純性尿崩症者因尿崩症亦屬尿量增加比重減少也但蛋白之現出心臟 及脈搏之變化網膜變化等則缺如此即與本病區别之點也

礩性屢屢伴左心室之擴張心尖搏動在左側乳腺或其外方從第五肋間腔現於下方此外則漸次來左心室 血行器之變狀亦爲本病必要之症候左心室肥大常能證明之心尖搏動如扛舉性抵抗顯著第二大動 音帶

之擴張及肥大。

網膜變化在本病爲全數五分之一。

剝脫之傾向屢屢生頑固之濕疹食思大多缺乏口竭亢進口腔內訴乾燥感覺舌上訴粘稠感覺。 患者之顏貌呈蒼白色急速陷於羸瘦稍稍焉輕度之運動即容易感疲勞訴心悸亢進皮膚漸著乾燥上

本病患者之脈搏顯然硬固觸之如有針條之感。

湯以發汗是一頓挫的療法故得速效

口渴煩燥,排尿困難等用大青龍湯以發行,其時胸水腹水同時消失矣。此種症狀多現於體質好之人大青龍 急性汎發性腎臟炎之初期。現浮腫脈浮緊頭痛發熱(有時不必發熱)筋或關節訴牽引性之疼痛。

之脈浮 之口渴與大青龍湯之口渴一見即能區别五苓散鹽之吐大多吞入後即吐而脈象則兩者雖皆浮但五苓散 幼年之急性汎發性腎臟炎屢屢現五苓散之證即浮腫尿利減少口渴及吐與頭痛此五苓散之證也五苓散 而散不緊也(其詳請參閱藥方解旣編)

脈不緊迫 皮膚病內攻性腎臟炎屢屢應用麻黄連軺赤小豆湯此方比諸大青龍湯之症狀較緩和煩燥口竭之程度輕。

除以上方劑之外可從證選用一症候與治方」第九章浮腫條下所揭載之方劑。

從診與小青龍湯服後喘息肺氣腫先愈連服一個月後蛋白全消漢方中消失蛋白之藥無一定之藥從雖處者與苓桂朮甘湯或半夏厚朴湯之合方余會診一男子十數年來苦患氣管枝喘息肺氣腫併發慢性腎臟炎恐時有嘔氣者證明胃內有停水也有胃阿篤尼之狀者與茯苓飲其時加頭重不眠心悸眩量等之神經症狀 多大之不安要知從證擬方正如小刀之細工毫無末梢的杞憂問題西醫不知病之陰陽虛實雜投藥劑斯亦 方蛋白亦消失此際患者從西醫家言不禁攝取一切之刺戟性飲食物服用乾姜細辛等刺戟性温性藥物感 消失蛋白特於眩暈甚者與苓桂朮甘湯合方婦人訴腰脚冷痛者與苓桂姜朮甘湯合方。訴胃部膨滿食氣不 慢性實質性腎臟炎訴頭痛頭重耳鳴心悸眩暈頭色蒼白尿利減少手足厥冷者與當歸芍藥散予用 、此方會

有浮腫者除用以上諸方外可從證多照「症候與治方」第九章諸方選用之

萎縮腎者大多選用動脈硬化症之治方。

蹇等除以上之方外選用白虎汤類真武湯類柅子豉湯類 心悸亢進恆久性頭痛視力減退反覆衂血者與桂枝茯苓丸桃核承氣湯兼用瀉心湯頑固之濕疹訴皮膚蹇

第三十章 腎臟結石

亦能誘發本病 金結石其實例也亦有來於遺傳性者此外如凝血寄生蟲卵亦招賢石之形成而賢部之外傷致賢盂出血時。 易促起本病而全身新陳代謝機之疾患亦與本病有一定之關係痛風患者多罹腎石蓋斯金患者間 【原因】 程本病者。男子多於女子。此在日常之營養品中與結石之形成不無影響,而肉類及酒類之濫用尤 患基斯

輸尿道中諧般之疾患亦能促進腎石之形成尤以尿鬱積及尿分解而來者爲多但腎石形成之機轉 則不 期

腎臟部之疼痛為屢屢見之症候於廣汎性中放散久之間亦誤認為腰痛或肋間神 **垽渣,其先不得不疑焉腎臟結石。非從細檢其垽渣之性狀及結石之化學的成分不能知之** 或腎盂腎臟炎之症候在施用手術之際若向外方穿孔始能發見其結石 腎石或 腎砂不呈何種之疾苦在剖檢之際偶然發現者此名曆在性腎臟結石此外大多呈腎盂 1而在此際 經痛。 尿中發見多量之結晶

現慢性膀胱加答兒之症候此外尚有少數之患者罹尿血尿中見多量之結晶狀質渣。 本病患者現一種固有之變位即上體向前方屈曲而步行層胛向患側偏倚脊柱突窿於健側避脊柱之迴旋 及屈曲運動 而營強直性之步行。有時經數遇至數月時間及長久之惡心惱嘔吐後始現本病之症候又本病

狀不一。疼痛時患者之顏貌呈恐怖狀態皮膚因反射的血管痙攣而呈着白色且厥冷,伴以粘稠之冷开腦動 際患者俄然訴腎臟部劇莊之疼痛此疼痛往往放散於遠隔之部位尤以膀胱部處頭及大腿爲多疼痛之 脈上發痙攣時則患者亡失神識至於起間代性筋肉痙攣此外往往伴戰慄發熱及嘔吐。 最頻繁之症候爲腎石疝此症候當腎石去腎盂通輸尿管而至於膀胱時腎石嵌頓於輸尿管內 而

時則又喚起膀胱及尿道劇甚之疼痛焉。 腎盂或下至膀胱時則疝痛之發作消散利尿再呈多量血尿亦漸次消失矣但結石若從膀胱而出通於尿道 疝 痛發作時對於尿之變狀殊堪注意其時尿量減少或來無尿之症此無尿之症因偏倒之輸尿管閉塞 **肾藏受反射性** 量之血尿為時持續甚久此血尿之原因由於嵌頓之結石損傷腎臟粘膜而然結石若離輸尿管 !刺戟致妨礙其作用之故此無尿症亘數日之長時間乃起尿毒症又在疝痛發作之際往往 或

之副作用。而窦效之時間則甚寫遠但若兼用本方。往往葵效神速予當反覆注射莫爾希納阿篇洛批等量 時則反覆來腎石疝之發作。腎石疝之發作。通常者不至於死性重篤之危險症狀。結石嵌頓於輸尿管不 確係鎮痛之明證也 多時極近循不能鎮痛與此方一帖立見功效,其見效之時間不過服後未備三十分鐘耳此非偶然就腹瞪上 先與芍藥甘草湯。在此時機西醫往往使用莫爾希納噴篙撲阿篙洛批等注射之雖覺不快然並 塞時則尿鬱 腎石疝發作之持續是短不同或止數時間或經數日若腎盂中存多數之結石或結石從輸尿管還歸於 方亦不赴下方致成翰尿管之炎症壞疽及穿孔因而發穿孔性腹膜炎者死之症候也腎石將輸尿管完全閉 疝痛發作之際腹診上腹筋如板之硬固身體前傾營深呼吸則增痛者此所謂呼吸在淺表也此 積於腎盂內致成急性腎盂水腫此際腎臟部上得顯然觸知腎臟腫塊但亦有不能觸知 無何 種危 赴上 肾盂

欲圖利尿而排除石者。以猪苓湯焉宜若尿利減少,排尿困難,且血尿者服用此方亦能快癒又發作時 便祕者此際從證選用調胃承氣緣桃核承氣湯、大小承氣湯、大黄牡丹皮湯、大柴胡湯之類則排便而 希望此則特堪注目者也 加疼痛如拭去矣本病之患者大多現桃核承氣湯、大黄牡丹皮湯之證因此方之特長有根治 屢 時尿 石之

往數年。診得一止發無時之腎石疝痛症發作時。腹部亦軟弱如錦之男子,其年五十七歲與八味丸而 第三十章 脊驗結石

著效於此可知腎石疝發作時其奏效之藥不必限於芍藥甘草湯猪苓散桃核承氣湯之類如患者當發作之 脈軟弱。 (通常在發作之時脈沉弦或緊) 腹筋不緊張ᇤ可與通例稍異也

第三十一章 腎盂炎

廠炎 【原因】 本病之原因。分細菌中毒二種就中以細菌者為頻繁本病往往有與腎臟炎同時發者此名腎盂腎

分裂菌從膀胱而出至輸尿管遂達腎盂者甚多故腎盂炎中屢有膀胱及輸尿管之炎症。本病之發病素除普通之發炎菌之外。並普通大腸菌其他肺炎重球菌結核桿菌及窒扶斯菌亦能喚起本病)

【症候】 狀。 固 有之尿候。由腎臟膀胱或尿道之尿候變狀所蔽。對於獨立性腎盂炎尤其對於局部性腎臟變化及尿之變 本病之診斷往往頗覺困難只能下推測的診斷但本病中如兼腎臟膀胱或尿道之疾患時則本病

局部性腎臟變化之中頻繁者爲腎臟部之緊張壓迫及疼痛如壓迫該部則疼痛劇增。

化膜性腎盂炎者尿之埑渣中含多核性膜球腎臟不冒時處過之尿不含蛋白質或僅有痕跡 渣此上皮細胞來自膀胱之娛層若屋瓦狀之排列。同時缺屬平上皮細胞腎盂炎之所 尿之變狀因炎症之種類而異最輕者尿中含有多量之粘液用鏡檢之發見棍棒狀及尾狀之上皮細胞之延 致也。

膀胱炎及尿道炎之際以上之尿變狀亦來胃盂炎中特有者爲局部的腎臟痛

臟炎同來由尿毒症尿腐敗症近圍穿孔或澱粉樣變性而死者甚多。 吐排泄透明之尿,其量甚微腎盂炎之原因。有急性亞急性若慢性之經過慢性症多帶化膿性常與化膜 出血性腎盂炎起血尿有圓柱狀之凝血又腎盂炎屢屢倂發腎臟水腫此際俄然劇甚之腎臟痛惡寒發熱嘔

【療法】 若同時倂發加答兒者兼用猪苓湯。 乾燥多煩渴引飲者用小柴胡揚加石膏白虎加人參揚又發病後經四五日以上始便祕者大柴胡揚之體也 本病中以往來寒熱胸脇苦滿默默不思飲食心煩呈喜嘔之狀者爲多此時可用小柴胡揚多口喝

第三十二章 糖尿病

【原因】 往時稱消渴者酷似本病之症狀也金匱要略腎氣丸條男子消渴小便反多飲以一斗小便亦一斗云 本病在血液中積滯過剩之葡萄糖從尿中為持久的排泄者也間亦現遺傳的疾患其中尤以中極

經疾患或慢性之消化器疾患並聯而起者。 **神經的與奮屢屢爲本病之引誘又精神系統之器械的振盪如隨落打擊汽車負傷等亦易致本病亦有與神** 神經病相互而來者甚多尤以希斯為里神經衰弱癲癇或神經病等為最多。

此外攝取含水炭素久而量多時亦能致本病

本病見於小兒者稀往往見於二十歲以上之男子尤其在五十歲至六十歲者爲多又稱本病之富裕者較貧

乏者爲多。

經痛腱反射消失脊髓痨樣症狀等往往見之 痒。慢性陰部瘙痒。恒久性顯疹。慢性癖瘡四十歲以內之白內障果物模口臭,其他為昏睡狀態,**頑固之兩倒神** 【症候】 本病惟一之確徵爲證明尿中含有葡萄糖其他多量之利尿尿比重增加煩竭食氣亢進進行性羸瘦皮膚煩 本病大多經過緩慢而少急性之經過其俄然而起者則呈重篇之症候

尿之變狀爲本病診斷上最緊要者尿量增加至一日三立至八立患者放尿頻繁夜間不能安眠排泄淡黄色 之尿放尿後表面殘有泡沫此泡沫爲本病之一特徵蛋白膽汁色素之外示糖分之存在尿量與尿比重俱增

後篇

第三十一章

野盂炎

第三十二章

糖尿病

加拘急增大達一〇三〇乃至一〇四〇或超過之。尿量不增加比重却減少者甚稀尿呈酸性反應倘放置空

氣中其酸度盆加顯著。

創性糖尿症及肥胖性糖尿症二種本病患者煩遏特甚飲用多量之液體尿之排泄亦多口腔乾燥及有粘稠 患者飢餓。訴煩渴雖攝取多量之食物亦漸次陷於衰脫但有時其營養發生無障礙亦見佳良故本病可分瘦 之感。全失發汗之傾向。皮膚乾燥。粗糙。蔽有細小之表皮屑片體溫往往較平常低下。

本病之併發症頗多爲炎症及中毒性二種

皮膚上發煩痒。生慢性顯疹癤瘡等,其他從輕微之外傷爲致皮膚生壞疽之原因此壞疽現於下肢之中趾部。

毛髮往往乾燥帶碎乾性有時生禿髮病。

齒牙亦屢蒙其侵害陷於蠶齒其他口腔炎亦往往見之 眼目之疾病頗頻繁其中最屢現者爲目內障此外爲弱視視神經疾患虹彩炎眼筋麻痺等均無但起網膜炎

肺臟爲屢侵之臟器。本病患者。多歎爲肺結核而斃而患肺壞疽者亦多胃擴張爲稀見之併發症肝臟亦往往

腫犬或來急性及慢性腎臟炎之症候 生殖器之變狀。往往見之疾病之初期則經慾亢進、衛次精液之形成消失成陰萎症。婦人則窒不耐煩痒,男子

1射消失。末梢性運動麻痺皮膚知覺消失等。 症狀中第一舉為頑固之神經痛就中以坐骨神經痛為最多尤其屢犯兩倒有時起多發性神經炎招來

事不省屬最長大氣息顯着營深呼吸或發強度之譫語加之呈發揚狀態此致死的轉歸能陷腦及胸麻痺也 反應患者之尿及呼吸若林檎或有歐推兒樣之芬芳性臭氣至其病室內時即能知之此際患者突然陷於人 本病最重篇危險症狀之一。為糖尿病性中毒此名糖尿病性昏睡在本症之先,尿中呈辨魯海兒脫氏鹽化

現於數時間內或一二日間間有一時輕快但未幾又增悪

膏之類。亦往往柴胡加龍骨牡蠣湯、大黄消石湯、麥門冬湯之類。亦可用之反之陰證則用八味丸。 陽症最多用石膏配劑之方劑如白虎加人參湯竹葉石膏湯或用大柴胡湯加石膏小柴胡湯加

膏劑用石膏劑後煩渴煩痒止尿中之糖量减少白內障去其他之併發症亦屢屢輕快本病感腰痛或坐骨神本病之煩渴者起於尿量過多液體缺乏與治小便不利而煩竭之方劑如用五苓散猪苓湯者甚少却多用石

經痛者用八味丸往往收效。

瘙痒用石膏劑無效則用梔子或腸之類不能制止者如八味丸真武陽附子劑爲必要之方尿量過多因患者

猶有倂發症之各方。參照各疾病條下。 夜間不能安眠,用附子多奏效用則尿量能出於意外之滅少。

實驗 例

(一)日本橋兜町、某株式證券會社置藉男子。四十二歲東京大地震災後罹糖尿病、未全治。荏苒至今。

顏色黎黑有如垢之斑點體重會近二十黃現僅十四貫左右也。

前胸。肩胛間部上溝之皮膚生癜風

自覺之症候為陰萎與無力眼欠舒時時口中流出潰瘍左側之坐骨神經痛衂血頻繁從屑至頸強頭重等口

渴達煩渴程度多尿量近來之血壓在二百米里之上大便一日一行。

脈左右俱緊右稍浮左稍沉舌根附近見淡黄色苔腹部無軟弱之狀特觸之亦無抵抗之狀 患者服藥及二十二個月僅殘留輕症之坐骨神經痛及眼症此外已全輕快尿亦無糖之證明。

初龄当時捉每個之症狀所謂病之治標也加以本治之方而其症全治。

當初衂血之血壓有亢進症狀兼用瀉心揚桂枝茯苓丸在某中途訴吞酸嘈雜乃與柴胡加龍骨牡蠣湯坐骨

第三十二章 **粘尿病**

神經痛甚時用鳥 湯稍稍用别種之治療方針此後六個月間連服大貴浦石湯病勢漸漸擊退大半血壓最

(二)近隣雜貨店之主人偶然於醫生治療頸部獅腫之際發現尿中含糖始知種糖尿病非自覺症之過程也 高者右百三十至四十米里左百三十五至四十五米里此亦有趣之事也附記之

時時頸部出癰腫在苒經年未治癒口渴但不至煩渴引飲之程度舌一面白苔稍乾燥

腹診上左右之直腹痙攣急心下部有抵抗證明胸脇苦滿儼然桃核承氣湯之腹症也脈稍沉有力大便一日

往往生者甚少余旣以此藥告之乃與大柴胡湯加石膏合桃核承氣湯服藥一週尿中之糖消失此後每日不 患者害服漢方藥、求藥某所不大見效漢方無糖尿症之藥、為因病名不一。祇可下抽象的治方但罹糖尿

發見糖之反應矣.

和田東郭用大柴胡湯加石膏治頭髮之拔落云森立之用大柴胡湯治陰薆有效此亦有趣之事也

男子之病也於婦人者甚稀檢閱藥室雜說中,消竭之治驗者數十人盡男子也療治婦女之消竭者僅二三人 驗津液涸場氣血耗散者選用竹葉石膏湯麥門冬飲子天女散等鲍食後腹脹滿者用五味平胃散便祕腹脹 用白虎加人多易多房失精及疝家等常患腰痛或下焦虚冷少腹拘惫發消渴者八味地黄丸(腎氣丸)有奇 而已(中略)治法依前述論統爲不治之症。但輕症者能節飲食不怠服藥百人之中亦可救其二三焉初發者 [本間寮軒之說] 仲景氏之書中。凡婦人二字標出於書首者其中僅限婦人之病無男子之病。以此考之則消竭亦限於 胃承氣湯麻子仁丸蘆薈丸施用蜜煎導灌腸法亦宜常服牛酪飲萬根粉萬根水等亦爲止竭之 消竭古人單稱消金匱要略始有消竭云云傷寒之消竭乃謂一 時煩竭無真正之消竭へ

門冬甘草五味子粳米也 麥門多飲子者麥門冬人參知母生地黄茯神五味子瓜畫根葛根甘草竹葉也天女散者天花粉地黄葛根麥

熱之症或謂積久飲酒所致各持一說鄙意觀之酒食色慾皆足患此也 也多飲湯水又常多食小便赤黄色者中焦渴也竭而好湯小便如獨物之膏者下焦渴也此病前哲或謂係胃 二字相連為良好之病各此病古分紀於肺胃肾三部呼之為三焦竭大抵湯水多而食少大便如常者上焦渴 〔有持桂里之說〕 字書云瘠即消竭病蓋瘠從消字而出消者飲煩渴恰如旱天灌水日下曝冰之消也消渴

消竭久不愈則成雀目(夜盲症)或脊發癱

朝胃承氣湯 消穀香飢大便鞕所謂中消之症此方治之。(大塚日抵當陽治消竭亦有效) 白虎加人参湯 此治所謂上焦渴之上消方者也友人青圃患消竭舌白苔而燥脈緩用此方得奇驗。

腎氣丸 足資參考) 此事非可面提口授惟學者留意研究自能知之(大振日八味丸證之患者其最高血壓在生理以下者爲多,余初聞之茫然歷多年乃神悟。吾師之所謂陰陽即仲景之所論浮沉者也又脈書所言微細如蛛絲非陰脈也。 此方為下消之治劑下消精驗枯竭之故引水自救也善師云消渴之證脈似陽而實陰故用腎氣丸

生津陽(麥門冬 黄芪 外臺中擦消竭口苦舌乾者之方(麥門冬 括葉根 甘草 黄連 鳥海 地黄 知母)

前方用於輕症後者用於苦消遏嘈聯者爲宜

繅絲湯(麦蠶期之湯)

錢氏白朮散(人參

白朮

茯苓

整香

木香

甘草

萬根)

蝸牛散(燒存性服用其末)

後裔 第三十二章 糖尿病

鉛用散

括養藿香丸

益元湯(石膏 黄柏 地質 括葉根 地骨皮)

外臺療消渴方下。除括董藿麥丸外之七方。皆後世之方也運用之或有危險故不錄,消渴者通例等於今日之 糖尿病尿崩症其他口喝多尿之疾病亦包含於此病名中此等之藥物力能止渴即糖尿病之效藥也

第三十三章 脚氣

后人事證方〕 神功散(同芍藥甘草渴)治消竭有效。

【原因】 真原因不明維他命不足為本病誘因中之一。

【症候】 作事上不感何等之疾苦其重症則患者訴疾苦之甚疾病頗有急性的經過至致死的轉歸。 本病之主徵為運動及知覺障礙並心臟患之症狀症狀有輕重種種之别最輕度之患者惟僅自覺

本病大别爲左四種

身倦怠惡寒頭痛等或以加答兒症狀為前聽如鼻加答兒氣管枝加答兒或胃腸障礙而露本病。迨夫本病之 (一)神經性症 本病徐徐而起且病初之症狀輕微大多不能明示起始之趨勢患者亘數日或過餘後則全

訴頭痛口渴。容易脫汗,其次脚部手指口圖感知覺麻鈍下腿現輕度之浮腫下腹部則知覺障礙眼瞼耳殼亦 本病固有之症候焉脚氣(尤其是下疑)感倦憊與萎弱步行時容易疲勞時於排腸筋緊張之時感疼痛患者 固有症候出現後此等症狀即消散

暂時患者訴心悸亢進心窩苦悶心悸亢進焉疾病之初期只現於運動時其後於安靜時亦起食慾缺乏利尿 現之隨病勢同進行而伸展於下肢一般手指前膊等。

减

膝蓋腱反射於疾病之初期中亢進其後漸次減弱或竟消失又脚部之粗大力減退故患者容易躓仆。 脈

增加速而 且軟。

海篇洛麻裴兒喀氏症狀早夜侵害上肢之運動而現該筋肉之萎縮拇指球及小指球然扁平甚至凹沒陷於 歷股關節。成輕度之屈曲位置下歷從膝蓋以下。成鉛直懸垂足部呈內翻馬足狀其他見瘠鹽痨之際呈浦拉 (二)萎縮性症 本病亦如神經性病期部感萎弱腓腸筋之緊張徐徐而起後脚部之萎弱逐日衛進遂 致大

知覺障礙亦神經性病脈搏及心臟異常浮腫僅存或全缺腱反射亦大減弱或全消失。 上述之狀態患者每不能動作致縛於病轉

其他間亦有陷於萎縮及筋肉擊急性攀縮者此尤多見於腓腸筋 本病經過甚緩慢有巨數月或年餘者。

腔患者訴強度之心悸亢進呼吸促迫心窩苦悶利尿顯著滅少大便祕結。 際不呈顯著之運動麻痺及筋肉萎縮。但浮腫爲本病之特徵先逐日現於脚部廣延於身體各部遂及於漿膜 (三)水腫性症 本病或如神經性症脚部徐發蓬弱或起萎縮性症患者之步行漸次困難但在萎缩性 症

心臓尤其左心擴張往往爲心囊水腫所蔽不能認出其裏正之擴張。

起或以輕症脚氣之症候爲之前驅速來病勢之惡化患者心悸亢進心窩苦悶呼吸促迫體温上升食思全失 急性惡性症或心臟性症 本症之特徵爲急性心臟機能不全好襲少壯之人即於健康時 本症

其他患者訴脚部倦 悸亢進心窩苦悶逐 憊及重感腓腹筋緊張壓之覺疼痛又下肢現輕度之浮腫知覺麻鈍脚部之運動麻 少顏貌污穢蒼白色大便常祕結。 日顯著增惡患者訴胸內如爆裂樣之苦楚眼目口腔鼻腔開大瞳孔散大其顏

煩竭惡心嘔吐利尿減

缺 恶。

氣種 者精祥亡失遂在肺 徴 ता 及 臟濁音部 其 第二 之 漿膜 肺 狹 水腫之症狀下 小。 動 腔 甚 脈 現 音亦 時完全消 水 腫。 但 濁 此 失横膈 頸動脈 而斃。 水 膧 生 跳症,動。則 膜及其他之呼吸筋呈不全麻痺狀呼吸大大促迫體温跳動橈骨動脈頻數且軟上下指端厥冷呈紫藍色肺臟 增加 心動 之 數. 心臟部及心窩部見 汎 發 性 之 博 動. 陷 過 ジ 於 尖 急性

湯。 加 朮 神經性症 湯病勢進步浮腫伸展全身心悸亢進胸脇苦滿利尿城經性症感下腿之倦怠與萎弱出行之際容易疲勢頭重 感下艇之倦怠與萎弱出行之際容易 少大便秘結 口 | 渴脫汗加 者與 以下 腿浮 大柴胡湯柴胡加 腥。 知覺麻 纯 可

不效 者。 與 水腫 時。 大 性 性 有堅硬如板之 症用柱 與木 青龍 症初 防己去 湯胸脇苦滿心悸亢進呼吸促迫利尿减少大便祕結者與大柴胡湯柴胡加芒硝湯若浮腫 發脚部萎弱。 校加附子! 唇狀食氣缺乏顏色如土心 石膏加茯苓芒硝湯。 湯桂枝附子湯八 下腿浮腫 者與越與加朮陽若脈浮緊口竭煩燥全身現浮腫。 味丸當歸芍藥散當歸四逆 棒亢進呼吸促迫喘息利尿碱 《燥全身現浮腫無自汗之症。湯柱枝芍藥知母湯之類 少之候者與木防己場服 利尿 強烈。 减 少

若胸 堅硬屑背凝 厂厂 飲食飲之 脇 苦滿 症 與 心嘔吐不 (以上諸 1 悸亢 結 極變 呼吸促迫去 陰脈巴 進呼吸促迫體温上升食思亡失 能納入時與瓜蒂散以吐之若腹 變沉邊煩躁厥冷現吐逆之狀投與吳茱萸陽能数十 煩躁心中有懷懷之狀大小便不 本病 ·煩竭惡心吗 ·病總犯陽實 滿之 · 选嘴 惡心嘔吐大便祕 利者 鳴 避初 促 迫大 速與大陷胸 期即 小 爲下 便不 結 利 中之 利者。 尿減 劑之 湯。 危 一焉。睫 少之候。 適 與大承氣湯 應 症。 先 與 心下 大柴 如石 胡

備考

大塚日魏氏家藏方之六半湯(芍藥甘草湯同)條恰脚氣行步不能云云此方亦常有應用之機會也 (朱氏集驗方) 去杖陽(與芍藥甘草湯同)治脚翳無力行步襲難有效友人戴明遠用之有效驗。

生姜半夏湯治脚氣入心悶絕欲死者為宜。

〔醫事小言〕 腹攀急及於痺時用桂枝加苓朮附湯足不腫而其初氣急者最懼之候不得不診察其有無衝 者水毒伏於內衝心甚急也。 呼吸障礙者用防己黄耆汤。 别或手足不種股無異常之兆而水腫者用木防己加茯苓芒硝湯本方去石膏但熱竭者不去爲宜全身軟腫。 心之候也 心之兆。微帶寒熱舌上有苔湯而小便不利咳喘脚弱者越婢加朮湯之镫也 言語氣息不足者亦衝心之象也。 從胸至喉發腫音聲變態者凶兆也 不能平臥者衝心之候也屑息者亦然 **膻少有小便数日不利。但其腫甚堅煩竭** 胸間之動氣強大人迎之脈強大者衝 心下堅塊如凝小腹不見格

予多年試用此方教急頗多, (本間棄軒) 類聚方廣義〕 脚氣衝心之漸近者用茯苓飲合吳茱萸湯有奇驗此方咽下嘔氣忽止飲食亦納小便亦快利。 脚氣致萎弱不能起立麻痺之特甚者不用烏頭附子入方劑無效此用烏頭湯爲宜

第三十四章 拔沒篤氏病

奮急性傳染病等亦爲本病之誘因 病如糖尿病心臟疾患結核患等之家族發生本病者甚多其他神經病之經過中發生者間亦有之精神的興 遺傳的素因與本病之發生有重大關係本病之患者其兩親或祖先大多有神經或精神之疾患其他之全身 【原因】 本病因甲狀腺機能之病的亢進成自家中毒症多來於女子但幼年時不現

【症候】 本病之特徵為心悸亢進甲狀腺腫大眼球突出及振頭。 第三十四章 找疫馬氏病

顯著同時心動旺盛胸壁顯著振動其他口蓋弓脾臟腎臟等亦呈搏動心動旣如上述之強盛於是漸次心筋 之擴張及肥大間亦可聽得收縮期的心臟雜音。 縮之數在健全時六十至八十。本病之心臟收縮數則在百二十以上其時與脈搏同速其他心動頻數發作性 起安靜時比較的不著明病症進化遂遠持久性患者覺腹內不快搏動之感訴恐怖胸內緊迫及苦悶心臟收 進即心臟急 遼 症為本病之症候中最早促患者之注意之一症疾病之 初期惟身體及精 神之亢

腥分述六徵於次 甲狀腺腫大亦爲心悸亢進之前驅大多發於其後或多同時來者此腫大常現於兩側亦有先發於左側而後 來於右側者此甲狀腺腫大為純粹之脈管性腺腫基因於脈管尤其於動脈及靜脈之擴張及延期於甲狀腺

(一)著明而得望見之搏動。 五)脈管之破壞性易。 (六)脈管內之血液對於壓易排除。 (二)觸之知振顫 (三)著明而能聽得吹鳴性之雜音。 (四)動脈管之擴大。

眼球突出每常現於兩側眼目衝次從眼窩突出,其時眼瞼完全不能閉鎖不能掩蔽眼球。

振顫時常見之其眼動小而且速。 跟球機能陷於機能不全尤其是視軸鞍合機能更失其功能此名真歐皮烏斯症候亦有眼球與眼瞼之運動 符合者。名曰喀雷夫歐斯氏症候更有眼瞼開大與之刺戟其瞬目減少或缺少者。名曰司脫兒維喀氏 症。

眠其他發汗甚易分泌唾液及尿之排泄量增加有時供發黃斑白斑鞏皮病限局性皮膚浮腫蕁麻症關節浮 又往往呼吸困難喘息發作。及咯血顫貌呈蒼白色眼球帶藍青色體質多纖弱呈神經質容易與奮屢屢訴 又來多量如水之嘔吐其重篤劇甚者下痢。

訴以上之甲狀甲狀腺之部分有壓迫感或喉頭有狹窄感者與半夏厚朴獨耳陽眩暈之甚者苓桂朮甘陽當 動悸不眠發汗過多神經過敏見物易驚胸脇苦滿層髮等與柴胡加龍骨牡蠣汤若胸脇不苦滿

燥之狀應用炙甘草湯失眠之甚者從證選用酸棗仁湯。 歸芍藥散之類合方與之脈浮大心悸亢進呼吸促迫口場。舌乾眼球突出者與越婢加半夏湯症狀進化呈枯

梔子豉湯瀉心湯茯苓飲合芩桂甘棗湯或茯苓飲合酸棗仁湯之類以上之方劑服後仍心悸不靜時頓服桂

實驗例 枝甘草湯或桂枝甘草龍骨牡蠣湯。

診斷注射薩魯侯兒生之外别無良法云但病家尙遲疑未定偶有一人知之遂勸來余處乞診 (一)幡谷町田中氏之妻三年前飞脇膜炎癒後心悸亢進耳鳴肩凝治法已盡終不輕快有一醫生下黴毒之

余一見而知為拔沒為氏病左為初診日大略所舉之現症昭和七年三月三日初診

日一行尿意頻數口場有舌苔主訴耳鴻頭重目下最痛苦者為月經之前以上症狀更增惡 身高長稍羸瘦眼驗裂開大眼球中有光澤,甲狀腺肥大脈促而有力。心下悸與臟動均著明筋肉搐搦大便

投與大柴胡湯加石膏合當歸芍藥散耳鳴頭重肩凝均輕快但訴下腹痛食慾減退四月二十五日轉用 小柴

續服不滿三個月。自覺痛苦消失眼球復歸於正常甲狀腺大減退類部現筋肉還復數年前之狀家族皆為喜 胡湯加石膏合當歸芍藥散

至全癒服藥一月餘以效遲故去而就西醫此後余每診拔沒篇氏病病家心誓能依余方續服半年以上者方 爲投劑西野更有何種治法。尙不疑爲效遲漢醫之治一月不寒者即以爲效遲而去以此觀之西醫真有一 同道荒木性次君之知友某之妻乞診拔沒篤氏病余與荒木君傾心相謀盡術以治之亦能稍輕快但未

第三十五章 神經病

皮膚之知覺大多在所患神經之範圍而起障礙初期呈知覺過敏後期則知覺亡失大多神經痛在維雷氏壓點壓迫此壓點則招來所患之神經疼痛發作者更增劇者。狀亦不一或如鑽或如灼或如碎雖強壯男子亦必絕叫嗚咽不能營心身之勞動亦有妨礙睡眠者。 神經痛者所患神經之範圍上有廣延之疼痛現出發作性或增惡化疼痛發作之數及持續無一定疼痛之性

性或來強直性之筋肉痙攣 脈管運動神經分泌神經及營養神經亦往往同時障礙其他激甚廣大之疼痛則放散於皮膚部分或來間代

解剖的變化多陰性祇於某場合呈神經炎性變化。

神經痛之原因有寒冒性外傷性傳染性及中毒性之區别。

又有反射性神經痛者是起於遠隔器官之前驅疾病屢見於婦女生殖器之疾患

吾人所最多遭遇者為顏面神經痛及坐骨神經痛。

甲翼面神經痛

原因 本病爲最頻繁之神經痛因三叉神經分枝通過多多之骨幹且其末梢之所在後表易蒙傷害

感冒性三叉神經痛發生於受冷之氣候或遭遇風雨者比較的少有。

挫傷又刺創頭蓋骨之膜炎腫瘍之壓迫神經幹之腫瘍倭蝕齒牙頸骨鼻腔前額腔眼及耳等之炎症等爲其 中毒性三叉神經痛因中鉛水銀之毒而來又痛風起於糖尿病之際外傷性三叉神經痛甚多若三叉神經之傳染性三叉神經痛適來於馬剌亞里神經痛此外來於腸窒扶斯因夫魯恩柴及徽毒等。 原因有時本病體起頭蓋底之疾患如見腦膜之黴毒性急性炎症及肥厚腦底腫瘍腦動脈瘤等

本病以男子比女子爲多又肥胖貧血神經者亦多

本病常發於偏側。但亦因恆久性而漸次及於其他處者此際最初習者爲一側之神經大多疼痛消

同時習三叉神經之全三枝者少有最多者不過發三叉神經之某一枝中之一枝就中最多者為上眼窩神經

疼痛之性狀急烈時或如灼或如碎或如變其發作之持續及反覆之頻疎並無一定 **疼痛發作之時間有前驅症發毛皮感覺螇行感覺冷感強直感覺等**

皮质之知覺始而敏銳後漸麻鈍或竟亡失。

血管運動機障礙初期大多脈管痙攣皮膚變蒼白色未幾見該部脈管之開張因此而皮膚潮紅及訴 分泌障礙亦爲往往發生症候淚汁及鼻汁之分泌增加甚至出衂血其他唾液纤液之分泌亦顯著。

感冒性之原因爲 露臥濕地或冷石上或沉溺水中或其他之野營等 本病外傷及感冒為最頻繁之原因為諸神經痛中之最多見者。

乙坐骨神經痛

外傷性之原因爲墜落衝突打擊久時之跪坐或乘馬及峻路之長行行運過勢大腿之骨折及脫日坐骨神經 部之腫脹及滲出物子宮及卵巢之轉位及腫瘍子宮周圍炎子宮背炎妊娠直腸內糞便滯積骨盤腔之腫瘍、

脊椎之脫日骨折及腫瘍脊髓膜之出血炎症及腫瘍等

傳染之原因亦來自本病如馬剌利亞徽華有時如貅疾腸窒扶斯回復期急性關節洛伊馬茶斯等。

中毒性之原因。往往見於糖尿病之際。

【症候】 極難治癒本病容易診斷當問診何神經痛之範圍得患者坐神經骨之路徑其疼痛從臀部之坐骨神經之脈 本病多來於偏側有時則從偏側而及於他側或始即 兩側齊發其來於兩側者為脊髓勢之 一症候。

神经

出部沿大腿及下腿之後面波及足騙

部分的坐骨祚經痛者沿大腿之後面或腓陽部或只限局於足蹠之疼痛也

壓點陽骨後上棘之高接於腐骨之近旁部分臀部之下緣出於坐骨神經之坐骨截痕部分大轉子之直後大

慰後側之中央後股皮神經分歧之部分膝膕部腓骨頭之直下內外踝緣之後側等

患者起立時。脊柱多向患側面马曲稀有向健側彎曲者罹患側之脚部之筋肉漸次陷於不動性萎縮。

命患者伸展下肢之膝蓋關節屈曲股關節時大腿之後面發劇痛則該坐骨神經亦伸展此症候在本病之診

斷上頗重要。

娨湯、大青龍湯局所有冷感皮膚蒼白脈沉細沉遲者與麻黄附子細辛湯。 從證運用桂枝湯之加減。局所有潮熱灼熱感淚液鼻液增加與萬根湯疼痛劇甚煩躁口渴選用越

病情頑固在背不愈者從證選用桂枝芍藥知母湯鳥頭湯附子湯之類。

神經痛之中所謂基因於瘀血者。余名之爲血證性神經痛選用桂枝茯苓丸桃核承氣湯當歸芍藥散之類。

用。嘗治糖尿病與八味丸亦奏效吾友荒木性次君與苓姜朮甘湯。坐骨神經痛以應用桂枝茯苓丸、桃核承氣湯、當歸芍藥散之時爲多其他則顏面神經痛條下之方劑亦可

甚不能動亦不能觸指者運用芍藥甘草附子湯甘草附子湯烏頭陽之類或單與甘草湯總之疼痛之甚者大速冷老人之頑固坐骨神經痛神經痛之頑固者通常附子湯不能見效等姜朮甘湯亦有奇效發作性疼痛劇

急性之不同使患者理解。漢法多因此而損名者此宜特爲注意者也。 症則須經過時日亦有因投劑而往往疼痛增劇者臨牀家往往遭遇之投棄之前須先告患者以宗旨慢

能速治其

輕微者易治癒也。

理中湯治受寒邪與腰痛。

〔楊氏家藏方〕 水玉湯(小半夏湯同)治屋稜骨痛不能忍者有效此因痰疾之所致也

第三十六章 末梢性神經麻痺

肢或四肢均陷於麻痺者,其原因在脊髓。此名截礙,又偏側之上下肢現麻痺者,其原因在腦髓,此名偏瘫,之筋肉,均陷於麻痺,此亦大多爲末梢性之原因。故該麻痺肢之神經呈變狀。反之若兩側之上肢及兩側之下 【症候】 吾人未能加以說明。在條件之下,侵一定之神經路於麻痺。例如見鉛中毒之際,兩側橈骨神經麻痺是也。 其陷於麻連者亦愈多故顏面神經及橈骨神經之麻痺為吾人所最多遭遇者祇中毒性麻痺一種或係事物。末梢性麻痺之疎頻依各個神經而異其神經之徑路有表在性在長遠之長程中蒙感冒及外傷者爲最頻繁。 甲顏面神經麻運 末梢性麻痺容易認識何則蓋不論何處均能見其所屬之筋肉現運動障礙或一肢之神經及所屬 末梢性麻痺之疾患為頻繁之疾患其原因分寒冒性外傷性中毒性及傳染性四種

〔原因〕 本病爲最頻繁末梢性麻痺之一。其原因分如次之數種。

- (一)中毒性類面神經麻痺此中尤多鉛中毒。
- 行疹。多發性神經炎流行性感冒。產驛等。 (一) 傳染性顏面神經麻痺此除癩病者發之外。向有發於室夫的里丹毒腸室扶斯徽毒赤痢及其他帶狀匐
- (三)感冒神經顏面神經麻痺爲頗頻繁之症本病症百分之七十二由於顏面接觸冷氣。
- 起於頸部淋巴腺。頸下淋巴腺或耳下腺之類大或化膿壓迫顏面神經或破壞而顏面之受切創打創外科手 耳疾,由岩樣骨之結核性破壞傳布於夫阿洛芝浦氏管經過其內壓迫顏面神經幹。或崩壞之以成本病其 四)外傷性顏面神經麻痺亦爲頻繁者初生見於分娩之際用鉗子手術壓迫顏面致起本病此中最多者爲

一四十

第三十六章

末梢性神經麻痺

術館創等亦為本病之 因有時過頭蓋底之壓迫亦能喚起本病如硬腦膜之微毒慢性炎症肥厚腦底之腫

荡如腦動脈瘤

(五)症候的顏面神經麻痺現癩病。白血病痛風糖尿病延髓及腦髓疾患多發性神經炎幼年性筋肉萎縮症

候之一病狀。

神經性之人及酒客易罹本病。此因神經組織之抵抗力減退之故。

【症候】 經再從顏面神經而出致味覺障礙亦本病中之一症候又淚液腺及唾液腺分泌神經纖維亦出於顏面 **雍垂及口蓋弓之傾斜。或聽覺異常或味覺纖維性亦從淺大岩樣神經之三叉性神經來於顏面神經鼓索神** 本病症候中之必發者爲顏面神經麻痺其他顏面神經從運動枝分佈於口蓋筋及馬鐙骨來 自懸

致淚沒及唾液之分泌障礙亦見於本病。

患者不絕惱流淚今試患者營嗤笑運動時患側全失其運動其狀如假面,知本病之存在即該部之皮膚失皺襞平滑眼瞼開裂比健側廣大患者眼瞼之閉鎖障礙又往往下眼瞼外翻,顏面筋肉之麻痺。為本病必發之症候與上述症候額面神經幹之部位相異額面之患側旣變其姿容一見便

今欲逐次精密微視每個之額面筋麻痺患者一定營顏面筋運動前額之患側失皺襞健側現水平之横皺患

側壓 額之際依然不變形。

皺眉筋麻痺者。患側之層間失皺襞也層比健側底下。患側之瞬目消失。顫面顯著傾斜。以指尖試之或接觸於 眼臉角膜不起反射的瞬目尤其當患者閉眼時健側之眼能關**否患側之眼開放不動顏面之傾斜愈顯**

鼻尖健側傾斜鼻孔患側狹小。

口裂及頤部牽引於健側口角之口角舉筋因而麻痺而患側下垂又患側之口裂不能閉鎖口笛噓嘯吐唾作 П 尖不能挺出從裂口逸出空氣飲食之際食物容易從患側之裂口溢出於是患者之頭部不能不傾於後

方

頻筋麻痺則障礙咀嚼運動頰部不能營充分之緊張頰粘膜咀嚼運動之際嵌入齒列間而傷之又食物堆積 於齒齦頻粘 膜之間患者不得不以手指抉出或從外方壓迫頰部驅逐出口腔。

味覺障礙 者從顏面神經之膝狀節與鼓索神經之顏面神經分歧部分之間生障礙也常圖於舌之前方三分

之二之部位或唾液之分泌减退口腔之患側及感乾燥,淚液之分泌亡失。

顏面神經麻痺往往發前驅症如眩暈頭痛感頭內朦朧耳鳴難聽及耳痛等此等之前驅症直至發病。 本病有輕 症中等症重症三種之區别輕症顏面神經麻痺可見電氣與奮性之變化施特種之療法大抵經二

三週間。自可治癒中等症呈部分的變化反應治癒須四週至六週重症顏面神經麻痺現出完全的電氣性反

應漸次顏面筋瘦削有致終生不癒者。

顏面神經麻痺大多來於偏側現兩側者稀.

乙桡骨神經麻痺

原因】 外傷為本病源中最多者其他感冒傳染病中毒亦本病發生之原因也

【症候】 本病之來。手及指現特有之變狀上肢上舉於地平線則其手之手掌面屈曲。同時內轉拇指外轉且

稍彎曲而指節手掌面亦屈曲。

本病恆多俄然而起有時其前驅症現知覺異常

顔面 神經麻痺之初期,其輕症者可用桂枝加黄耆湯、黄耆桂枝五物湯桂枝加附子湯桂枝加朮 附

湯桂姜棗草黄辛附湯之類

備考

桡骨神經麻痺亦

可用以上

方劑。

後篇 第三十六章 末稽性神經麻痺

是正氣中伏邪氣故肢體頑麻不仁厥如死屍也用桂枝麻黄各半湯(傷寒六書) 諸虛寒乘鬱冒不仁(不仁之仁即無中心之貌轉麻痺之意也) 血氣虛弱不能周流一 身者。

大塚日厥者不仁之甚也今謂知覺消失也

己附子也獨活寄生湯者獨活寄生杜仲牛膝細辛素艽茯苓桂心防風川芎乾地黄人參甘草當歸芍藥也大防風湯者地黄芍藥當歸川芎黄耆白朮附子人參獨活牛膝杜仲甘草也六物附子湯者苓桂朮甘湯加防時再用大防風湯獨活寄生湯等脚之治法治用以上諸方又可隨證用六物附子湯腎氣丸之類(下略)變色步行困難而致殘廢其病臂者先用桂朮附湯桂枝加苓朮附湯萬根加朮附湯及桂枝芍藥知母湯無效 常因循而永不愈或發於脚大多其始焉兩脚或一脚之指達漸漸由膝而上或萎弱或掣痛瘦而細血氣髮滯為偏臂或兩側麻痺萎弱羸瘦血色無紅活或痛不能舉或不能伸屈非中風非痛風無惡寒發熱之證飲食如症也又有似痛風處古人則别立其病門金匱要略中之中風歷節篇中痺亦列入但臂不遂者入掉也其病情 (本間棄軒之說) 麻痺之一症屬於中風癎證之微漸而不備中風癎證之正證難定爲中風亦不能認

第三十七章 動脈硬化症

比之徽毒焉少。 而來故不得不與徽華動脈炎有區别其他脂肪過多症糖尿病痛風肺療鉛及尼突金中毒亦喚起本病酒精【原因】 本病之主要原因為清精中毒及徽華尤其以幼年時之徽毒易喚起本病但不因徽華固有之變化

熱性傳染病中尤其是關節洛衣馬基斯馬剌利亞發生本病者不少。

由 遺傳亦決不可輕視脈管彈力性之良否有遺傳的關係。年齡亦與脈管彈力之變化有最要緊之關係。年高 脈管退行性變化之傾向因發本病者亦甚多。

【症候】 本病患者之皮膚乏彈力富皺襞筋肉萎縮骨質菲薄血行器官呈本病固有之狀態動脈管強固 脈

搏扁平。脈波之昇降頗遲緩。

弱實際上全身之動脈不悉呈硬化性變狀唯呈上行大動脈之動脈硬化症左心室肥大擴張又兼以冠狀動 心臟多呈著明之變化若全身之血管硬化以致全身血壓之亢進其結果心臟肥大擴張甚至惹起心筋之衰

脈硬化症時此爲隨附之疾苦

上行大動脈硬化症所患之動脈管擴張及延展層於喉頭窩容易觸知其搏動打診上於胸骨之右緣約有三 仙米之廣袤。豈鼓性濁音。聽診上有收縮期的雜音。此雜音與大動脈瓣孔狹窄之際,所現異點之雜音。有相異

之點其 性甚柔軟其始與心臟收縮期一致且多兼大動脈第二音之有響性旺盛

上下肢動脈硬化症所患之動脈硬固呈蛇行狀脈搏小或全缺其他所營之肢部之運動性知覺性脈管運動 下行大動脈硬化症腹壁非薄而柔軟時觸診上呈蛇行狀現硬固之脈管遇輕度之壓迫觸知 又上行大動脈之硬化症屢有冠狀動脈硬化症隨兼大動脈瓣閉鎖不全或大動脈瓣孔狹窄。 有異常之感覺訴熱感冷感疼痛及緊張之感運動下肢每常增劇其度。遂至運動中止又硬化症達強度所患 性及營養性機能受障礙尤其著明下肢動脈硬化症之際,所見之變狀發現所謂聞歇性跛行症患者於該部 其容易起

之動脈閉塞時其所屬之末梢部致生壞疽

身症狀又患者呈類似腦神經衰弱之症狀感頭痛眩晕全身倦怠。 派硬化症。焉所惠之腦髓循環遇障礙。遂示所謂動脈硬化症性腦髓軟化症。現出諸種之局所症狀及全

本病膯溢血亦爲最頻繁之原因。

動脈硬化症之患者陽證與實證爲多用冷藥寒藥瀉下藥之配劑爲多如石膏大黄芒硝山梔子之

後篇 第三十七章

動版硬化症

堅硬顏色惡口竭心悸小便不利等與木防己湯服之一旦輕快者再與木防己去石膏加茯苓芒硝湯石膏與本病呈神經衰弱症之症狀感頭痛眩暈不眠不安且時時衂血者用瀉心湯梔子豉湯之類如心臟喘息心下

茯苓與芒硝有互相關聯之作用可考究上之二方而運用之

間歇性跛行症可用桂枝茯苓丸或當歸芍藥散當歸四逆腸之類從證兼用附子湯或合方若有壞疽之傾向

者亦運用以上之方劑。

有動脈硬化之傾向者。全身肥滿腹部有膨滿之傾向者、從瞪從人用大承氣湯、大柴胡湯、大黄消石湯、大黄牡

丹皮場之類達服之可滅輕全身之症狀能軟脈力

為歐夫歐特林證則亦危險之藥品也其原料恐有麻黄。 阿篇雷那林可硬化動脈使用於動脈硬化之時須細心注意是否確為阿篇雷那林症若近似阿篇雷那林而

余對於證明顯著動脈硬化之患者。其血壓常在二百以上爲一個七十三歲之男子。患病已半年以上投與越 婢加半夏湯木防己湯旋即氣管枝喘息心臟性喘息和緩目下猶健在云麻黄一味有無硬化動脈作用雖不

得而知然從證適當用之則甚無危險也

促久不瘥。遂致水腫者與甘草麻黄陽有效但此藥可發表。老人虛人不可輕用余當時年少未熟方脈被濟生 往年有一男子年六十餘歲患上症(指水腫)余一診之與甘草麻黄湯服之一夜出汗而死後讀濟生方息氣 後始大悔愧前非云。

第三十八章 腦盆血

【原因】 補助原因促進破裂本病以四十歲以上者為多亦為頻繁腦疾患之一 本病基因於最小腦動脈之病的變化形成粟粒動脈瘤此病有頗有破裂之傾向或自然破裂或因

而促進 【症候】 本病或見於 久時之 前屈 一本病定型的症候分多數的病期即前兆期卒中發作反應期墜廢症候及續發性短縮但、與本病之發生有關係初冬多見腦溢血。此因寒冷所致皮膚血管上乏血液內臟中充盈血: 補 之 助原 血 《家族》 證 瘦 入 位等其他 因為大動 遺 焉多故短矮之體質名卒中質 病 傳的。 見於 是亦 心臓 脈系統之血壓一 腎臟炎及六動脈閉鎖不全左心室肥大。 血管變狀傳遺的發生腦出血亦來於安靜 瓣 膜障礙腎臟 時性的亢進轉機即憤怒俄然精神興奮荷重怒費、 炎酒精 體但無重要之理由恐為 中毒 蹇 及其 動脈硬化症等亦能促本病 脂肪 染疾 時或睡眠 過 病 睡眠時多 之 際脂 多爲一 一管變狀 肪 過 發生。 飽 定的 多. 食酒 身 液故 補 助 原 短 也。

之半側發覺一 (一)前兆期 患者有數時 間 一時性萎縮或知覺麻痺問或數日間身體之偏側 此 時 期 頸 內充 血、 眩 痺。 側中發現蟻行感覺或知覺麻鈍或一肢無此等之感覺其他一 灅、 頭內搏動精 神與奮記憶力 減 退、 眼火閃發重聽 間有一 時性 肢或 之失語症

此各期不

必每常定備。

而充實。 脫之狀體温於初發作之二三時間 氏呼吸式患例 射器筋反射屑胛反射等之消失反之乳房反 層不呈反應作用瞳 且 (二)卒中發作 度之 顏面蒼白 反覆嘔吐又 人事不 之口脣呼吸時 患者突然卒 而 孔往 或 省。 細 《起半側 小緊張 往 見尿之失禁利 兩 毎 例大 倒亡失神識。 弱多為緩徐中調 或全身之間代 翩 翩動 小有異對於光線之反應甚 內攝氏一二度之下降後再復於平温或 尿之起始二 搖頭面多呈強度之潮紅表示 此人專不省之時間。 射則多存在比之健側其度常弱腱 性痙攣其他 節 不整診斷上之必要者為 一十四小 時則 時 現強 内。 遲鈍呼吸帶鼾聲時現不正之基 達數 其 小 迫的體促 時或 血液之灌 增 麻痺 稍稍 數週 加。 有時 頭 時之持續 上升脈 部及 反射亦 側 既又往往呈着 之 證 服目 皮 明含 常 盾 多強度之 於 其 向 蛋 反 度 此 射如提舉 歐因、 白色陷 頗 例之方向其 /中含 強. 消 斯 刺 於虛 緊張 墩

腦溢血

其初血量甚少先侵害運動性路徑其後血量增加自是起卒中發作此種卒中發作屢屢有其誘因俄然由腦又現一時性眩暈短時之失神劇甚之嘔吐此名頓挫性卒中發作又半側麻痺等爲卒中發作前驅此種出血。

從卒中發作而至醒覺其狀有種種或俄然而來或徐徐而起或全不醒覺因腦壓亢進達於最高之度乃陷於 內充血器械的振盪症其一例也此外如急速腦壓之亢進亦爲卒中發作之誘因。

人事不省遂至因心臟或呼吸麻痺至於死之轉歸。 (三)反應期 此期患者呈顯著之不安體温升勝至平常以上脈搏頻數皮膚發汗。訴頭痛輾轉牀上發輕度

之籍妄此症狀常有一二日之持續。

以上所述為發作及反應期腦盜血之定型的症狀有時惟單純留神經亡失僅呈神識朦朧輕度者神識呈第

四期之墜廢症狀此種發作狀態之輕重由於其出血範圍之遲速與多少及其位置而定。 (四)墜廢症狀 之前頭筋皺眉筋眼瞼輪匝筋索其侵害或常從上肢強度侵及下肢以致知覺全缺但亦不過一時性之知覺 小時之後內囊中崩壞時他方面則來偏癱見顏面神經上肢及下肢之運動麻痺特堪注目者爲顏面 此症候由於出血之部位而異其主要者爲腱反射之亢進大多發現於發作後三四日或數 日神經中

亡失耳。然內囊後脚之後部三分之一崩壞時則招永久性之知覺亡失。

用力亦微弱患側之聲帶運動亦困難又現交感神經麻痺之症狀而見顏面偏側嘲紅偏側發汗眼球陷沒眼 檢查運動麻痺之狀,其背部之筋。呈偏側麻痺。肩胛骨下垂。患側之胸廓其呼吸運動微弱。患側腹壁之努實

瞼裂狹小瞳孔縮

疾病追從時日而進麻痺症狀之一部分或急速或徐緩消失麻痺之最早且大而解脫最緩者厥爲下肢麻痺。 己因僅僅殘留腓骨神經之麻痺往往使患者足尖步行,又屢屢足尖曳引至足上肢麻痺之緩解者僅微就中

以前 續發性短 脾背面之伸筋消失麻痺症狀爲最困難麻痺患久乃致筋肉之不動性萎缩。 症狀起因於脊髓錐狀體徑路之續發的變性手指屈曲伸展困難。

前

膊

且

取迴前之 位置稀有伸展者上膊呈內轉位置膝蓋腱三頭膊筋腱性短縮症狀。此症狀起因於脊髓錐狀體徑路之種發熱 反射及骨膜反 射顯然旺盛。

本病有再發之危險又本病之患者漸次陷於凝鈍。有涕泣之傾向。

有軟脈 脈 芍藥散大 承氣湯桂枝茯苓丸之類心脇下痞滿胸脇有苦满之狀及耳鳴頭痛 病之未然有年齡之婦人最多患以上之症狀身體漸次有肥滿之傾向者從證服以上之方劑之外可用桃【療法】 平素有頭內充血感眩暈精神亢奮不安便祕屑凝等之症狀者服用瀉心湯黄連解毒湯之類以 精神的感應屢屢變化其他陷於健忘症膀胱及直腸亦易失禁。或體力衰弱至死的轉歸。 沉 手足之希毗雷感。消散眩暈魔能降下血壓一婦人患慢性腎臟炎最高血壓一百八十至二百服本方時必 良好而止 實便祕者與承氣之類。其他凡食毒。血毒、水毒。澀滯鬱積。目的除在疎通而投藥方者之外、從證可用當 百五十內外右手感希毗雪訴脫力與此方合大柴胡湯血壓從百六十下降發作消散目下能 作用凡 、黄硝石湯、大黄牡丹皮湯以上之方劑一度罹本病已輕快者有再發之危懼者亦可選用之石膏 ·兼動脈T 有左手足希毗當頭重眩暈又對於已襲腦盜血此 硬化症者。魯可從證還用之當歸芍藥散所以預防腦溢 藥散垄就藥方解說篇考察之 後時之人事不省卒倒之一男子最高 便祕等與大柴胡湯腹部膨 一血甚有意外之效余於本方。有 满。 抵 活 扰 動 血 力

血之預防。 参照前章動 脈 凝硬化症條。

而

不見何種

障礙至如何之證用當歸芍

及四 陷 於 度者。 事不省痰喘壅塞說者謂用 論如 何之脈症可斷言其絕無 瓜蒂散就余之經驗則推獎走馬湯紫圓 有效之藥又屢挾嘔吐豫後不良者余 之 類。 但 一發作 八此種之 後 敦 小

第三十八章 腦盜血

發作至醒入於反應期中從證選用次之諸方。

脈浮而無寒熱妄行獨語如狂者與防己地黄湯自知身體不能動亦不能發言語痛處不自感覺身體拘急不語不能轉側者用柴胡加龍骨牡蠣湯大便祕結者用調胃承氣湯若有上衝之氣味者用桃核承氣湯用白虎湯竹葉石膏湯之類煩躁不眠及下臍不適者用梔子豉湯頭痛頭眩強煩躁者用侯氏黑散煩驚發譫心氣不安顏面充血頭痛煩躁體温上升脈浮大動數或洪數者用瀉心湯萬根黄連黄芩湯口渴甚而煩躁者

麻痺搐搦久而未愈手足屈伸運動不自由者應用附子劑之定證也如選用桂枝芍藥知母湯其武揚近效方 能轉側大小便變異者與續命湯。

朮湯、桂枝加朮附湯、桂姜棗草黄辛附湯、八味丸之類。 |要略中風歷節病之條下。選用千金三黄揚越婢加朮揚風引揚之類。

之論但病發有由癇而來者由疝變者或由於瘀血結構 東垣朱丹溪諸鞏之輪出與昔人不同,其見轍超絕千古依鄙見考之。中風爲內因之病,無外來之邪實如三千 有持桂里之說] 中風古來殊無明辨始於素問病源千金外臺諸書其大意不過內虛風倭之意劉 (結奪分陳久徽舞第三期徽奪)而來者其原因雖 河 間。

参連湯 湯、此方能救急治緩亦能誠良劑也。湯、卒中風患心胸脈浮大數動者先與此方亦用瀉心湯。要之皆起於血氣衰敗也。

瀉心湯

附子篇心場 鴻心湯之症。爲但不欲食其甚時不欲食。進飯藥即欲睡。或手徵冷等症亦同此方。

風引揚 古今錄驗續命湯 参照「症候之治方」第十一章 此病無盛熱但脈之浮者先取表亦宜故如續命湯等不可全廢如脈不浮熱不盛者循可

此

大柴胡 四肢微急即緩與急少有相差率皆此類之症云。 鳥頭湯治脈之弦緊者。此爲吾門百試百效之法。又按此方亦治踡攀。積命湯治拘急不得轉側桂枝附子湯治 頭湯 湯 從疝而變中風手足踡攣或半身不遂當用此方。烏頭湯與續命揚同爲發劑續命場治脈之學大者。 中風腹滿拘攣者與此湯口眼喎斜身體不遂而緩言語蹇雖者此乃古方之妙用也

真武湯 此方治手足之振摇或喎僻(口眼喎斜)不遂其脈沉 者。

黄耆桂枝五物湯 血掉者血凝不流也此種之痺乃痺中頑麻之謂此方主治之

枯或言語蹇遊但其發時與尋常之中風異胸滿而痛。呈苦悶狀者。亟與大承氣揚攻之急要時用備急圓走馬 大承氣湯 食厥中有從信食卒中風之症者此中風之朝起發於飲食滯留也故用吐下之藥後大多過

湯之有意外之驗也。 加人參湯或參連白虎湯眩暈非用白虎湯不爲功三黄陽(鴻心湯)苓桂朮甘湯亦可適宜用之但非如白虎 〔 叢桂亭醫事小言〕 療治茶談〕 四十歲以上之人别無病象發洪大之脈者大多為中風之朝象速宜灸治 **俄然眩暈而倒脈浮弦面赤色手足帶麻痺音舌少雖全為中風但自眩暈發者用白虎** 服藥蓋: 此 7其前兆也

法也大凡治偏枯中風一閑齋翁用石膏 [芳翁醫談] 偏枯(半身不遂)中風言語蹇澁者當與麥門冬場加石膏此治大逆上氣咽喉不利。 師家之常

言語不能者或口喎斜言語蹇遊流涎泣笑不常者或神思恍惚者多用瀉心湯。 (類聚方廣義) 中風卒倒人事不省身熱牙關緊急脈供大者或鼾而大息頻頻欠伸者及醒起後半身不遂

就食時之老人卒然量倒。人事不省者、此際可認其心下满與四肢厥冷。面無血色額上流冷汗脈伏如絕其狀 第三十八章 腦溢血

中國內科學著

如中風者名曰食鬱食厥用附子瀉心湯爲宜

芍藥甘草羚羊角輕者用四逆散加棕櫚葉紅花白殭蠶及抑肝散加芍藥黄連羚羊角而不全治者則至少其 屬大小續命湯朮附(指桂枝加朮附萬根加朮附等)之症者即能生存亦不免於廢人耳。 余嘗謂中風之實證者皆屬金匱之熱癱癎其重者用風引湯柴胡龍骨牡蠣湯去鉛丹加鈎驟

第三十九章 癲癇

葬常性癫癎定型的狀態起於人事不省及全身之間代性痙攣之發作。由於腦皮質中運動中樞及精神的中 【原因】 本病區别爲特發性(即尋常性癲癇)與症候的(即戛克松氏癲癇)兩種

樞之一時性充血而起

特發性癲癇焉頗頻繁之疾患女子罹此疾者比男子爲多。 限局性痙攣。此症當特有之痙攣發作時,神識往往全不消失,其全身痙攣每節從同一肢部始。 症候的癫癎起於腫瘍形成出血膿瘍寄生蟲嵌入之骨片等刺戟腦皮質運動中樞見全身之間代性痙攣或

本病常與遺傳性有關但無世世蒙本病之襲來者。

本病之素因亦間有來於先天性凡兩親之有酒精中毒之傾向者其小兒易發癲癇尤以稱有酒精麻痺之傾

向者為甚

分娩時之障礙亦爲本病之原因如分娩困難之情形等是

傳染病亦爲本病之誘因尤以徽毒爲甚

頭蓋之外傷全身振盪亦往往與本病之發生有關聯。 中喜亦爲本病之原因此即中毒性癲癇是也其最頻繁者爲酒精之濫用。

的感動例如驚愕恐怖喜悅精神過勞等亦足誘發本病。

起其著名者由於瘢痕組織之癒合致壓迫神經而起除去之則症如消散此其一例證也此外如鼻腔咽頭耳實際上極必要者反射的癲癇也此疾患從腦髓透隔之臟器上起疾病由此疾病反射的作用感應於腦體而 內之茸腫形成或耳內有異物糞便鬱積腸寄生蟲包莖包皮結石子宮轉位妊娠心臟疾患等亦招來本病焉。

漁澗之症候有次舉三種之區别。 【症候】 本病初發於七歲及至二十歲之間。

甲重症 癲癇

(一)遠隔性前驅症來於發作襲之數日以前患者易憤怒小事輒亢奮睡眠不安健忘症呈癡鈍之症狀 本病來定型的顏獨發作。其起時突然襲來或有呈一定的前驅症者此前驅症有透隔性與直達性二

- (一)知覺性攪風瘋起種種之知覺變常症瘙痒感覺冷感心窩苦悶腹部膨滿噯氣腹鳴等但此(二)直達性前驅症又名攪風瘋大多見於瘋癇之發作以前數秒之時此攪風瘋更有次之分類。 較的稀有。 種 疾 患。
- 的波及於其他之肢部。 (2)運動性攪風瘋起筋肉之短縮攣縮或麻痺、初發時每常在同一 肢部從運動性皮質中樞之部位正規
- (3)脈管運動性攪風癲起脈管筋肉之痙攣致皮膚之蒼白與厥冷。
- 4)感覺性攪風瘋來自耳鳴耳響聲音難聽取不快之嗅覺及味覺視覺障礙等患者所現之色澤則 多有時見可恐之幻覺形體陷於暴躁。 紅色

觸發作。大抵以號叫始患者俄然亡失神識而倒此神識之亡失程度頗強當患者發作之際雖其身陷沒於 尚 屬不能自知。發作起時。顏面及全身之皮膚呈蒼白色全身之筋肉現強直性之痙攣經

此外急性眼球突出強度之結膜充血顏面紫藍色等亦因同一之理而起皮膚上亦容易出 發生脫日,骨傷等頭部筋肉之痙攣。程度頗強。阻礙頸靜脈之血行外頸靜脈現指節大之青色索狀 液之所致背部筋肉之間代性痙攣亦現顯著之全身痙攣患者輾轉反側呼吸爲不正之結滯往往 傷排出染著血樣之唾液而泡沫狀之唾液亦從口唇之間流 互相 樣之騷瘍肢部營種種 秒 接 着移 動於 始見 側方起強度之間代性關牙之音遠 間 代性之筋肉痙攣此際 運動拇指插下放其餘諸指 眼球振盪遂迴轉於肉 處 中致拇指之伸展甚為困難筋肉收縮之 即 能 聽得 出。 此 上方顏面 恐係 之舌輾轉 因嚥下筋。 筋肉 於口腔內嵌入 起間 極 度 代 傾 性煙 좎. 血。 刻 下 /力極強大。 強之 攀 頸 不 放鼾聲咽 間。 與 上 下 硾

全消失焉。 震癇發作,持續: 也。 至十秒至五分鐘之間,其後筋內痙攣逐漸次緩解而至消失患者徐徐醒覺不 自知其發 時

在強直性痙攣之時期瞳孔擴大在間代性筋肉痙攣之際則

瞳孔縮小但光線上其知覺與奮性及

反應

之如何情

狀

壞身 散 者賴 邊之 種患者於 物。甚 癇發 作起 發作 | |香放 後無幾時即程覺在發作之前覺心神爽快發作之後易憤怒帶亢奮性或發妄覺 火殺人但醒 於豐間者曰豐間癲癇。 発之 後仍 反之起於夜間者日夜間 屬不悟者此種狀態名曰 癲癇。 癫癇後狀態此狀態間亦 有亘 數日 幻

輕 症 癫癇

尤屋 始能 再行 害寒 現實癎 運動但對於發作 樂裁縫等施行 性虛神。患者之顏貌俄然變蒼白。一二秒時間之神識亡失。患者或閉其 丰 種患者起眩暈之發作。身體:時之諸徵則不能自知焉。 技時若發作之疾患則忽然停止其運 動及再現神識時經若 (眼或 瞬 干時之深 其 月或

量亦為輕症癲癇之一

曲屈或凭几以防其身之轉倒此眩暈

一發作。

亦不

外來於輕度之神識消失之發作性也

強重性及間代性筋肉痙攣者起於一二之筋肉其度弱或持續時間短神識消失之度輕者亦爲輕症

一種

丙類似癲癇症

本症名癫癇樣狀態其種類甚多

(一)行犯罪之事如壞亂風俗放火殺人等類似癲癇之徵候此時患者神識亡失所作之專醒覺後似 知 不

發作性 (一) 屢現運動機之變調如向前直走不知所至或旋轉迴環無所底止自己毫不知覺者此名疾 三)自過度之發汗而來者各機獨發汗此外尚有緩癇樣之頭痛昏睡振顫失明神經痛偏側知覺亡失等之 走性 瘌 癇。

狀亦可以消失若胸脇苦滿心下有急迫狀態脈沉實大便祕者與大柴胡揚如胸滿煩驚小便不利或胸腹之 動加時與柴胡加龍骨牡蠣湯如更逆上不安不眠者兼用瀉心湯瀉心湯一方有鎮癲之效。 食家消化力本強因侵入風邪等所致故與大承氣場同時宜減食則發作之態來自減頭重及其他之神經症 震病 患者、大概體格強壯之實證者爲多若腹大滿而便祕脈沉實者與大承氣湯此證之患者爲大

草湯之方輪已闕淺田栗園翁所著金匱要略辨正云 金匱要略中有藜蘆甘草陽之方其條下云病人常以手指腫動此人身體閱閱者藜蘆甘草場主之此聚蘆甘

以手指臂動之文義難通且方亦關諸家亦無明辨余嘗診一婦人將按其脈此婦忽齍指臂撲余膝恬然 断之色身體振振 諸家方書得黎蘆湯而用之服後吐多量之痰疾舊患頓愈 然動予診斷焉臟躁(等於歇斯的里)作甘麥大棗湯連股而不效久之加咳嗽予此時偏查 無羞

後篇 第三十九章 激耀

此黎 湯乃藜蘆甘草二味也依淺田翁之治驗藜蘆湯應用於癲癇但若用瓜蒂散吐而 不效者用聚蔗湯亦

余前年診一婦人十 心悸不眠之患先消失矣 敦年來頭重 心悸不眠。時起癲癇發作。陷於人專不省先治月經過少與桂枝茯苓丸頭重、

参照「症候與治方」第十一章。

備

子孫之親族也(中略)癎之證候千態萬狀變化無極故有五癎八癎十二癎二十五癎之目皆本於病狀而名。戴目爲癎之主證故取名曰癎云其因多父母之遺孽引血脈而發者譬諸父母患癎者其子孫必患癎且傳其也未免強解史記酷史傳有濟南瞷氏宗人三百餘家註中有瞷音間小兒之癎病也說文云癎者戴目能見也。 本間棄軒之語〕 癩之病。發於猝然因類仆之故。取其名爲澗之義未詳。行餘醫言中云癎者病發 簡

眼直視上寬口動牙關緊急水藥俱不入咽喉生閣閣之聲涎潮壅盛氣息高或吐涎沫或吐頑痰脈沉微四肢陽癎即屬急病卒然量倒人事不省四肢搐搦經看護者之扶摸反致躁擾口眼喎僻鼓頜股栗一身無處不揺統而言之總而括之不過陽癎與陰癎之二證耳 微冷須臾發熱出汗脈浮大搐搦亦止反覆欠伸如睡眠中高喚纔應欲醒不醒醒則復發幾回

陰癎即 緩證也發於身體之一部但發一證不發諸證即諸證備者來時亦甚緩慢(中略)

中則卒死故藥汁宜徐斟酌用之欠伸而精神回復發熱出汗脈浮數者抑肝散或加羚羊角爲宜虛里之悸動連湯或加熊膽或與回生散口噤不能入築汁者可從鼻注入凡人事不省之病人會厭不蓋氣遠飲食誤入肺 精神較後尚屬恍惚或驚或怯或妄語或不寐或瘈瘲不止者可用三黄湯加辰砂柴胡加龍骨牡蠣湯大柴 卒倒而牙閥緊急四肢搐搦人事不省墜地如死脈存胃氣者必能回生先用三黄湯(瀉心湯)或參

胡湯加羚羊角侯氏黑散羚羊角等

屢衝於心下欲死者用苓桂朮甘湯或三黄湯茯桂甘棗湯奔豚湯等凡癎病用寒涼鎮墜之藥後氣逆眩暈頭暈未止心下痞鞕欲嘔吐涎沫或暖氣多出者用半夏瀉心湯加茯苓有神驗虛里及臍旁之悸動亢進逆氣屢 項強四肢瘈癡或麻木或不遂或攀急或精神恍惚或憂鬱或悲傷或喜笑等之證在苒久久不愈者犹香天麻 卒然口眼喎僻微腫變色者宜刺以去敗血或刺其絡且與涼膈散但喎斜而不腫者羚羊角焉宜熱已解而

生姜也。黄朴消甘草連翹梔子黄芩薄荷藥也沉香天麻湯者沉香益智天麻防風半夏附子獨恁羌活甘草當歸殭蠶,黄朴消甘草連翹梔子黄芩薄荷藥也沉香天麻湯者沉香益智天麻防風半夏附子獨恁羌活甘草當歸殭蠶,回生散者香附子紫檀人参白檀鬱金甘草胡椒也抑肝散者柴胡甘草當歸川芎茯苓朮鈎藤也淚膈散者大無癰之症候。但日夜喜笑不止者是亦癎也甘麥大棗湯爲宜。

傷寒類方〕 柴胡加龍骨牡霧湯。能下肝膽之驚痰以主治癲癎必效。

[惠美寧酉] 一男子頭與兩手振掉不止已二三年腹中無異飲食亦無異常余思此仲景師之所謂四肢轟

聶之類也與以防己茯苓湯而愈

(腹證奇麗) 癲癇吐涎沫見水而發者五苓散主治之見火而發者黃連湯主治之。

第四十章 神經衰弱症

本病發於神經系統之病的具奮及 倦怠。

遺傳在本病之發生上大有關係此不獨為本病之遺傳即如其他之中樞性宮能的神經病或器質的神經疾 患凡家族中有此 疾患者往往遺傳而生此疾

後篇 第四十章 治經衰弱症

素因

者也

先天性 中亦有本病之素質例如兩親爲大量飲酒者或受胎之際罹重篇之疾患者此等小兒即享受有

注意濫行手怪等是 但本病大多為後天 性疾患幼年期已有本病之基礎者例如在學校中因精神過勞過劇之名譽心體育之不

慢性疾患尤其隨兼以津液之亡失者亦爲本病之原因內臟下垂症亦屢屢誘發本病此外因頻繁之分娩長

如局處的職器疾患之狀而致本病之存在者。 久年月之授乳亦能喚起本病 本病之症候或俄然而來或漸次發生逐日而增加其劇度有時因主發於一二臟器之神經症狀

當行之時露 次增劇其度以後遇催微之精神勞動即感疲乏漸致患者憂慮自力之微弱勇氣失喪嫌忌精神的事業或在 內搏動頭痛等。思考力減退對於事物。乏深思熱慮之力。讀書之際對於書中意義不能瞭解。由此等之症狀衝 本病必發之症狀。爲腦性障礙此之謂腦神經衰弱症患者在精神的勞動之際容易倦怠感頭內朦朧頭重 恐怖與奮及發汗等眠睡大受障礙就轉後不容易即睡即能入睡而時間甚短且睡中屢屢襲來

不安之惡變

的障礙時則愈益增加其恐怖之念此外屢屢見瞳孔之不同。但對於光線之反射作用則存在大多反比健康 抱「莫非是重篇之脊髓疾患乎抑脊髓痨乎」之恐怖。如遇四肢之知覺異常或膀胱及生殖器機能之神經 脊髓性症狀,亦屢屢見之患者脊柱全部或一局所之疼痛。但雖敲打或壓迫不發見其壓點此種 頭內朦朧及頭重成爲久持性其進一步則頭目眩暈往往陷於恐怖狀態 過敏症又往往有薦骨部上灼熱之感者此外少數之患者有感驅體之周圍有帶狀之感覺此種 狀態名曰 思者。往往

膝蓋腱反射大多亢進但有時則減退甚或消失。

脈管 皮膚知覺變常症亦往往現之尤其多為蟻行感覺冷覺刺衝性疼痛灼熱等。 有冷汗。此外更招胃液分泌之障礙見分泌過多及鹽酸過多尿利亦大多增量,其色透明稀薄,比重亦 運 動性及分泌障礙亦為屢見之症候著白及潮紅相踵交發頗爲急速又有發汗之傾向握其手掌。 低。 往

耳鳴耳響難聽眼火閃發視力減退亦爲屢見之症候

皮膚知覺過敏症及亡失亦爲頻繁之症候患者展覺筋肉疼痛步行不安容易蹉跌或在步行之際發劇

疼痛因此故欲久時就釋此即疼痛性無力症也

神經性消化不良症即胃部訴不快壓迫之感起胃痛惱胃部膨滿頻發變氣顏面著潮紅頭 患者又有食思缺乏或反之罹善飢症此外在攝取食物之際。頗有不快之感覺持續於全消化之時間。 內有充血及搏動 甚至現

之感此外眩暈心窩苦悶心悸亢進等。

腸機能亦瓊障礙腹鳴鼓腸便通不整

此外患者有咳嗽刺戟喉頭之瘙痒感覺及疼痛有時發痙攣性失聲症或兼喘息樣發作 尿中含有多量之 燥酸鹽。呈所謂燐酸尿之狀患者多數因膀胱 知覺過敏排尿之類 數或反之感利尿 困

生殖器亦及 因膀胱壓縮筋衰 外訴精神的陰萎精液漏攝護腺漏等。 見障礙症狀或患者色慾之亢進而交接之後心身又甚覺倦怠或恨 一騎括約筋因痙攣性收縮之故若括約筋麻痺則起尿之 /淋瀝。

遺精。

有時患者陷於色慾亡

覺抵抗甚少。 患之症狀爲頭重耳鳴心悸亢進眩暈波勞倦怠不眠食氣不振等胃中必有振水音之證明獨 人日常遭遇最多之神經衰弱症爲胃疾患尤以胃內停水即胃阿篤尼症胃下 抵抗 低 無 力, 屢見腹筋之拘攣與 臍下之動停水少而頭 眩心悸甚者茯苓桂枝 垂 症 為最 多此

後編 第四十章 神經衰單症

术甘草湯爲宜予數年前得左舉之治驗

作甚激身體摇摇欲倒不能步行之狀態者居多暫時在夫之任地佐世保市不思歸鄉乞余診診時有胃之下神經衰弱症。(兼有胃下垂)佐世保市高木口口子(二十七歲)主證發作時襲來頭重與眩晕約三個月前發 术甘湯分五日服之此後即不復來院一個月之後遇其母於途詢之已全愈矣(錄自古醫道) 垂症,振水音著明、從證與苓桂朮甘湯分五日服之。服後尿量隨病之輕快而增加第六日步行來院,更與於

下痞鞕腹中雷鳴。食氣不振便通不整之狀不眠精神不安者與甘草瀉心湯又腹部膨滿煩驚心悸亢進不眠若胃部膨滿噯氣食思亡失頭重心悸眩暈不眠等之症狀者與茯苓飲或其中用苓桂朮甘湯之合方又若心

吞酸嘈雜等之症者與柴胡龍骨牡蠣湯。

咳嗽刺戟喉頭有瘙痒感覺及疼痛或失聲症者與半夏厚朴湯。

柴胡湯治陰萎余亦饭之用大柴胡湯以救頑固之不眠動脈硬化症之原因呈神經衰弱症樣之症狀者應用 精者可用桂枝加龍骨牡蠣湯八味丸當歸芍 藥散天雄散之類陰萎者亦選用以 上之方劑森立之翁用大

梔子豉湯瀉心湯類者最多此不眠之治法可參照「 症候與治方」第十一 章。

金匱要略中百合狐惑陰陽毒病證治篇中百合之病。古來說者甚少使用其中之方者亦稀今就百合病觀之

就狐惑病觀之狐惑之病狀如傷寒之默默欲眠閉目不得起臥不安不能飲食聞食臭而惡其面目乍赤乍黑 論曰百合病者百脈一宗患其病致之也意欲食復不能食常默然欲臥不能臥欲行不能行。

乍白。蝕在上部則聲嘶。 上二輪爲百 合病狐惑病之症也其病象類似今日之歇斯的里神經衰弱症稀撲孔豆里之病。

備考

類聚方廣義〕 稟性薄弱之人色慾過多則血精減耗身體羸瘦面無血色身常微熱四肢倦怠脣口乾燥小

腹弦急胸腹動甚迫甚熱不死何待若永服桂枝加龍骨牡蠣陽嚴慎圖房之事保面調攝庶幾可以骨肉回生 惟有待死而已。

第四十一章 歇斯的里

時亦見之 原因 本病爲世間人人可知之疾病往時謂僅婦人發生者誤也本病大概發於春機發動期以後有時

病。本病往往現遺傳的疾患或與其餘之神經疾患併發其他如精神的與奮心身之衰弱諸種之中毒亦誘發本本病往往現遺傳的疾患。或與其餘之神經疾患併發其他如精神的與奮心身之衰弱諸種之中毒亦誘發本

被其侵襲患者若能有除去本病疾苦之意思即能見本病之治愈故以本病爲基因於大腦皮質障礙之定論。 見解頗爲正當云 【症候】 本病症候之發生上有緊要之關係者為病的觀念故本病並不現存唯由想像而起尤其意思屢屢

運動障礙中可記述者曰歇斯的里性麻痺歇斯的里性痙攣及歇斯的里性短縮。 之症狀。往往或忽隱沒或忽出現一時看去爲頗重篇之變狀而在瞬息之間或消散或輕快。 及麻痺徵候其起時或祇一二之障礙或汎發全般之障礙至強弱頻琼等等則千差萬别渺無一定尤其此等 本病之障礙起於諸種之神經範圍運動性知覺性脈管運動性營養性分泌性感覺性精神性症狀現其刺戟

多極無一定又屢屢見眼險痙攣點頭痙攣搐搦性痙攣此外患者緊扼感覺從胃部或下腹部上行此恐係起 或由於膀胱括約筋麻痺而成冰應至間代性及强直性筋肉痙攣亦屢屢見之其範圍持續及强弱則類别甚 球筋之麻痺桓稀而喉頭筋肉之陷於歇斯的里性麻痺者則甚頻繁此外或由於膀胱壓縮筋麻痺而 歇斯的里性麻痺。現偏癱狀或現截癱狀或現單癱狀又有偏癱中麻痺一側之知覺件以失亡者顏面筋及眼 來 (帰尿。

後篇 第四十一章 歇斯的里

筋肉之上行性痙 學故名曰歇斯的里球此為診斷上重要之症狀

筋肉 知覺障礙 層神經之 人因項部 失云, 短縮。 筋之 在上肢特現於屈筋下肢特現於伸筋此 爲本病頻繁之症狀就 解剖的區域不合致或來於肢部之球狀或帶狀或胃及全肢或現其半側此名歇斯的里性 向偏側短縮致成斜頸之病舌筋之 中以皮膚知覺亡失爲最多此皮膚之知覺亡失或限局於 向偏 外亦 側短縮致成舌之傾斜背筋之短縮見脊柱之屈曲: 有現咬筋之短縮者。此之請歇 斯的里性牙 一定之部位與皮 聚

覺亡失而 中央限局性之寒冷者此名歇斯的里 **屢現神經痛或諸般之知覺異常症而顧項骨之中央亦往往發生疼痛此之謂歇斯的里性頭痛** 皮膚知覺 卵巢 過 喉頭粘膜之呈知覺變常症者亦不少焉因此之故致成歇斯的里性咳嗽及歇斯的里性言語 部為最頻發之局部 一致亦屢屢見之此亦與皮膚知覺亡失相伴而來或代之而來而在限局之一點知覺 所謂卵 巢痛 卵云粘膜之來自知覺障礙者亦甚多尤其最頻繁者爲咽喉粘 者 是也此外 脊柱亦發限局性知覺過敏尤 巡 頸椎、 及 其或 遏 胸 有頭 膜 之知 困

粘 閉症此際則嘔吐多量之水樣物以代償之吐物中含有多量之尿素反之或在時整色浮腫來於上肢者尤多所患肢部呈青藍色如浮腫狀之腫脹排尿則數 運動 其尿 膜之出 如水 液性下痢及膜樣腸炎有時因皮膚之血管破裂致溢出 性及分泌性障礙中可記述者為皮膚之蒼白色及潮紅並所謂青藍色浮腫及唾液分 血現歇斯的里性吐血及喀 樣之稀薄比 重甚 輕此之謂痙攣尿此外由於胃腸粘膜之分泌障礙而成胃液分泌 血者。 「血液各日血杆此外或發香 僅少時日之間排 日間全閉 此 汗症 名歇 妼 汤 或 過 洩多 斯的 多症、 多排 及

器能障礙中尤屬屢見者爲視野

縮小就中對於綠色之視野狹小最為頻繁或來色質、

弱視及黑視

往

往

煏 側有時來偏側之難聽或耳聾或耳鳴耳響耳躁

覺過敏症嗅覺亡失症嗅覺錯誤症味覺過敏症味覺錯誤症及味覺亡失症此外有時見喘

心悸亢進呃逆噯氣胃痛腸痛腸鳴鼓腸等

精神異常亦屢屢見之患者甚易與奮或反之其性遲鈍呈無慾狀態

之筋肉運動或有數年間臥於病狀而不步行者因步行時有劇甚之疼痛也此症名曰疼痛性 本病症候之發生上最緊者為意思之缺乏即患者或不直立或不能步行或欲行而不行。但臥時頗能 三無力症。

夫頻疎之分。甚無一定。其狀類似癲癇發間代性筋肉痙攣。然與癲癇之發作有異,其神識不亡失。不過稍稍朦 此外應特書者爲筋肉痙攣之歇斯的里發作。此名之曰歇斯的里性癲癇此歇斯的里性癲癇之强弱持續與

臘而已。

【療法】 朴湯非治歇斯的里球而治痙攣麻痺者也對於歇斯的里性言語不能症歇斯的里性喘息歇斯的里性咳嗽 上之症狀而不能步行。且以上之症狀互相出沒數年之間醫治無效與此劑收神效。 歇斯的里性發汗過多歇斯的里性唾液過多歇斯的里性嘔吐等均得治之余卿里中有一農家之婦人患以 本病症狀雜多旣不統一亦不連絡從證用藥亦不遑枚舉茲僅能舉其日常多用之方劑如半夏厚

其次爲甘草瀉心湯、此方從金匱要略狐惑病之論運用之

此外如苓桂甘棗汤甘麥大棗汤奔豚汤之類可以預防歇斯的里性癲癇歇斯的里之發作與根給

参照「症候與治方」第十一章及神經衰弱之條

赤痢

本病主流行於亞熱帶及熱帶地方特徵爲腹痛裏急後重排洩血樣之粘液便爲傳染性之大腸疾患 第四十二章 赤痢

或赤痢菌之繁殖 本病因 食未熟之果物而誘發者往往有之但如此攝生之過失雖不常發本病然實可助長阿米巴

方以指插入肛門時肛門括約筋為痙攣的收縮覺有絞扼樣之感此際患者有劇烈之疼痛此外在排便之際。微大多不足一食匙便通之際大多以腹中之雷鳴與下腹之刺痛為前窮檢視肛門其開口往往深陷沒於內 赤痢症狀中最重要者為便通及糞便之性狀患者之便意頻繁襲來往往一畫夜間便適達八十次乃至一百【症候】 本病之潛伏期長短不定但大概在一週間至重篤之症則其期甚短 次加之強激之便意窘迫之感覺患者身體有不能離便器之狀態此狀態各日裏急後重但每次之排便量極

腸內容物觸於括約筋上有疼痛難堪之感

之粘液境此外發見蛙卵或膨脹之砂吾米類之粘液塊一日中粪便之量達一立,其大便漸次失糞臭放類於 赤痢之糞便甚稀薄但初期往往雜以非常硬之糞塊加答兒性赤痢在粪便中屢屢有血點或在血緣見混在

精液之臭氣。

便呈帶黑色放腐肉樣之惡臭。 壞死性赤痢其糞便含有多量之血液或類似赤肉之水性浸出液或見纖維素性肺炎之鐵色痰之樣有時其 化讓性赤痢。在粪便中見有讓之混在其農中屢屢有黄色之碎屑及斷片放置於便器內則沉降於器

體温在疾病之初期。昇至三十八度以上或三十九度大多經二三日,其熱始解但須持續至一週或一週以上。

始復平温脈搏頻數。

颜面早枯瘦眼目带灰色之陰影狀舌乾燥生舌苔口中發惡奧此外食慾亡失同時口場增進往往惱噯氣惡

腹部則其初屢屢膨脹但漸次陷沒觸診至左腸骨窩2字狀彎曲之部覺一致之壓痛且每常證明有硬固之

索狀 様之 腫塊此腫塊在初期為有痙攣性之收縮腸管經日則有浸潤之情形者為多,

赤痢在數日內或二三週內即可治愈但亦有移行於慢性赤痢者。

阿米巴性赤痢大多排洩焜在暗紅色血液之液狀便通常為慢性之經過。

赤痢之倂發症可分二類一為直接從腸之變化而起所謂有局處性者也一則起於發炎病素侵入透隔器官

所謂赤痢轉發症者是也。

一)局所的併發症有限局性或廣汎性腹膜炎直腸周圍炎完全直腸瘻等。

一一)赤痢轉發症中其最頻繁者有肝臟膿瘍與多發性關節炎在阿米巴赤痢之際肝臟膿瘍尤多頻發此

除發生於赤痢病狀之際外在赤痢病治愈後始見有時與肝臟膿瘍同形成

讓其結果起全身腐敗症或關節之強直此外現耳下腺炎神經炎脊髓炎亦赤痢中之經過也 多發性關節炎大多類似急性關節洛伊馬基斯在種種之關節上起腫脹灼熱及疼痛有時一一 一關節上 一來化

【療法】 之際觸於S字狀彎曲之部屢屢有一致之便固之索狀物對於壓多過敏者此際與桃核承氣揚能緩解窘迫 發病之初期與葛根湯務丁寧使其發汗,可奏意外奇效裏急後重肛門括約筋有痙攣的收縮傾向

的症狀

氣惡心嘔吐者運用小半夏加茯苓湯小半夏湯加黄連生姜瀉心湯之類 者與白頭翁湯病勢進步見粘血便或膜血便身體疲勞而猶裏急後重不止者與白頭翁加甘草阿膠湯若嗳 口渴口臭舌現黄苔而乾燥心下痞鞕胸脇有苦滿之狀者用大柴胡湯。全身有熱感尤其肛門灼熱裏急後

備考

件發症之治療甚多多照各疾病之條下。

大勢挫後從證選用小柴胡湯小柴胡湯合三物黄芩湯黄芩湯甘草瀉心湯人參湯之類

後篇 第四十二章

赤纲

易脫大人亦比他病亦早露疲勞其初邪氣著腸用發表之手段可取全效凡有惡寒脈俘數等之表證者其先但大便不出唯見如為如眵之腸垢與血交下或竟下血舌上出白苔或竭或嘔而無食思小兒經二三日腹力 (本間 頻 服萬根湯其次與黄芩湯加萬根黄連即黄芩湯與萬根黄連黄芩湯之合方也此於治熱痢有奇效下痢漸 最初惡寒發熱脈俘敦腹中痛水瀉下痢及五六次忽現裏急 後重不快利之狀數 上

香但不及大黄爲有效耳(中略)而用合璧飲保命集及温疫論所載芍藥汤感證集腋之檳榔順氣湯均可選用之裏急後重者不妨加檳榔木 次多腹痛些稍見脫狀者選用桂枝人參湯或逆挠湯 納之。後忽脫此症世稱疫痢實别於普通之痢痢之重症者也傷寒輪下痢膽 廟裏急後重甚。離廁則便意來甚或長居廟間不欲相離,所下者皆係濃血腥臭如經蝕。遂致脫肛不納強 痢·舌不生苔。但痢(赤痢之愈)有白苔或黄苔,其毒疾者。見黑苔或: 乾燥欲裂或譫語腹微滿 語者與小承氣湯。其先宜蕩滌之 而

每日發潮熱渴欲飲水不思食物或乾嘔或不能飲苦味之藥小便與大便時同出外此別無小便且澁滯 快 急痛裏急後重甚者與大柴 胡湯。 而 不

經日熱 樞,林 赤 熱巴下下痢亦從減但下多膿血似臟毒者傷寒所謂便膿血桃花湯之證也可用干金之大桃花湯或春者。柴苓湯爲宜前件諸證俱備且腹微滿而急痛裏急後重甚者與大柴胡湯 脂湯爲宜患痢數十日熱旣解唯下痢不止者真人養臟陽爲宜或與補中益氣湯間服阿

冷諾證 不 ,止此時若與縊藥以止其下痢所得大害爲必然之事却宜報以下 拔病家思欲早早制止買服調痢丸痢病丸居兒丸等之鴉片劑下痢雖立 並起至於死者往往 有之續瘍科祕錄辨其害云痢毒者腸數數下痢有如然疾小便 劑除去其毒則下痢亦從而 止。但卒然 頻數掃除 腹臟 嘔 吐

子理中湯加當歸龍骨牡蠣芍藥去粳米也補中益氣湯者小柴胡湯去黄芩半夏加白朮當 病之脈狀故不忌浮數末期之浮數者陰虛證也(例如四逆湯輩之脈狀故忌之)細數者不可爲也病 也春林軒之赤石脂湯者其中加 散者。小承 疝 輪日。脈沉弦者下重之候也。沉弦者內中積滿之候也通例下痢之脈常微弱今見沉弦者病毒積滯之故也故 不沉實者善候也萬病均以脈爲目的其中尤以痢疾須以脈爲標準故此病如見惡脈斷不能視爲輕症 樂甘草湯 有持桂里之說〕 癖亦見沉弦之時內有毒也疝亦有下痢之症者有下重也是以虚極之症亦有下重者施治得見功效雖似 湯者桂枝人參湯合茯苓飲去橘皮也合璧飲者小承氣湯合黄芩湯也保命集之芍藥湯爲 下重者。畢竟爲陽症也。 氣湯中之枳 加枳實當歸木香檳榔温疫論之芍藥湯為芍藥當歸檳榔厚朴甘草生姜此中或加大黄檳 痢之初發不忌脈之浮數但痢之末期則忌浮數(大塚日初期之浮數者表證也有太陽 實代以檳榔加芍藥也柴苓湯者。小柴胡湯合五苓散也干金大桃花湯者桃花湯 石脂也養臟湯者。芍藥當歸人 多白术肉鬼肉桂甘草木香蚵子 歸陳皮升麻、 馮 合附

陰 痢 入於醫者之手。凡嘔吐而又下重者。十中能救二三此症北尾春園諄諄告人不宜用附子而宜用白頭 症 而 m 嘔 吐雖極虛者亦多得治。 因嘔吐亦起於內中有毒故也虛極而嘔吐但不下重者是爲不治之症病人

或用

桂枝湯 世之 脈 初起有發行者有不發行者發行者之中。有桂枝之症有萬根之症豈能一律局定一方故發行者可從太陽 刀圭 浮云云之章可下者可本少陰病自利 一者流遂誤會其旨對於痢之初發者,輒不詳察其 吾邦(指日本自國)近來行古醫方者對於痢疾有專用萬根湯之趨勢自謂已闡明醫道。 清水云云之條治之 脈症無方不用萬根湯矣此實可謂疎忽之至蓋此 此 說一起

痢疾 發熱少腹痛強 第四十二章 一者。用桂枝加大黄湯為宜若熱強而腹亦痛者用萬根湯為宜又萬根湯之輕為 赤匑

熟度增強自汗出不惡寒腹稍痛脈甚者用萬根黄芩黄連湯焉宜表症解後病情較輕者用黄芩湯加大黄黄 連爲宜中脘循覺有物如滿之氣味者用厚朴七物湯若或心下強痛大便中交下赤色之物時用大承氣揚爲

宜。 痛但下瘀物者用當歸四逆湯。著又有因於瘀血者其腹痛與平常異往往痛於少腹(下腹)污物呈紫黑色此病以桃核承氣湯焉宜腹中不以上焉陽症之要訣至於陰症方面則用真武湯附子理中湯之類在用真武之時根可兼用神丸功效可以早 若用葛根湯後脇下痞鞕滿者用大柴胡湯倘熱不解時用柴胡加芒硝湯便血甚者用黄違阿膠湯服後猶不 痢疾大抵有毒在毒未盡時切不可用神丸(阿芙蓉 木香 黄連 止者與桃花湯若便糞如濃者黄芩湯為宜又有一種熱強而不渴者此乃白頭翁湯之證非用下劑之症也凡 乳香 沒藥 沉香)須待毒盘用之則佳。

桂枝人多湯 初起泄瀉(見症候與治方第三章下痢之條)與痢疾混合或泄瀉一兩日遂下膿血之痢者用

此方甚宜 萬根黄連黄芩湯

黄芩汤

黄芩加半夏生姜湯

河間芍藥場(黄芩湯去大棗加當歸

黄連湯 此方以腹痛而有嘔氣爲目標此腹痛之部位從心下至臍上

黄遮

木香

檳榔

官桂 大黄)

半夏瀉心腸

参連湯

蘗皮汤(黄柏 梔子 黄連 阿膠)(又一方中加烏梅) 此方應用於膿血痢之熱甚者

白頭翁湯

白頭翁加甘草阿膠湯

大柴胡湯

四逆散 用大柴胡湯後熟勢大挫。但循腹痛拘攣者。用此方甚宜。

厚朴七 物湯

調胃承氣湯 三承氣(指大小調胃之三承氣湯)之內制裏急後重之力以方爲最大柴胡湯白頭翁湯之症、

窘迫已愈者用此方最宜,

大承氣湯 此方正面之主治比於厚朴七物湯。但無外症而腹滿強者用之腹滿強亦痢毒之愈甚者也。

大承氣之腹痛在上痛不甚劇亦有在少腹(下腹)者非此湯所主治也。

下痢已差後更經年月日而間之後發者,大抵此湯之所主治也此外休息痢而有腹候者亦此湯之症也(休

息痢者病愈而復發發而愈愈而復發之病也

桃核承氣湯

大黄牡丹皮湯

桂枝加芍藥湯

小建中湯

錢氏白朮散 者早用白朮散爲宜

(人参

白朮

茯苓

霍香

木香

甘草

萬根)

小兒之痢大半解而不令解口乾而遏

桃花湯 皮湯白頭翁加甘草阿膠湯陰症適用桃花湯 此方用於滾血痢之久久不止便有讓血小腹痛者爲宜此濃血痢有陰症與陽症之别陽症適用躁

第四十二章 赤痢

久則成陰症之 狀其痛在大腹者用理中湯四逆湯白通湯此際不可用赤石脂再餘糧湯之類又曰久而

腸不滑只下真之膜血者桃花湯之正症也

但有下重)又遺屎者(遺屎焉十度中之二三度)亦以止後重遺屎焉宜大概陽症中多赤物少白物裏寒而 下重雖亦有裏寒症但可決爲概係熱症亦有痢中始終不痛者此時以逐毒爲宜逐毒而下痢止亦不後重

用赤石脂之時則交下白物者焉多此名滑腸不後重也。

恍惚欲上便器而已不自覺其遺屎者倘越三度以上即為真武四逆之症矣。不同)凡痢疾泄瀉之遺屎十度內不過一二度倘越三度則非陽症是陰症也且此亦不限於痢凡熱病下痢。 真武湯 武勝證之一二例者或遺屎者多爲此方之症遺屎無陽症(中風癇等陽症之遺屎因身不自由而 此方運用於痢疾而具種種陰症者。凡自利而不自覺其下者或小便不便脚上有匯氣者痢之見真 致與此症

自後恰如產後之舌而有滑澤此舌如見竭者。極惡之證也是故痢疾應知舌之白乎黄乎抑爲黑乎而決定其 (武之證有舌證其舌十之七八有純紅痢疾遇舌赤者惡證也)初起即有是種狀態者必至危險其狀先淡紅

吉凶。

白通湯 如陽症之下魚腦體或輕之膿血。凡無此者可與此方。此方對於下物之色之目的甚宜而於產後之痢尤宜自 ·連丸(黄連 木香 肉豆蔻)此方能止腹痛有除後重之力。 《翁加甘草阿膠湯症也此方對於陰陽合倂之症也。俱於產之痢疾有特效。 真武陽不效。益近於脫症而下痢循不止即如神丸或赤石脂禹餘種之類不能治者與此方有偉效。 乾姜 當歸 阿膠)此方對於痢毒未盡而成陰症裏寒者用之爲宜大體陰證所下之物亦

紫丸(紫圓)

以上為桂里爾痢疾輪之大略自古以來對於治療痢之學說言者甚多予信桂里爾之諸說最為劃切故不厭

其煩。詳爲引說雖方之取舍選擇視乎其人然苟能熟察翁之所說達痢疾治療之與義予敢信其決能奏有效 之途徑也(大塚)

或濇浮而大按之空虛或乏學按之力者有此湯治之。 艠治準繩] 仲景之建中燙(指小建中湯)無赤痢白痢舊新之區别但治腹中之大痛者有神效其脈弦急

迫之甚者。甚相宜。 〔入門良方〕 小承氣湯對於痢之初發積氣甚盛腹痛難耐或不脹悶裏急後重度度入置(順)而不快通窘

[名醫方考] 不能血行腹痛甚而欲死者。急此方攻之。 桃仁承氣湯實焉痢疾初起主治之藥或其初已失與下劑之時期反用收斂之藥致邪熱內蓄

[外臺祕要方] 魏氏家藏方〕 赤痢或白痢日下痢敷十行者不問老人小兒以甘草一味水煎頓服之焉宜。

各方面無處不呈虛證後重比之邪實之證且甚之糞中向無臭味此爲虛實分别之大概但邪氣之中因元氣 致成腐肉痢之虚瞪血亦隨之而多下。此極虛之危症也其外證亦手足厥冷好熱湯與冷物脈勿論已即其他 思大便中下腰血之點滴者非腐肉痢之下地平輕者桂附之中加相當之劑重者與温補劑決無所用其疑焉。 虛而下赤肉者其時必從邪氣之脈而不見虛脈此時世醫往往難辨虛實遂用錢氏白朮散以敷衍之抑亦不 不知爲痢病正面通治之法也腐肉之痢者大腸中之氣邪不下則元氣虛脫大腸之內皮因之而腐其肉下落 是證宜用傷寒論之白頭翁湯或芍藥湯或芩連湯等涼劑去邪之品味以去其會集之腸邪此則無論何人無 邪會集於大陽下青白等之穢物外證不熱脈實而數口渴舌有苔有種種之實證入廁必若於有後重之氣味 (津田玄仙之說) 類聚方廣義」 二宜丸(甘草乾姜湯)治赤白痢有效以蜜丸服之 痢疾有大熱腹滿痛如錐刺口舌乾燥或骨舌破裂大便一日百數十行或便中交下膜血者。 痢疾中有邪實之痢腐肉之痢二瞪之分至爲緊要苟不知此點決難無過邪實之痢者諸

築四十二章

赤筋

大承氣湯主治之

熱之時,用之即有效故少陽篇之桃花湯條有從二三日至四五日云云,予用桃花湯並不用湯,而用散樂以白 湯吞之少陽病等難用附子之症每煎用真武湯而兼用桃花湯之散云桃花湯方之命名其義有二一因此方 **暨夜十行或五六七行。甚者便濃血之人而便血赤石脂亦有大效桃花湯在痢病之始發熱甚時間不用之半** 桃花湯有用於痢病之心得有裏急後重螿夜六十行之症用此湯後翌日便膜血止呈水瀉

寒下之劑如大黄芒硝性寒而下達之劑也 [時透讀我書] 痢疾之渴者大多好飲極熱之場此際用寒下之劑爲宜至欲熱屬陰之旣可以不拘。 所煎之湯其色似桃花一則因赤石脂一名桃花石之故

荢足逆冷。手尖冷者熱證也陽脫於上熱痢下而不下。虛極者必手冷至肩足僅不過踝。此證宜用温補之劑。 登治摘要) 痢下久久不愈心中悸煩趴不能睡便中不混膿血者黃連阿膠湯焉宜

痢疾已久腸中裏面之外皮腐爛下赤白如魚腦之痢者。速與大黄牡丹皮湯或薏苡附子敷醬散。

第四十三章 霍亂

亂治略。編於此編其中有乾霆亂者乃腹痛煩悶而不吐下之症也本章則就吐瀉焉主徵而旣述之。 霍亂之主徵爲急性吐瀉其狀疑似虎力拉本病或爲傷食之一種或有暑氣侵襲之傾向本尾臺榕堂所著一 本病大多在酷暑之候從飲食之不攝生而誘發本病之病原菌不明。

四十次,所吐之物及粪便與虎力拉之物無甚區别因之患者呈重篇之虛脫症狀皮膚厥冷被以粘稠之冷汗。 悶及嘔氣等打破睡夢腹部感雷鳴及疼痛頻發下痢病勢增加則起數次之嘔氣數小時之內達二十次乃至 本病現於俄然之間有時以全身倦怠食思不振嘔氣等焉前驅本病大多起於夜間患者因心窩苦

筋痙 鼻梁 學之苦體力尙存者其煩悶之狀實不忍卒觀其痙攣與虎力拉之情形同發於腓腸筋者最多尿 隆起 眼球陷沒至呈所謂虎力拉性兔眼脈搏頻數且細小心音幽微此外患者有極甚之煩竭有掣

其量甚至有時 量增虚脫之狀 本病通例 加皮膚 厥冷之 常三二十四小時至十八小時之持續吐瀉漸減其度口渴止皮膚復平温筋痛消失脈 閉止。 度亦增脈搏益益細數心音不能聽得遂至死亡 態消散。反之。至致死的轉歸者,則吐瀉亦止但患者發現不快之呃逆煩悶其虛脫之狀愈形 博復 故利 尿

管之弱將遇勁敵未及一 下者。皆為劇之症也其腹痛者乃正氣排斥邪氣邪氣相距故發痛也不痛而暴下者邪勢甚劇正氣不能相持。 其初腹痛 一三日或四五 戰即棄戈曳甲而走也 日之間。日日行三五次之下痢者。大多無甚大患可以治愈腹不 痛 而 渐暴

用萬根加朮湯自能恢復 萱鹊者宜叮嚀病人喻其速發大奸若巴見嘔氣者。葛根加半夏湯中用加倍之生姜發汗可愈毒不甚者始終 不甚者可自由施行後之措置盖此病一發嘔吐即不能納藥用盡心思無適當治法故往往死焉故在初期中 初期中不論腹痛寒熱之有無如見其機宜早用葛根加 **术湯温獎之使一分發汗則嘔吐不發若嘔吐** 已

吐不止 苓澤瀉湯等冷服之嘔吐極甚而不止者。先用小半夏加茯苓湯、生姜半夏湯等冷服之。使止嘔吐。最爲緊要嘔子前證而發熱惡風。四肢情痛者用桂枝人参湯下痢發熱口舌乾燥渴而好冷水。或飲後即吐者用五苓散茯 發汗後下痢不止心下痞鞕腹痛 樞關元等穴數數以艾灸之炷大爲宜其灸以腹內温胸膈鬆開嘔氣亦止爲度又嘔甚而心胸、 但對於適當之主方無用或嘔吐不止下痢甚一切藥汁均不能入者用温 兼 用烏梅園 爲 宜下痢甚且嘔腹中水鳴或腹痛小便不利四肢冷或有攀痛者真武加半 而 小便不利好熟飲者用人參湯下痢甚四肢微冷或惡寒者人參湯中 石温 其腹部腰部在神穴天 悶挾蝈蟲者。 加

第四十三章

程亂

諸症 漸 自奸 胸之 次退者回 加 小 氣閉。 呃逆 塞者與白虎加人参湯前證中加乾嘔痰喘或呃逆者竹葉石膏湯焉宜吐藥者冷服納之諸(生之機也吐下厥冷漸減。心胸中發煩熱竭而好飲冷水者,用石膏黄連甘草湯白虎加桂枝 乾嘔煩躁甚或發呃逆者通脈下涼轉筋益甚厥冷過臂膝精 之合方爲宜下痢 小便不 利 者茯苓四逆湯 **深止** 一厥冷煩躁 通脈四逆加猎膽汁湯焉宜此證 爲宜此證亦多死。但用此方後若小便通利。大便之 神 衰弱脱汗如綴 四 肢轉 腹拘攣面色青肉 珠。 細微 多死. 或沉 税。 若下痢與乾嘔均止厥 伏不見者用 凹 聲嘶 通 者。 四 脈 /色帶黄味。 四

胡湯此病對於腹中凝結阻滯宜早疎利腹中和則下痢自止譬猶表證者用萬根加半夏湯以發汗則嘔與下用桂枝加芍藥大黄湯反能快通而止下痢若寒熱往來胸滿嘔吐心下痞鞕腹中拘攣或腹痛下痢者用大柴初起發熱身體解情腹痛或拘攣微利者是無大患用桂枝加芍藥湯温被覆之使發汗可愈腹中結實而痛者,方皆然若胸腹鬱熱吐渴均甚且煩躁者與冷水則煩躁能穩嘔吐能止, 翔自止] 同 理由。

嘔而 鴻心湯口渴 心下落鞕腹 此病之常態能審寒熱虛實選用甘草乾姜揚附子粳米湯吳茱萸揚黄連而不嘔吐便血不止好飲冷水者與白頭翁加甘草阿膠湯焉宜 中雪鳴。 下痢或下 痢中雜血者與半夏瀉 心湯嘔吐劇 者用生姜瀉心湯心煩不安者用甘草

湯焉宜 嘔吐下 再用本 嘔吐甚時。 痢。 方適 灸神穴天樞等穴藥中加伏龍 當之藥其 中仍宜兼用止嘔之劑 肝之煎汁煎而 冷飲 之或即用伏龍肝 湯、乾姜黄さ 味之煎汁。待能 連黄芩人

發斑疹 者多血之肥胖者皆以放 其色紅鮮者吉紫黑者凶斑 者選用萬根加 石膏湯萬根加朮附湯麻桂各半湯大青龍湯使班毒十 血 爲宜 但多少方面宜加酌量為是。 爲宜 即 無斑 而 身 分排托以防 戄 血 色 內 紅 陷。 斑 之形

後落 第四十三章 超亂 湯大柴胡湯大柴胡加芒硝湯調胃承氣湯大小承氣湯病證轉變不隨施治之法者無起死回生之望 吐瀉後大熟煩躁譫語大渴。舌乾黄黑心胸苦悶不能安眠大便祕閉或變泄痢下重等之證者隨證選 用白虎

飲過食者或在傷食病中感受厲氣者均隨其症選用備急圓紫圓瀉心湯調胃承氣湯大小承氣揚以逐除宿 平素好酒肉者或平素大便祕結者或病前數日大便祕結停滯於腹中者或平日貪啜水麵果物者或 毒之停滯能驅出闖入之邪氣下痢自止矣。又水毒穢物停在胸膈胃中。欲吐而不能吐者用瓜蒂散爲宜 時痛

傷寒六番〕 霍亂而不吐下。腹痛甚頭痛發熱者與桂枝加大黄湯下之此名乾霍亂死者居多,

千金方〕 小青龍湯治婦人之霍亂者也。

外臺祕要方〕 霍亂而四肢逆冷吐少嘔多者附子粳米湯主治之。

「時後方」 梔子或湯對於霍亂吐下之後心腹煩滿者有效

(聖濟總錄) 半夏人參湯(與大半夏湯同)對於霍亂逆篇心下痞塞甚宜

(和田東郭) 霍亂中用巴豆劑或備急丸之症其脈閉而有力腹之上皮或有力或無力此因濕熱攀結於內

故見上厥或吐利吐而不利。或煩躁悶亂反覆顛亂者用之(此條見乾霍亂之治方)

, 證治摘要) 因暑而身熱口乾煩躁心神恍惚小便赤遊大便泄瀉者五苓散爲宜自己按之而水瀉下痢者。

加滑石有效。

轉筋者理中湯中加石膏脈沉細轉筋煩躁發熟者亦當以無熱治之大抵霍亂而口竭轉筋者熱症也四逆揚

證亦轉筋者。但不甚輕耳。

亂而四肢厥冷吐少嘔多者用附子粳米湯心下痞者用甘草瀉心湯。

腸窒扶斯

本病起於固有之窒扶斯菌呈一定之熱型及腸症狀、大概經過一定之期日變爲急性傳染性疾患其病狀之

經過與漢法之傷寒一致故可云傷寒之治方即腸窒扶斯之治方。 本病之病原爲窒扶斯桿菌。主犯二十歲至四十歲之壯健者而家族之罹患者尤易爲本病之素因

本病之層伏期爲八日乃至二十日

經其痛尤甚而大腿筋之疼痛者亦極多。前兆期或全缺如或者惡寒及不整之輕熱全身倦怠食思亡失不眠及神經痛而後頭神經或三叉分歧之神

当前述之諸徵候因一回之戰慄或頻回之惡寒即現稽留熱自後呈窒扶斯之症狀即窒扶斯舌蔷薇疹窒扶

新性下痢脾藏腫大窒扶斯便及血清反應等

熟達三十九度乃至四十度之稽留第三週(腸粘膜上形成潰瘍之時期)中一日中之體温著著變化第四週 及輕重有關無併發症之輕症其稽留熱之持續甚短小或全經過不短小而熱不稽留常為弛張狀態 則漸次低降,其後熱度漸次下降。終於平温但此熱型亦有呈種種之破格者此疾病之強弱與併發症之有無 之時期)熱漸次如階段之昇騰第二週(隨揉上浸潤腸淋巴濾胞上形成壞疽及窒扶斯腐痂之時期)中 本病之熱。通例有固有之經過、此爲診斷上重要之事。在發病之第一週中、人陽粘膜之淋巴濾胞罹髓樣腫脹 、室扶斯潰瘍上形成瘢痕之時期)中。體温之昇降更爲著明此際一日中最高之度與前同一。而最低之度

此外口渴食思缺乏呼吸數之增進及尿量之減少等皮膚在前半期中乾燥而且灼熱但至第四週中屢屢見 **搏在經過之後半呈顯著之重搏性回復期中更有顯然之重搏性或帶三搏性**

腸窒扶斯之脈搏比之體温之數少體温雖高至三十九度以上而脈搏則屢屢在百之內外又重症患者之脈

多量之發汗,因此皮膚上現多數之結晶性栗粒疹就中以下腹部之側面尤甚以手撫摩之能獨知無數**微細**

之粗糙面

色之苔近於第一週之終末舌上乾燥且現非常之赤色屢屢現煉瓦狀之赤色 舌因展出之故,著著振顫且在發病之初日。舌大抵粘着濕濯、從舌背上至尖端現灰色灰黄色灰褐色或煤灰

在第一 班曼初發現於胸部與腹部之境界經驗上常發於脾臟及肝臟部但亦有發於其外之腹部及胸部並及全背。 有時亦生於頭部及四 週之終末皮膚上現赤色類內形之斑即薔薇疹其大平均如豌豆大多微微隆起以指壓之則消退此 肢至發生於顏面者則甚鮮其數亦非常不同往往與室扶斯流行之性質相異此薔薇

室扶斯患者之腹部恆有輕重不定之膨滿此因腸管內發生多量之瓦斯所致又迴腸部往往對於壓感甚銳

敏按壓之時發生鳩鴻之音此音即名焉迴腸音此因液狀之內容物及氣泡充盈於陽管內壓之則起是聲之

故也、

脾臟在第一週之後半以後則肥大。

大便在發病之初日大多祕結通例當第一過之終末始大痢從此以後一晝夜中排洩二回或至六回之稀薄 便窒扶斯患者之糞便呈黄綠色阿爾加里性反應靜置之則有淡黄色麵包心狀之經濟沉降其外觀似

冀汁故各蛇豆羹便云

室扶斯患者之面貌屋属為極特徵的所謂室扶斯面貌者是也室扶斯性之面貌究屬如何記述之雖甚困 但患者對於外界之刺戲毫無反應。呈所謂無慾狀態口稍開放目取第一視位不稍振動此外則患者之舌展 難.

後篇 第四十四章 肠室抗斯

出其提出之舌振顫久而不退入

起此誘因爲過早離狀飲食之不攝生及精神的亢奮等亦有不得何等誘因之證明者初病與再發之間經過 本病有時見再發此再發之所以恐係患者從外部新得病毒加以留存於局處之傳染毒以爲誘因致發動而

無熱之中間 期極不同。

又屢屢當最初疾患經過未了之前更見體温之昇騰者此種情形名曰再燃與真正之再發有於

再發之持續時間甚短且其症狀亦較初病時爲輕快

肠窒扶斯之異常症有電擊性窒扶斯頓挫性窒扶斯輕症窒扶斯無熱性窒扶斯遺遙性窒扶斯 腸窒扶斯之併發症(一)或者全身傳染之輕重及疾病之持續有異(二)或者腸壁上與實 傷的機轉有關聯 為基

語甚至舉臂亢奮高聲罵詈亂打自己之周圍選其暴力口吐噴沫監視稍怠輒從病室逸走或自窗轉 (三)或者窒扶斯桿菌或其他發病素優入之結果而來其中尤以連鎮狀球菌及其外之臟器被 (一)重篇之全身傳染往往現腦官能之障礙故此時有腸窒扶斯代神經熱之名稱患者昏慘且發不穩之讀

遲鈍性神經熱之患者昏懵但其狀態安靜、祇不過喃喃發不明之言語故名喃語性譫妄此症之患者與外界 此種狀態往時各敏捷性神經熱反於此者各日運鈍性神經熱云(考察陽與陰讝語與鄭聲之區别) 全無干與不要求飲食物飲食物須經旁人之催促膀胱過充非經他人催促不排尿雖其體位最不便宜亦能 不變有時一二手指為痙攣的動且手背及前膊上之腱亦跳動(此所謂腱跳動)或以手指提引

《小時而 恰如摄絨毛之狀此之所謂搜衣摸狀

其次為衰疲性靜脈栓塞此在左股靜脈最審見之此症現脚之疼痛冷感及衰弱患部上之皮膚現水腫。 呈皮

輕 脈 之 擴 張 及 蛇 行 皮 膚 之 温 度 低 降。

排洩十回至十五回之稀薄便致生衰弱死亡之危險此外持久性便秘亦算入併發症中此因容易虧起窒扶 (一)基因於腸漿膜之炎症及潰瘍性變化之併發症中第一者為下痢之增進或窒扶斯患者於廿四 小

淆其他之腸內容物或為純血液性在純血液性之場合屢屢見凝固之血餅塊出血之量達一立或至二立失室扶斯腐痂下之血管未充分中有血栓塊在未閉鎖前該腐痂剝脫而起其糞便呈黑赤色血痕狀之觀或混 展示破裂之狀横隔膜肺臟及心臟強排壓於上方往往生窒息死之危險腸出血大多起於第三週以前此 練之醫士祇須觀察患者特徵的外貌更一檢其糞便即能推察得腸出血之存在矣出血之甚者在未排洩 血強度之時。患者之面貌呈屍色體温低降。往往在平温以下,且意識昏懵至此際。右腸骨窩屢屢呈獨音在熟 斯腐痂 之剝脫及腸出血甚至腸破裂故亦頗爲嫌忌之症有時竟致發脹鼓脹此因瓦斯過充腸管爲下腹膨

反覆數次云。 便以前已至於死之轉歸矣。 凡腸出血在某症舐一回之便血他症往往持續一日至三日亦有一時中止逾二三日後再發者其甚者亦

炎性併發症茲揭一二例如次 的檢查便可決定。室扶斯桿菌在膿灶中。得保持其數年之生活力又腸室扶斯之經過中不論何種內臟得變的檢查便可決定。 (三)炎性併發症為窒扶斯桿菌或連鎖狀球菌或其他之病的侵入而起與否祇須依炎性滲出物之細菌學 腸窒扶斯潰瘍進入之部分甚深往往接近於腸漿膜易於誘發腸穿孔及穿孔性腹膜炎

氣管枝加答兒焉極頻繁之倂發症現於第一週之終末或第二週之始有時見肺炎。 耳下腺炎在本病併發症中頗爲類繁大多犯其一側兩側同時來者甚稀本症大多見於發病之第二週或第 三週之終末亦有至恢復期始發現者

耳炎亦爲本病常見之併發症往往成鼓膜之穿孔

專精最多往往生於萬骨部大轉子上

此外尚有急性腎臟炎思奇那等亦常見之

铃蘭 第四十四章 腸窒扶斯

【療法】 本病之療法有漢法干古之聖典已詳述於傷寒論中今就本章所現之症候擬述其方法如次但不

前兆期 免有蛇足之諼耳。 遮 例現太陽病證 (者人虛弱人始現陰證) 即頭痛惡寒輕熟全身倦怠此其中用桂枝湯萬根湯麻

熱如階段狀之上進者小柴胡湯之證也此時舌上現白苔食慾亡失脾臟肝臟腫大耳鳴頭痛等。舌現黄苔而熱如階段狀之上進者小柴胡湯之證也此時舌上現白苔食慾亡失脾臟肝臟腫大耳鳴頭痛等。舌現黄苔而 乾燥舌尖赤大便祕者與大柴胡湯熱上稽留亦所謂潮熱大便祕讝語有搜衣摸牀之狀亢奮高聲罵詈亂打 黄陽之類麻黄湯之條下。有身疼腰痛骨節疼痛云云此時期所現之症狀與神經病之症狀一 自己之周圍或從病室逸走等之狀者用承氣湯類若無宿食停滯之候熱熾而口渴現如上之症狀時應用白 致

腸管內發生多量之瓦斯苦腹部脹滿時用大小承氣湯梔子厚朴湯厚朴七物湯厚朴生姜半夏甘草人參揚者有陰症之意但亦有陽極似陰動極則靜者故宜參照脈腹舌等用真武湯或承氣湯之類。遲鈍性之發喃語性譫妄不求飲食物或膀胱過充而不排尿或臥不適宜之地位身體亘數小時不變其體位 虎湯。

寒有手足厥冷等之狀而下痢者用真武湯四逆加人參湯之類。 心下 下痢之時。腹部仍堅實脈沉實者。確爲陽實之症應用大柴胡湯承氣湯之類,一日下數回至十數回水樣之痢。 痞,何是不利之狀者用人參揚若心下痞鞕腹中有雷鳴之狀者用甘草瀉心湯已陷於陰虛脈沉微惡

外之倂發症可參照各疾病之條適宜用藥 不止者用黄土湯黄歸膠艾湯人參湯四逆加人參湯。

血

雜 病紀聞) 平生壯實之人患傷寒其症亦劇此因正 氣與邪氣相爭之故平常虛跼之人其症亦輕此因正

子細辛 藥力已到則汗發如流水大抵經用三四日之發散劑則惡寒頭痛止表證去而爲半表半裏之症倘經以被取其汗,其病見重時,用麻黄湯,先覆以厚被再服以藥,更啜熱粥以取斤。發散之藥等咽下宜順速, 胡湯、七八九日食益不進。譜語煩渴、大便五六日不通者此屬陽明裏症也此時如有不少之柴胡症 得用附 為球通表裏腠理之藥。猶之對於蓋火之壺。爲之穿穴也其佐藥組合聊助陽滋潤津液之藥,如見手足厥 壺中急蓋其蓋則火氣穿通襄穴若火盛而竟開蓋則火可消滅故傷寒論中有用麻黄升麻湯者此麻 湯四逆湯之類厥陰病者。其經絡之症雖不多。但非厥陰病之厥冷不得用附子劑凡陽氣裏包之病循火 益氣湯調理之此爲傷寒療治之大道又最初見陰症者用桂枝湯發表之虛候甚者用桂枝加附子湯麻 大柴胡湯若譜語甚言苔黑過身蓋夜出汗者用大承氣湯使譜語輕而 表症之 發散劑。而惡寒頭痛猶不止者仍用發散劑。早在表症之間者發用柴胡湯、此柴胡大抵早則二日。遲則七八 療之大法最初惡寒頭痛甚口鼻乾有嘔氣發熱身體痛者傷寒之太陽症也一 相爭之力乏之故傷寒之爲期大抵七八日壞症則大抵二十 湯麻黄附子甘草湯等發散之太陰症纔一二日即入於襄爲少陰症不見襄症者從症用真武湯、 目的。 子乾姜之類用之厥冷反益甚甚至促其命期 爲惡寒發熱嘔益甚舌上有厚黄苔小便之色赤者柴胡之 實者次要百日百日之間宜堅慎暑寒飲食心 白而 勞房事若此期不能養生則終生 證也。 愈而其調理 止其汗其調理之藥見 四五日中現出柴胡症 一難經四五十日 蓋夜用葛 根湯 虚 候之時 者用 五六帖。 四 柴 Ħ.

子湯以逐汗最初數日汗出如流津液無大便祕 後舌上現黄苔或反之苔去舌薄色赤 初之治療第一發散旣發於柴胡湯後即不宜發表因表虛之人苟稍稍發表即汗出如流者用桂 散(後世多以麥門冬為主藥)脈現處候者用附子粳米湯。」到真吉耳及文書主丟顏色赤舌之皺點去如陰莖龜頭之 3者知爲 陽 明病宜快用下劑又 /肌喜吞 極熱之湯者是落於陰症之候出 最初如陽 症津液乾燥七八

桂枝加大黄湯從少陽病之時分而現經水發痙者大柴胡湯爲宜。發狂精神不正者。柴胡湯爲宜或柴胡湯中或加紅花甚有效煙病古人用萬根湯此症如已用過發表劑者用 人傷寒熱甚時經水來其熱大熱入血室(子宮)必發狂或起煙病角号反張口噤等熱俄去則又變症體語

菜湯或理中安蚘湯蚘盡則嘔止. 少陽症之時。或陽明症之時。嘔逆甚者用柴胡劑或小半夏加茯苓湯如嘔盆甚致嘔出蚘蟲者此時考用鷓鴣

少陽 病時。過去舌上現厚黄苔質煩者用石膏湯用石膏而腹痛者即不應用石膏凡石膏對於適當之病, 咽下

即有快覺。 少陰病時,脈微沉。虛大舌薄而赤大便溏足微腫等此皆虛寒之候,用附子劑附子劑不應,服後反脈力,陽明病時,用大黃劑下痢而病人覺急快者實證也與下劑適應下痢後腹無力覺不快者即不應用下 心下痞塞或精神蒙蒙或痰喘發動或現上逆目赤等。是等皆不應用温補之劑宜另用他桑 力減 玟 腹

象懼其稿之難於完成也因命余更從事於上卷余拜命以來深懼實任之重而且**經雖日夜凭几綴稿**但本書分上下二卷上卷本係恩師湯本求真爺自己擔任執筆下卷託余講述但入春以來發頓呈衰老之 以淺學魯鈍之余不免難於發揮古醫之真理殊以爲憾耳。

本編大别爲前後兩篇後篇內設原因症候療法備考諸項目間錄實驗例案原因及症 本於現代西醫學之說內科以橋本節齋氏新著內科全書為本療法則 参酌各書就余之經驗 候不 敢稍 分經 加 私意。

備考中不錄古方而多採錄後世之方因遵奉古方屏斥後世之方非學者應有之態度此不論東西而說述之備考部則引用學術豐富之諸先輩之說以備考證。 之研究家理由 固相同也後世方雖亦錄 自先哲之經驗但其還用中自有其新經驗存乎其間也

昭和八年十二月於牛込船河原町寓居

著者誌

昭和八年晚秋權藤成卿多麻識於南隣旭丘之僑居之迷逸者也乃爲之序。之迷正是關中之一炬彼益是益足以照破東西醫家之迷逸者也乃爲之序。

及 孜 係 修習診方 塚 敬節 藥術 君 支 盆鎌 新 自卑雖 君已專攻現代 佬 不 知 F 術 以 侚 有遺 憾於是百方考慮 深究 古醫 方之 残 籍 多方 歷 問 遺

古醫之 經前 原夫醫方藥 波斯醫之 퐞 /傳統。 補 誈 投歸 此 修 術 **請我國此一例也其他可** 打**僅傳其一班者耳**且當 之 始與漢武之禮聘巫 技自後漢歷三國六朝迄於隋 **覡作不死長生之夢者正復相** 想而 時西 知矣。至 域 唐益見 南荒之通 ·於近世。 因於 其精今世所 聘漸 次頻繁醫 荷醫 同。 |徳野之 存傷寒金匱本草諸 檕 亦 漸 随文物 入 竟使醫制 而 俱 爲之 盛 咸 皆當 天 和 朝廣 時 變 而 之 聘賢 穫

於繁粉 型之 凡 車由 中一掃扁鵲巫覡之蠱言。 球入 證錯滑離竟喪其本雖聖者不能除其弊是亦必然之理也往昔張 、密由 簡移繁為物情必然之理密矣繁矣於是審之而使約。 一刀斬斷千百亂麻此亦可以語於現代 仲景氏 治學 集之 之 而 術 約 使整於是密者 矣。南 北 百 1家之傳 瘤 於 如 密。 繁 於

孜於究· 古 警法 起 但 方鍊術 旣泯 輪者 雖多 其 時至廢 傳 統而 演其 瘦 歐洲醫術敷佈於天下密之愈密繁之愈繁級錯滑離之弊漸以滋 忘食 傳。而 不解診術 藥方道聽途說徒毀他家曉曉然猶 不自省君獨 生。 居此間 而 古醫 其 活 餛 之 孜

予苦 喘 國之保守殘器自 驅菱衰 此考益 病理 三十年經 講樂 之狀 亦 方者雖古今 而 君一診始斷 約之整之建古人 君 獨 然 能 漸 烔 衰 鑒其 斯 東西規矩 之理不宜妄施尅伐查醫家之爲余立醫案者凡數 病 (隱以) 之遗 或將與 意者 處理 不同但其真論之所存機缺之所在必得相同。 生共 平多 蕿 終當其 鼎 較彼此。 , 敗器之 端 法處 觀 嘜 對 旣 理之始 異同。 盛 則和 以其醫方藥術 所 而 謂 緩 之。當 釋 生 之惑 干人 其 打 呃 成在急 破神 所 而 曀 調 忘 攀 異無 異途 其 閉。 死 刧 則 怪妖妄 而 攻 疏 否 其 而 疾 開 歸 者

序

-W/2/10

國 醫科內

要

提

是

作。篇學 列幾本 病奢害 之為 可吾語病 症 各論人四 國義證 量。古 駭 名 方。博。詞。 四十四章辨證明哲學本求真氏論述大塚 頗病 經彼以科學 · 學解剖發表成分作用則有轉於! 其治療一道則皆取以漢藥方劑! (取之於西籍。或取之於漢醫原因! 析治法精當誠不愧研究漢醫之傑為知證候與治法概論凡十三章後人塚敬節氏所著原稿寫實驗漢方醫

途。方。莫 既昌吾新於備尤殊於不對 國舊漢孜其醫匯籍之兼 未 道。通。者。外。挾 千徇厥又與

以期類

學似證

不新說,則吾國歌 而分治法,其是因分列原因 壁层

医最假

學注治

盎每

漢而證 醫重狀。

前經亦

可明。國 得唯有附

我苔。學

用

無 流容 文能發古聖之真諦,實 學院政進以應潮流,本 學院改進以應潮流,本 學歷改進以應潮流,本 學歷改進以應潮流,本 學歷改進以應潮流,本 真論實為 改進醫 學於體 上新系 之治統。 本。取代

願於科

書	校編仁存陳叢學醫漢	皇
上海中醫學院出版社	中國內科醫鑑	大塚敬節著
版 社	元川	

腎臟結石	腸結核	結核性腹膜炎	第二十五章 加答兒性膽管炎及隨骥炎…一二二	黄疸	陽寄生蟲病	第二十二章 腸叠積症—————	富腸炎	陽加答兒一〇	章 胃酸	章 胃緊張力衰弱症一〇	第十七章 胃下垂及腸下垂症 一〇六	中国内科雷雅
第四十四章	四	四十一章	第四十章が	第三十八章	第三十七章	第三十六章	第三十五章	第三十四章	第三十三章	第三十二章	第三十一章	
陽室扶斯一八四			神經衰弱症一六五,源源		脈硬化症	痺		找疫篤氏病一四三	脚氣一四〇	糖尿病一三五	腎盂炎一三四	

中國內科醫鑑目錄

日錄